

丹溪心法
卷二

丹溪心法卷一

元 丹溪朱震亨著

斑疹七

斑屬風熱挾痰而作，自裏而發於外，通聖散中消息，當以微汗散之，切不可下。內傷斑者，胃氣極虛，一身火遊行於外所致，宜補以降於陰，証畧例中求之。發斑似傷寒者，痰熱之病發於外，微汗以散之，若下之非理。疹屬熱與痰在肺，清肺火降痰，或解散出汗，亦有可下者。疹卽瘡疹，汗之卽愈，通聖散中消息之。癰疹多

屬脾，隱隱然在皮膚之間，故言癰疹也。發則多痒，或不仁者，是兼風兼溼之殊色。紅者，兼火化也。黃瓜水調伏龍肝去紅點斑。

戴云：斑有色點而無頭粒者是也。疹浮小有頭粒者，隨出卽收，收則又出是也。非若斑之無頭粒者，當明辨之。

附錄斑疹之病，其爲証各異。瘡發焮腫於外者，屬少陽三焦相火也，謂之斑。小紅爛行皮膚之中，不出者，屬少陰君火也，謂之疹。又傷寒陽証發斑有四，惟

溫毒發斑至重。紅赤者爲胃熱也。紫黑者爲胃爛也。一則下早一則下晚之。乃外感熱病發斑也。以玄參升麻白虎等藥服之。陰証發斑亦出背胸又出手足亦稀少而微紅。若作熱証投之涼藥大誤矣。此無根失守之火聚於胸中。上獨薰肺傳於皮膚而爲斑點。但如蚊蚋虱蚤咬形狀而非錦紋也。只宜調中溫胃。加以茴香芍藥或以大建中之類。其火自下。斑自消退。可謂治本而不治標也。

入方

調中湯 治內傷外感而發陰斑

蒼朮 半錢

陳皮 一錢

砂仁

藿香

芍藥 炒

甘草 炙

桔梗

半夏

白芷

羌活

枳殼 各一錢

川芎 半錢

麻黃

桂枝 各半錢

右咬咀姜三片水煎服

消毒犀角飲子 治斑及癰疹

牛旁子 六錢

荊芥

防風 各三錢

甘草 一錢

右咬咀水煎

通聖散

出丹溪經驗方

川芎

當歸

麻黃

薄荷

連翹

白芍

黃芩

石膏

桔梗

一兩

滑石

三兩

荆芥

梔子

白朮

二錢半

甘草

右剉水煎服

如身疼加蒼朮羌活

痰嗽加半夏

每服細末三錢生姜三片搗細盪起煎沸服之

立參升麻湯

痲在身治汗下吐後毒不散表虛裏實

發於外甚則煩燥譫妄

玄參

升麻

甘草

等分

右咬咀水煎

化癰湯 治傷寒汗吐下後癰發脈虛

白虎湯加人參守真再加白朮

右咬咀時時煎服

大建中湯

黃芪

當歸

桂心

芍藥

各二錢

人參

甘草

各一錢

半夏

黑附

炮去皮各二錢半

癰八

右咬咀每服五錢水二盞姜三片棗二枚煎食前服

癰疾有風 暑 食 痰 老癰 癰母 大法風暑

當發汗夏月多在風涼處歇遂閉其汗而不泄故也

惡飲食者必自飲食上得之 無汗者要有汗散邪爲

主帶補。有汗者要無汗正氣爲主帶散。一日一發

者受病一月 間日一發者受病半年 三日一發者

受病一年 二日連發住一日者氣血俱病 癰病感

虛者須以人參白朮一二貼托住其氣不使下陷後使

他藥內傷挾外邪同發內必主痰外以汗解散二陳湯加柴胡黃芩常山草果煎服久瘧不得汗者二陳湯加檳榔倍蒼朮白朮一方加柴胡葛根川芎一補一發不可直截老瘧病此係風暑於陰分用血藥引出陽分則散入方宜

川芎

撫芎

紅花

當歸

炒栝

白朮

蒼朮

甘草

白芷

右剉水煎露一宿次早服

治瘧一日閒一日發者補藥帶表藥後以截瘧丹截之若在陰分者用藥掣起陽分方可截卽前藥之屬充案瘧在陰分須徹起陽分者卽格致論中云臟傳出至腑亂而失期也又當因其汗之多寡而爲補養升發之術下陷謂陽氣下陷入陰血中無干要有汗多用川芎蒼朮乾葛升麻柴胡之屬此知溪治瘧之微旨學者所當知也

截瘧常山飲

穿山甲

炮

草果

知母

檳榔

烏梅

甘草炙

常山

右咬咀水酒一大碗煎半碗露一宿臨發日早服得吐爲順 一云加半夏柴胡去穿山甲如吐加厚朴又或加青皮陳皮

又方

柴胡

草果

常山

知母

貝母

檳榔

右用酒水同煎露一宿臨發前二時服

又治瘧母此藥消導

青皮

桃仁

紅花

神麴

麥芽

鱉甲

醋煮為君

三稜

莪朮

海粉

香附

並用醋煮

右為末丸如梧子大每服五七十九丸白湯下

又治瘧寒熱頭痛如破渴飲冰水外多汗出

人參

白朮

黃芪

黃芩

黃連

山梔

川芎

蒼朮

半夏

天花粉

右咬咀水二鍾姜三片煎服

又治瘧病發渴

生芡

麥門冬

天花粉

牛膝

知母

葛根

炒栢

生甘草

右咬咀水煎

截瘧青蒿丸

青蒿

半斤

冬瓜葉

官桂

馬鞭草

右焙乾爲末水丸胡椒大每一兩分四服於當發之

前一時服盡又云青蒿一兩冬青葉二兩馬鞭草

二兩桂二兩未知孰是姑兩存之以俟知者

截瘧

檳榔

陳皮

白朮

常山

錢三

茯苓

烏梅

厚朴

各一錢半

右咬咀作二服水酒各一鍾煎至一鍾當發前一日
一服臨發日早一服服後少睡片時

又瘧疾後

白朮

半夏

一兩

黃連

半兩

白芍

錢三

陳皮

半兩

右爲末粥丸梧子大每服六十丸姜湯下

附錄世用砒霜辛毒不可輕用俗謂脾寒此因名而迷其實也苟因飲食所傷而得亦未必全是寒況其他乎在其陽分者易治陰分者難治瘧母必用毒藥消之行氣消堅爲主東垣謂寒瘧屬太陽熱瘧屬陽明風瘧屬少陽在三陰經則不分總曰溫瘧此言是但三陰經說不明作於子午卯酉日者少陰瘧也寅申巳亥日者厥陰瘧也辰戌丑未日者太陰瘧也瘧脈多弦但熱則弦而帶數寒則弦而帶遲亦有病久而脈極虛微而無力似乎不弦然而必於虛微之

中見弦但不搏手耳細察可見也

瘧又名疟疾者其証不一素問又有五臟瘧六腑瘧
詳矣初得病勢正熾一二發間未宜遽截不問寒熱
多少且用清脾飲或草果飲或二陳湯加草果半錢
或平胃加草果半錢柴胡半錢又或養胃湯加川芎
草果各半錢熱少者進取微汗寒多者宜快脾湯服
後寒仍多者養胃湯加附子桂枝各半錢獨寒尤宜
不效則七棗湯熱多者宜驅瘧飲或參蘇飲每服加
草果半錢大熱不除宜小柴胡湯渴甚者則以五苓

散入辰砂少許獨熱無寒亦與小柴胡湯熱雖劇不甚渴者本方加桂四分或以柴胡桂姜湯候可截則截之



久瘧瘧母不愈者宜四獸飲間服山甲湯

閑方

清脾湯

青皮

厚朴

白朮

草果

柴胡

茯苓

黃芩

半夏

甘草

炙等分

右剉末二盞生姜三片棗一枚煎忌生冷油膩