

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷一百十二



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

醫方類聚

卷之四

問答

雜錄

明 王肯堂 撰

陰之前屏翳處也即會

之會癰生其間人起立

大醫方類聚

證治準繩

一

則若懸然故名懸癰屬足三陰虧損之證輕則為漏瀝
盡氣血而亡重則內潰而即隕若初起濕熱壅滯未成
膿而作痛或小便澀滯用龍膽瀉肝湯腫焮痛甚仙方
活命飲並以製甘草佐之如此雖患亦輕雖潰亦淺若
不能成膿或膿成不潰者八珍散補之若膿已成者急
針之欲其生肌收斂腎虛者六味地黃丸血虛者四物
加參朮氣虛者四君加芎歸脾虛者補中益氣湯氣血
俱虛者八珍湯并十全大補湯若用寒涼消毒則誤矣

薛懸癰原係肝腎二經陰虛雖一於補猶恐不治况
膿成而又尅伐不死何待常治初起腫痛或小便赤澀
先以製甘草一二劑及蒜灸更飲龍膽瀉肝湯若發熱
腫痛者以小柴胡加車前黃檗芎歸膿已成即針之已
潰用八珍湯加製甘草柴胡稍酒炒黃檗知母小便澀
而脉有力者仍用龍膽瀉肝湯加製甘草小便澀而脉
無力者用清心蓮子飲加製甘草膿清不斂者用大補
劑間以豆豉餅或久而不斂者亦用附子餅灸並効

尚寶鮑希傳足發熱服四物黃蘗知母之類年餘患懸
癰唾痰作渴飲湯其熱至膝更加芩連二陳熱痰益其
謂余曰何也余曰此足三陰虧損水泛為痰寒涼之劑
傷胃而甚耳遂先用補中益氣少用六味丸間佐以當
歸補血湯半載乃愈 趙州守忠此證腫多作痛五月
餘矣晡熱口乾盜汗食少體倦氣短脉浮數而無力此
足三陰氣血虧損用補中益氣加製甘草五味麥門三
十餘劑食進勢緩又用六味丸料五十餘劑膿潰瘡歛

後因怒作痛少食脇痛發熱仍用前藥賴其稟實慎疾而愈 通府張敬之患前證久不愈日晡熱甚作渴煩喘或用四物湯黃檗知母之類前症益甚更體倦少食大便不實小便頻數謂余曰何也余曰此脾虛之症前藥復傷而然也遂用補中益氣加茯苓半夏數劑飲食漸進諸症漸愈更加麥門五味調理乃痊經云脾屬至陰為陰土而主生血故東垣先生云脾虛元氣下陷發熱煩渴肢體倦怠等證用補中益氣湯以升補陽氣而

生陰血若誤認為陰虛輒用四物黃蘗知母之類反傷脾胃生氣是虛其虛矣况黃蘗知母乃瀉陽損陰之劑若非膀胱陽火盛而不能生陰水以致發熱者不可用也 一儒者患此服坎離丸及四物黃蘗知母之類不應脉浮洪按之微細余以為足三陰虛用托裏散及補陰托裏散漸愈又用六味丸補中益氣湯調補化源半載而痊大凡瘡瘍等症若腎經陽氣亢盛致陰水不能化生而患陰虛發熱者宜用坎離丸取其苦寒能瀉水

中之火令陽氣衰而水自生若陽氣衰弱致陰水不能
化生而患陰虛發熱者宜用六味丸取其酸溫能生火
中之水使陽氣旺則陰自生況此證屬腎經精氣虧損
而患者十有八九屬腎經陽氣亢盛而患者十無一二
然江南之人患之多屬脾經陰血虧損元氣下陷須用
補中益氣湯升陽補氣使陽生而陰長若嗜慾過多虧
損真水者宜用六味丸補腎經元氣以生精血仍用補
中益氣湯以培脾肺之生氣而滋腎水經云陰虛者脾

虛也但多誤以為腎經火症用黃檗知母之類復傷脾
肺絕其化源反致不起惜哉 上舍劉克新潰後作痛
發熱口乾小便赤澀自用清熱消毒之藥不應尺脉洪
數余以為陽氣盛而陰氣虛也先用四物湯加黃檗知
母等諸劑瀉其陽氣使陰自生服數劑諸證漸愈後用
補中益氣湯六味地黃丸補脾肺滋腎水而瘡口愈
一儒者小便赤澀勞則足軟腫痛發熱口乾舌燥食少
體倦日晡益甚此氣血虛而未能潰也遂用八珍加麥

門山藥倍用製甘草數劑諸證悉退但患處腫痛此膿
內炊也又五劑膿自涌出又五十餘劑而瘡口將完又
因勞役且停藥寒熱作渴腫痛膿多用補中益氣湯加
炒山梔二劑少愈又以八珍湯加麥門五味百餘劑腫
痛悉去喜其慎起居節飲食常服補劑而安但勞則出
膿一二滴後惑於他言內用降火外用追蝕必其收斂
致患處大潰幾至不起仍補而愈

甘草膏 治水穀道前後生癰謂之懸癰乃肛門前陰

囊後生核子如橄欖樣或如梅李狀初不作痛至旬月漸熱不早治瘡潰膿血出日數盈至有腸腐而大便從瘡口出者其苦不可言近亦數月遠至一二年亦愈須是作核未痛以前治之不過一二服便自消此病初發如松子大漸如蓮子數十日後始覺赤腫如桃李即破若破則難治服此藥雖不能急消過二十餘日必消盡矣投兩服亦無害林院判康朝嘗患此疾已破服此藥兩服瘡即合甚妙 右用粉草半

斤內用無節者四兩如算子樣劈破取泉石間長流水以甘草入水中浸透以炭火將甘草醺水焙炙以一盃水盡為度不可急性劈開却將所炙甘草另用泉水三盞無灰好酒五盞用瓦礮煎至三之一如膏一起服之立愈另用有節甘草四兩仍用泉水隨礮大小煎湯澆洗患處三遍其効如神水冷再溫洗丹騎馬癰用大粉草帶節四兩長流水一盃以焯浸水盡為末入皂角灰少許作四服湯調頓服立効

薛大抵此證屬陰虛故不足之人多患之寒涼之劑不可過用恐傷胃氣惟製甘草一藥不損氣血不動臟腑其功甚捷

加味小柴胡湯

方見前

清心蓮子飲 治懸癰勢退惟小便赤澀

黃芩

五錢

黃芪

蜜炙

石蓮肉

去心

人參

赤茯苓

各七錢半

車前

子炒麥門冬

去心

甘草

炙

地骨皮

製甘草

法見前

每服一兩用水二鍾煎至八分食前服

如發熱

加柴胡薄荷

加味托裏散 治懸癰不消不潰

人參

黃芪

鹽水拌炒當歸

酒炒川芎

麥門冬

去心酒拌知母

炒黃礬

酒拌炒

芍藥

炒

金銀花

柴胡

製甘草

法見前各一錢

右作一劑用水二鍾煎八分食前服

加味十全大補湯 治懸癰潰而不斂或發熱飲食少思

人參

黃芪

鹽水拌炒

白朮

炒

茯苓

熟地黃

酒拌中滿減半

當歸

歸身

酒拌

川芎

芍藥

炒各一錢

肉桂

麥門冬

去心

五味子

搗甘草炒各伍分

右作一劑用水二鍾煎一鍾食前服 莖腫加青皮

熱加黃芩柴胡 日晡熱加柴胡地骨皮 小便

赤加酒製知母黃蘗 小便澁加車前子山梔子俱

炒

雞內金散 治穀道邊生瘡久不愈者

雞胗脰不拘多少即是雞胗內去下黃皮

上件燒灰存性研為極細末每用少許乾貼之如神

治穀道中瘡 以水中荇葉細搗綿裹內下部日三
治肛内生癰腫痛方

血餘 帶血管鵝毛 生鹿角

已上各藥俱煨存性研細等分和勻每服五錢空心
好酒下

股部 十五

股陰疽 與附骨疽參看

靈樞云發於股陰名曰赤施不急治六十日死在兩股