

雜證論治

歌曰

脾胃相通五穀消  
輸精脈絡終三焦  
當其健運施生化  
能食而肥氣血饒  
四時胃氣為根本  
脈寔強洪與石毛  
一有所傷營運衰  
從茲便覺比身嬌  
勞形過食中州損  
急情貪眠面色焦  
水不運行生痞脹  
食難消化肉潛消  
脾胃既病如何療


脾胃

脾胃之論莫詳於東垣其所著補中益氣調中益氣升陽益胃等湯俱以  
內傷勞倦為主又因脾乃濕土且世人胃陽衰者居多故參芪以補中  
二朮以燥濕升柴升下陷之清陽陳皮木香理中焦之滯氣脾胃合治若  
用之得宜誠效如桴鼓付蓋東垣不過詳於治脾而畧於治胃耳乃後人  
師其意者凡著書立說竟將脾胃統論即以治脾之藥混同治胃今觀  
先生法始知脾與胃當分論蓋胃屬戊土脾屬己土戊陽己陰陰陽之  
性有別也臟宜藏腑宜通臟腑之體用各殊也若脾陽不運胃有寒濕

要適寒溫飲食調

一臟一腑皆宜於溫燥升運者。自當遵東垣之法。若脾陽不虧。胃有燥火。則當遵先生養胃陰之法。其立論云。納食生胃。運化主脾。脾宜升則健。胃宜降則和。又曰。太陰濕土。得陽始運。陽明陽土。得陰自安。以脾喜剛燥。胃喜柔潤也。仲景急下存津。其治在胃。東垣大升陽氣。其治在脾。故凡稟賦本火之體。患燥熱之症。或病後熱傷脾胃津液。以致虛痞不食。舌絳咽乾。煩渴不寐。肌燥煇熱。便不通爽。此九竅不和。都屬胃病也。豈可求升蒸柴治乎。先生用甘涼濡潤以養胃陰。則津液來復。使之通降而已。此即內經所謂六腑傳化物而不藏。以通為用之理也。今案中所分胃陰虛。胃陽虛。脾

胃陽虛。饑傷食傷。最為明晰。陽絕之脾胃病。虛寔寒熱。宜燥宜潤。固當詳辨。其於升降二字。尤為要緊。要蓋脾氣下陷。固病即不下。陷而但不健運。已病矣。胃氣上逆。固病即不上逆。而但不通降。亦病矣。故脾胃治法。與各門相兼者甚多。如嘔吐。腫脹。泄瀉。便閉。不食。胃痛。腹痛。木乘土。諸門尤宜並參。互相討論也。



脾胃

清理胃氣方

治暑熱病後胃氣不甦

鮮者頭片三 大麥冬五 石斛五 烏梅五 橘白三 茯苓三 穀芽三

清養胃陰方

治因暑病熱病或誤發散消導後胃陰被傷口渴舌燥煩躁不寐不食此土剛燥宜柔養之

沙參 麥冬 玉竹 米仁 生藕豆 石斛 生甘草 粳米引

或加梨汁瘦加貝母嗽加杏仁

生脉散

治暑病熱病或香燥藥劫傷胃津口渴齒燥舌胎乾赤

或自汗或無汗脉或濇或散<sup>數</sup>不食

人參

麥冬 五味 按此方与麥門冬湯甘麥大棗湯可選用

大半夏法

治陽虛不通降一切嘔吐痰症或胃虛邪踞者以此方加入

人參

半夏 茯苓 生姜

溫補胃陽方

治胃陽大虛面白汗淋六脉濡弱口淡無味

人參

野朮 茯苓 甘草 附子 乾姜 大棗 粳米引

通陽方

治清陽大傷濁陰凝聚胸脹腹痛便閉嘔惡肢冷脉微急

須用此

附子 干姜 半夏 茯苓 陳皮 厚朴 木香 益知

烏藥 吳萸 姜汁 葱白 引 腹痛甚加良姜 丁香

按凡通陽虛則宜用人參不宜用白朮以白朮閉氣也

附子理中湯 治寒濕傷脾 腹痛肢冷泄瀉不食微寒熱宜進溫補

人參 白朮 附子 干姜 甘草

升陽益胃湯 治濕熱傷脾 脾虛陽陷陰火上乘 困倦體重節痛口苦

舌乾食減便澹溺數或惡寒不樂

黃芪 人參 白朮 川連 半夏 陳皮 茯苓 甘草

澤瀉

防風

羌活

獨活

柴胡

白芍

生姜

大棗

補中益氣湯

治煩勞內傷脾虛下陷脈洪大而虛發熱困倦或惡食便溏或脾虛不能攝血

黃芪

人參

白朮

甘草

當歸

陳皮

升麻

柴胡

生姜

大棗

如陽虛自汗升柴宜蜜炙再加麻黃根浮小麦葉加五味麥冬

當歸建中湯

治脾營受傷胸腹痛得食得按稍緩脈弦緩宜甘溫以養之

當歸

桂枝

白芍

甘草

枳子

茯苓

水蛭

姜棗引

畏寒汗出加附子痛多加丁香

歌曰


痰因火動令人饕  
淫痰氣鬱總同條  
肥人自是淫痰故  
伐火苓連梔子調

饕

饕有虛實真偽。其病總在於胃。經云。飲食入胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。又云。脾與胃以膜相連耳。又云。脾主為胃行其津液者也。由此觀之。脾屬陰。主乎血。胃屬陽。主乎氣。胃易燥。全賴脾陰以和之。脾易濕。必賴胃陽以運之。故一陰一陽。互相表裡。合沖和之德。而為後生化天之源也。若脾陰一虛。則胃家飲食游溢之精氣。全輸於脾。不能稍留津液。以自潤。則胃過於燥。而有火矣。故欲得食。以自資。稍遲則饕穢愈甚。得食則饕可暫止。害失治。則延便閉。三消噎膈之症。治當補

脾陰養營血兼補胃陰甘涼濡潤或稍微酸此乃脾陰之虛而致胃家之燥也。更有一切熱病之後胃氣雖漸復津液尚未充亦有是症此但以飲食調之可以自愈。此二種乃為虛餽症所謂寔者年歲壯盛脾胃生發之氣與腎陽充旺食易消磨多食易饑而餽得食即止此非病也不必服藥。以上皆是真餽症所云偽者因胃有痰火以致飲食輸化不清或況惡心吞酸微煩眩暈少寐似饑非饑雖飽食亦不能止此乃痰火為患治宜清胃稍佐降痰苦寒及膩滯之藥不宜多用。又有胃陽衰微以致積飲內聚水氣泛溢似有凌心之狀淒淒<sub>二</sub>戚<sub>二</sub>似酸非酸似辣非辣飲食減少此屬

脾胃陽虛治宜溫通。做痰飲門而治之。此二種乃似饑之偽症。若夫所  
所云心饑者誤也。心但有煩而無饑。胃但有饑而無煩。亦不可不辨明  
之。



木乘土

肝為風木之臟。又為將軍之官。其性急而動。故肝臟之病。較之他臟為多。而於婦女尤甚。肝病必犯土。是侮其所勝也。木臟見症。仲景云。厥陰之為病。消渴。氣上撞心。心中疼熱。飢而不欲食。食則吐蚘。下之利不止。又內經所載肝病。難以盡述。大凡其脉必弦。肋或脹或疼。偏寒偏熱。先厥後熱。若一犯胃。則惡心乾嘔。脘痞不食。吐酸水涎沫。尅脾則腹脹便或溏或不爽。肢冷肌麻。案中治法。有陰陽虛寔之殊。畧舉而敘述之。若肝陰胃陰未虧。肝陽亢逆犯胃。先生立法。用藥則遠柔用剛。泄肝如

吳萸椒桂。通胃如半夏姜汁姜附。加益智枳朴等。則兼運脾陽。中虛必用  
人參。故太半夏湯。附子粳米湯。進退黃連湯。瀉心法。治中法。溫胆等湯。是  
也。若肝陰胃汁已虛。木火熾盛。風陽擾胃。用藥忌剛。用柔。養肝則生地阿  
膠白芍。麻仁木瓜。養胃則人參麥冬。知母粳米。秫米等是也。至於平治之  
法。則剛柔寒熱兼用。烏梅丸。安胃丸。逍遙散。若四君六君異功。戊己。則必  
加泄肝之品。用桑葉丹皮者。先生云。桑葉葉桑輕清。清泄少陽之氣。熱丹  
皮苦辛。清泄肝胆之血熱。用金鈴子散者。川棟苦寒。直泄肝陽。延胡索理  
氣滯。血滯之痛。此皆案中。之綱領也。予另分此一門者。因嘔吐不食。脇脹。

腕瘡等恙恐醫者但認為脾胃之病不知寔由肝邪所致故特為揭出  
以醒後人之目耳

