

癰疽

太醫院吏目金谿雲林張廷賢子才編

同邑後學周亮登元龍校

肝癰疽脈數浮陽沉陰浮數不熱但惡寒侵若短痛處急灸或針洪數病

進將有膿淫滑實緊促內消可禁宜汗裏者脈虛濡遲或乳滿微潰後

亦宜長緩易治短散則危結促代見必死無疑

瘡瘍之症當察經之傳受病之表裏人之虛實而攻補之假如腫痛熱渴

大便閉結者邪在內也疎通之腫焮作痛寒熱頭疼者邪在表也且發

散之焮瘡痛甚者邪在經絡也和解之微腫微痛而不作膿者氣血虛

也補托之漫腫不痛或不作膿或膿成不潰者血氣虛甚也峻補之色

黯而微腫痛或膿成不出或腐肉不潰者腸氣虛寒也溫補之若疑其

未潰而藥用敗毒復損脾胃不惟瘡者不能成膿而潰者亦難收斂七

惡之症蜂起多致不救經云諸痛癢瘡瘍皆屬心火若瘡亦煩燥發熱

引冷便閉作渴脈洪數實是其常也雖在嚴寒之時必用大苦寒之劑

以瀉熱毒若脈微皮寒瀉痢腸鳴飲食不入嘔吐無時手足逆冷是變常也雖在盛暑之時必用大辛溫之劑以助陽氣經日用寒遠寒用熱遠熱有假者反之雖違其時必從其症

癰疽大按乃痛者病深小按便痛者病淺按之處陷不復者無膿按之處即復者有膿不復者可消若按之都壘強者未有膿也按之半軟者有膿也又手按上下不熱者無膿若熱甚首有膿凡覺有膿急當破之無膿但氣腫若有血暈之慎之不可針破也

癰者大而高起屬乎陽六腑之氣所生也疔者小而內發屬乎陰五臟之氣所成也

癰疽未破毒攻臟腑一毫熱藥不敢用若已潰破臟腑既虧飲食少進

一毫冷藥不敢用也

瘍者癰疽未見膿而腫也

腫瘍內外皆壅宜以散毒衰散為主說欲行大黃者宜審其虛實之原癰疽初起之時宜用灸法治癰疽發背初主累武累効

凡人初覺癰疽發背已結未結赤熱腫痛先以濕紙覆其上立視候其
紙先乾處即是結疽頭處取大蒜切成片如三箇銅錢厚安在頭上用
火艾壯灸之三壯換一蒜片痛者灸至不痛不痛者灸至痛時方住最
要早覺早灸為上方發一二日者十灸止愈三四日者六七愈五六日
者三四愈過七日則不可灸矣若有土敷頭作一處生者用大蒜搗成
膏作餅子鋪瘡頭上聚艾燒之亦能安也若背上初發心腫內有一粒
黃如粟米者即用獨蒜切片如前灸法治之次日去痂膿自潰也

○竹筒吸毒方 諸般惡瘡並治

用竹筒長一二寸用銀筒妙剖去毒皮似紙燻為佳其大小隨瘡斟酌
應毒瘡初發時用一白茯苓 蒼朮 烏柏皮 白芷 各五錢
右四味制片用水一碗同煎竹筒煎熟以藥擦乾為度要竹筒熱以手
按之於瘡上填之其筒自粘在瘡上不必手按也仍更煎藥分兩再
煎候前竹筒冷以手拔去再換熱者如前法其膿自吸人管中而愈

○刺毒散毒散 治癰疽疔腫發背乳癰等症瘡毒壯熱甚者頭痛拘急

凡傷寒一二日至四五日者一二劑其毒聲皆內自散

防風 荆芥 羌活 獨活 柴胡 前胡 薄荷 連翹 桔梗

枳殼 川芎 茯苓 金銀花 甘草 大便不遵加大黃

補熱甚痛急加黃芩黃連右劉生薑煎服瘡在上食後服在下食前服

○千金漏瀆湯治一切惡瘡腫毒丹瘤癰癤疔腫魚睛疔發癩疽初覺

一二日便知傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢體疼痛四肢沉重恍惚悶亂

坐臥不寧皮膚壯熱大便閉結小便赤黃並治姪婦勿用

漏蘆 白欬 黃芩 麻黃 枳實 芒硝 升麻 芍藥 甘草

大黃 芒硝 連翹 右劉生劑水煎服

○追風通氣散治癰疽發背腦疽流注腫毒救壞疾活死肌引患於未

萌之前拔根於既愈之後此藥順氣勻血扶植胃水不傷元氣滌蕩邪

穢自然通順不生變症兼治打破傷折痛氣血痛脚氣諸氣冷塊痛

腰痛一切癩飲為患 當歸 何首烏 木通 法 赤芍 白芷

烏藥 小茴香 枳殼 甘草

右判剉酒水各煎病在上食後服在下食前服

一癰疽初萌必氣血凝滯所成爲日既久則血積于所滯而後盛作故病

人氣血盛者滅當歸多則生血發于他所再結癰毒生生不絕矣

腦痘皆發在上者去木通通道虛下元爲上盛下虛之病難於用藥

一癰疽生痰有一一胃寒建痰加半夏健脾化痰痰乃鬱而成風痰加枯梗生昔

一流注可知獨活流注者氣血凝滯故氣滯則血流而凝加獨活者可以

動一身血肝血脉既動豈復有流注乎處以醋濕紙貼痛處以炒鹽熨之即消

一流注起於傷寒傷寒表未盡遺毒於四肢經絡溢於所滯而後爲流注

也如病尚有潮熱則裏有寒而未盡散加升麻蘇葉熱不退加乾葛頭

痛加川芎薑葱無汗用酒水各半煎大能行血生氣故也

一發背既久不愈乃前醫用涼藥過也涼藥內傷其脾外水其血脾主肌

肉脾既受傷飲食必減顏色痿痺肌肉不生血爲脉絡無一受水則氣

不旺肌肉糜爛故必理脾脾健肉自生本方去木通少用當歸加厚朴

真是發則加白豆蔻

凡如癰疽之人有泄瀉者不可便服此藥宜先服蠟礬并止瀉後用

腸肚內癰宜十宣散與此方相間服之並宜加忍冬藤

腫毒堅硬不穿加川芎獨活麻黃蓮鬚葱煎服出汗即穿

傷折在頭上去木通加川芎陳皮一經年腰痛加葶藶玄胡索酒煎

脚氣加木瓜檳榔穿山甲水煎

痰飲為患或喘或咳或暈頭痛睛疼遍身拘急骨節痠疼胸背頭項腋

膀腰腿手足聚結腫硬或痛或不痛按之無血潮雖或有微紅亦淡薄

不熱堅如石破之無膿或有薄血或清水或如乳汁又有壞肉如破絮

或又如燥癩在皮肉之間如雞卵可移動軟活不硬破之亦無膿血針

口努肉突出惟覺咽喉痰貫結塞作寒作熱加南星半夏

神功散治癰疽發背一切疔毒并癩癧等症已成未成患者神效

川烏炮去皮尖 川黃柏多去粗皮各等分

右為細末用唾調成膏如唾少漱口水亦可發背癰疽等瘡總起者敷

患處留頂候藥乾用錫米水時常潤濕每日藥敷一次如瘡已成重患

將潰爛者先將槐枝艾葉煎湯頓溫將瘡洗淨用絹帛展去膿血以杏
 油潤患處用綿紙仍照患處煎成員錢留頂貼上後用藥塗於紙如此
 依前用淘米水潤日換一次聽其自然流膿不可手擠如敷藥後病人
 瘡覺往痛減熱即愈如生肌則腐肉自落痼如不落者剪割亦可最
 宜用針發背不宜貼膏藥凡醫瘡屏去別醫止飲別藥方可治忌氣怒
 房事勞復并孝服體氣飲酒之人飲食忌酒并雞羊魚肉瓜茄薑蒜之
 物若因氣怒反復發腫依前治之如治對口并腦疽不必洗去舊藥逐
 次添染恐動瘡口惹風也一腫毒加南星赤小豆等分醋調塗和油
 真人奪命飲治一切癰疽疔腫不問陰陽虛實善惡腫潰大痛或不
 痛然當服於未潰之先與初消之際如毒已失潰不可服仍用一劑大
 勢已退然後隨症調治其功甚捷誠仙方也

穿山甲

二大片切焙
粉炒成珠

天花粉

甘草節

乳香

明透者

皂角刺各五
分炒

赤芍

白芷各
錢

防風

貝母各七
錢

沒藥五分

僵皮一錢
半

歸尾一錢
半

金銀花三錢

右剉一劑好酒煎空心熱

外科

癰疽

四

用煎飲者服後再飯酒三五杯津再煎服在背愈倍皂角刺。在腹臍倍白芷。在胸次加瓜。在四肢倍金銀花。

○呂洞賓仙傳化毒湯。治癰疽發背乳癰一切無名腫毒初起服之立消已成已潰服之立愈。

防風 甘草節 白芷 茯苓 貝母 連翹 黃芩 白芍

天花粉 金銀花 各一分 半夏 七分 乳香 沒藥 各五分

右劉一劑好酒煎胸前。飯前服背上飯後服下部空心上部食後俱要

出汗為度如無汗用木香薰腳膝胸內被益汗出而愈。

○神仙排膿散一治惡瘡。毒風毒疔瘡背花瘡小兒惡瘡膿血俱從大便

中出亦治氣滯腹脹及婦人經閉不通此方壯實之人可用虛弱者減

大黃 十二兩酒漬 白芷 沉香 木香

乳香 沒藥 穿山甲 陳壁土炒

右各為細末量入虛者用之實者不過三錢虛者二錢半臨臥用新

酒調服服後禁飲食湯半日五更覺腹內疼痛動三三次以稀

酒調服服後禁飲食湯半日五更覺腹內疼痛動三三次以稀

補之服此藥內有穿山甲恐令人作嘔須慎之即嚼生葱可止凡修合此藥要誠意不可令婦人雞犬見又不可多合恐久故則不墓矣

芙蓉膏 治癰疽發背諸毒 芙蓉葉 或皮或根亦可 黃荆子

右各等分入石臼內搗極爛用雞子清調搽於瘡上留頂不過二次收

功頂如烟起立時止痛其效如神

一方治發背癰疽不問已潰未潰敷上立消止痛如神

白金鳳花科連根葉同搗爛先用陳米醋洗淨患處後敷藥一日一換

瘡將好用桑葉醋煮一滾即撈起貼瘡上即上肌收口而愈

潰瘍者癰疽之膿已潰出也

瘍潰內外皆虛宜以補接為王誤欲行地收者生防其虛實之失由是

言之則癰疽之腫時與潰時不同

癰疽已潰之後宜後方 李氏云疽已肝安生日常服十全大補湯以補氣血宜與于全內托散相間服

托裏消毒飲 治一切癰疽六七日未消者服此藥瘡未成即消已成

即潰能壯氣血固脾胃使毒氣不能內大防毒膿場潰肌肉易生切不

可單用生肌之恐毒未盡反潰爛難命

金銀花錢三

黃芪盤小

天花粉各二錢 防風

當歸酒洗

川芎

白芷

厚朴姜汁炒 桔梗

穿山甲炒成珠

草角刺炒各一錢

陳皮三錢

右判一劑酒水各一盞煎服瘡在上食後服在下空心服後用水煎服

○千金內托散

治癰疽瘡癤未成者涼敗已成者速潰敗膿自出不用

手擠惡肉自去不用刀針服藥後疾痛頓減此藥活血勻氣調胃補虛

祛風邪辟穢氣乃王道之劑宜多服之大効 加金銀花亦可

黃芪番炙

人參

當歸酒洗各一錢

川芎

防風

桔梗

白芷

厚朴姜汁炒

薄荷

甘草生用各一錢

右為細末每服三錢黃酒調下不飲酒木香湯調下亦可或都作一劑

用酒煎尤佳○癰疽腫痛倍白芷不腫痛倍官桂○不進飲食加砂仁

香昨○痛甚加乳香沒藥○木不乾加知母只母○瘡不穿加皂角

咳加半夏陳皮杏仁生薑五片○大便閉加大黃枳殼○小便澁加麥

冬車前子木通燈草

○十全大補湯 治癰疽潰後補氣血進飲食實為切要凡膿血出多陰
陽兩虛此藥有回生起死之功但不分經終不載時令醫者觸類而長
之可也或見腫平痛寬遂以為安慢不知省無補調養之功愈後虛証
復見因而轉為他病而危劇者多矣

○神仙蟻箸丸 治癰疽及肺癰腸癰能消毒固臟腑止疼痛護脂膜止
瀉病化膿癰疽潰後宜○兼治諸瘡毒粉瘤痰核三五年者半料即消
不問惡瘡新起者亦効 黃蠟二兩 白礬三兩

右為末溶蠟為丸如梧桐子大每服三十九丸酒下不飲酒熱水下一日
服三次肺癰瘰癧湯下咳嗽姜湯下

五善七惡主治

夫善者動息日寧飲食知味便利調合膿潰腫消水鮮不異神彩精明語
聲清朗體氣和平是也此屬腑症病微邪淺更能慎起居節飲食勿藥
惡者乃五臟虧損之症或因汗下失宜榮衛消鑠或因寒涼尅伐氣血不
足或因峻厲之劑胃氣受傷以致真氣虛而邪氣實外似有餘而內實

不足法當純補胃氣多有可生不可因其惡遂棄而不治

若大渴發熱或瀉泄淋閉者邪火內淫一惡也竹葉黃芪湯氣血復虛人珍湯加黃芪麥門冬五味

子山某莫如不應係以加減八味比同服

若膿血既泄腫痛尤甚膿色敗臭者胃氣虛而火盛二惡也人參黃芪湯

全大補湯加麥門五味

若目視不正黑睛緊小白睛青赤瞳子上視者肝腎陰虛而目系急三惡

六味丸加炒山梔麥冬五味子如不應用八珍湯加炒山梔麥冬五味子

若喘祖氣短恍惚嗜臥者脾肺虛火四惡也六君子加大棗生姜如不應

心志則冠肺全人交平肺散腹火傷肺六味丸加五味子煎服

若肩背不便四肢沉重者脾腎虧損五惡也補中益氣湯加山茱萸山藥

加山茱萸山藥五味

若不能下食服藥而嘔食不知味者胃氣虛弱六惡也六君子湯加水香

子附

若聲嘶已則唇鼻青赤面目四肢浮腫者脾肺俱虛七惡也補中益氣湯加人參生薑

如不應 用六君子湯加炮姜更不應
急加附子十全大補湯加附子炮姜

若腹痛泄瀉逆昏慣者陽氣虛寒氣內淫之惡症也急用托裏溫中湯

附子或加姜桂溫補

若有潰後發熱惡寒作渴或怔忡驚悸寤寐不常牙關緊急或頭目赤痛

自汗盜汗寒戰咬牙手撒身熱脉洪大按之如無或身熱惡衣欲投於

水其脉浮大按之微細衣厚仍寒此氣虛極傳變之惡症也

若手足逆冷肚腹疼痛泄痢腸鳴飲食不入呢逆嘔吐此陽氣虛寒氣

若有汗而又惡寒或無汗而惡寒口噤足冷腰背反張項項頭強此血氣

虛極變瘵之惡症也急用參芪歸木附子救之則有可生者

大抵五善見三則吉七惡見四必危虛中見惡症者難治實症無惡候者易治

六味丸又名六味地黃丸此壯水之劑夫人之午以腎為主凡病皆由

腎虛而致此方乃天一生水之劑無有不可用者世所罕知若腎虛發

熱作渴小便淋閉痰氣壅盛喘咳吐血頭目眩暈小便短少眼花耳聾

咽乾肉燥口熱齋裂齒不堅固腰腿痠軟五臟齊損肝經不足之症尤

當用之水能生木故也若腎虛發熱自汗盜汗便血諸血失瘡水泛為疾之聖藥血虛發熱之神劑也
熟地黃用生者自製 山茱萸酒浸去核取肉

山藥各四兩

白茯苓去皮

牡丹皮

澤瀉各三兩

右地黃酒蒸黑杵膏餘為末煉密丸如梧子大每服七八十丸滾水下

八味丸 治命門火衰不能生上以致脾上虛寒而思流注鶴膝等症

不能消潰收斂或飲食少思或食而不化臍腹疼痛夜多漩溺即六味

丸加肉桂附子各一兩經云益火之源以消陰翳即此方也

加減八味丸 治癰疽瘡瘍痊後及將痊口乾渴甚舌或生黃及未患

先渴此腎水不能上潤致心火上炎水火不能既濟故心煩燥小便頻

澀或白濁陰痿飲食減少肌膚瘦削諸症服此以生腎水降心火諸症

頓止及治口舌生瘡不絕

山藥

一兩

山茱萸

去核淨用 桂心去粗

澤瀉

白茯苓

去皮

牡丹皮

五錢

熟地黃

用生者半斤酒拌

右為末入膏加密少許同丸如梧子大

每服六七十丸五更初未言語前或空心用鹽湯送下

○補中益氣湯 治元氣虛損或因剋伐惡寒發熱肢體倦怠飲食少思

或不能起發消散生肌收斂或兼飲食勞倦頭疼身熱煩燥作湯脉洪

大弦虛或微細軟弱 黃芪蜜炙 人參 白朮去苦 甘草錢用一分

當歸一錢 陳皮五分 升麻 柴胡三分 右剉一劑 姜棗煎服

○四君子湯 治脾胃虛弱或因剋伐腫痛消不潰斂不能宜用此以補

脾胃諸症自愈若誤用攻毒七惡隨至脾胃虛弱飲食少思或食而難

化或欲作嘔或大便不實若脾胃氣虛癆瘵吐血面吐血 便血尤宜用之

蓋氣能攝血故也凡氣血俱虛之疴宜此湯但加當歸 脾胃既壯飲食

自進陰血自生若用四物湯沉陰之劑脾胃復傷諸症 蜂起若命門火

衰而脾土虛寒必用八味丸以補土母

人參 白朮去苦 茯苓各二錢 甘草一分 右剉一劑 姜棗水煎服

○六君子湯 治脾胃虛弱或寒涼剋伐腫痛不消或不潰斂宜服此湯

以壯榮氣諸腫愈即四君子湯加陳皮半夏

○八珍湯 治脾胃虛損惡寒發熱煩燥作渴或瘡瘍潰 後氣血虧損膿

水瀉稀久不能愈即四物四君子合方

十全大補湯 治瘡瘍氣血虛弱腫痛不愈或消瘍膿消寒熱自汗盜

汗食少體倦發熱作渴頭痛眩暈似中風狀即八珍湯加黃芪肉桂

托裏溫中湯 治瘡瘍膿潰元氣虛寒或因尅伐胃氣脫陷腸鳴腹痛

大便瀉泄神思昏憤此寒變內陷緩則不治

羌活 乾薑 炒附子 炮去皮臍 益智 丁香 沉香 水香

茴香 陳皮 各一錢 甘草 炙 三錢 白蠟 美水煎服

人參黃芪湯 治消瘍飲 少思無睡發熱 人參 陳皮 麥門冬

白朮 蒼朮 各五分 黃芪 一錢 歸身 升麻 各五分 黃柏 炒 白朮 煎服

竹葉黃芪湯 治癰疽氣血虛胃火盛而作渴

淡竹葉 錢 坊藥 麥門冬 半夏 川芎 葛蘂 石膏

黃芪 炒 人參 當歸 錢 生地 黃 錢 右剉作三劑水煎服

人參平肺散 治心火尅肺傳為疽癰咳嗽喘喘痰涎壅盛膈痞痞滿

咽嗑不利若因肝木太過而治當補肺若因腎水不足而治當補脾肺