

醫燈續焰卷四

錢塘後學潘 楫碩甫註

同邑社盟王佑賢聖翼評

門人 張文啓開之
校

沈晉垣亮宸

促結主病第三十二

陽盛則促。肺癰陽毒。陰盛則結。疝瘕積鬱。

數脉時見一止。名曰促。數則爲熱。爲陽盛。主上焦

榮行脉中衛
行脉外道雖

不同彼此相
將今脉數則
知爲陽盛矣
時一止者榮
不將衛故促
脉遲則知爲
陰盛矣時一
止者衛不將
榮故結此亦
促結之義
効象形容於
此更覺顯然

熱聚成毒。或熱聚肺成癰。

陽毒宜清散。如黃芩花
粉連翹枳壳荆防之類。

肺癰宜清解。如仲
景桔梗湯之類。

脉氣流行。爲其阻礙。故一止也。

不數而緩。時見一止。名曰結。爲陰盛。主陰分或腹

中聚疝瘕。

宜元戎萬病紫苑丸。寶鑑
沉香桂附丸之類。

久積成鬱。氣

堅結不散。脉氣至此。亦爲所礙。故一止也。難經十

八難曰。結甚則積甚。結微則積微。是又當審止歇

之多寡而斷病之輕重耳。

附方

佐賢曰此方
治肺癰如神
但桔梗須北
產味苦并多
去蘆頭為妙

仲景桔梗湯 金匱要略云。欬而胸滿。振寒脉數。

咽乾不渴。時出濁唾腥臭。久久吐膿如米粥者。
為肺癰。又治心藏發咳。咳而喉中如梗狀。甚則
咽腫喉痺。亦治血痺。

桔梗

一兩

甘草

二兩

右二味以水三升。煮取一升。分溫再服。則吐膿
血也。

元戎萬病紫苑丸 治臍腹久患痞癖如碗大。及

諸黃病。每地氣起時。上氣衝心。繞臍絞痛。一切
虫咬。十種水病。十種蠱病。及反胃吐食。嘔逆惡
心。飲食不消。天行時病。女人多年月露不通。或
腹如懷孕多血。天陰卽發。又治十二種風。頑痺
不知年歲。晝夜不安。夢與鬼交。頭多白屑。或哭
或笑。如鬼魅所著。腹中生瘡。腹痛。服之皆効。

紫苑

去苗

菖蒲

九節者
去毛

吳茱萸

湯洗七
次焙乾

柴胡

去
鬚

厚朴

薑製
一兩

桔梗

去
蘆

茯苓

去皮

皂莢

去皮弦子炙

桂枝

乾薑

炮

黃連

去鬚八錢

巴豆

去皮膜出油研

人參

去蘆

羌活

獨活

防風

各半兩

蜀椒

去目及開口者微炒出汗

川烏

炮去皮臍半兩加三錢

右爲細末。入巴豆研勻。煉蜜丸如桐子大。每服

三丸。漸加至五丸七丸。生薑湯送下。食後臨卧

服。孕者不宜服。

此方分兩。一依元板善本校定。厚朴黃連下。有分兩而無各字。

川烏乃云半兩加三錢。不知何謂。考溫白朮方。惟川烏二兩半。餘藥各半兩。亦恐有訛。重於變古。姑仍之。

痔漏腸風酒下 赤白痢訶子湯下 膿血痢

米飲湯下 墮傷血悶四肢不收酒下 蛔虫

咬心檳榔湯下 氣噎憂噎荷葉湯下 打撲

損傷酒下 中毒蒂灰甘草湯下 一切風升

麻湯下 寸白虫檳榔湯下 霍亂乾薑湯下

咳嗽杏仁湯下 腰腎痛豆淋酒下 陰毒

傷寒溫酒下 吐逆生薑湯下 飲食氣塊麵

湯下 時氣井花水下 脾風陳皮湯下 頭

痛水下 心痛溫酒下 大小便不通燈草湯

下 因物所傷以本物湯下 吐水梨湯下

氣病乾薑湯下 小兒天弔風搐防風湯下防

已亦可 小兒痺痢葱白湯下 小兒乳食傷

白湯下 月信不通紅花酒下 婦人腹痛川

芎酒下 懷孕半年後胎漏艾湯下 有子氣

衝心酒下 產暈痛溫酒下 血氣痛當歸酒

下 產後心腹脹滿豆淋酒下 難產益智湯

下 產後血痢當歸湯下 赤白帶下酒煎艾

湯下 解內外傷寒粥飲下 室女血氣不通

酒下 子死腹中葵子湯下 又治小兒驚癇

大人顛狂一切風及無孕婦人身上頑麻狀如

虫行四肢俱腫呻吟走痛等疾 楊駙馬患風

氣衝心飲食吐逆遍身枯瘦日服五丸至七丸

至二十日。瀉出肉塊如蝦蟆五六枚。白膿二升。

愈。趙侍郎先食後吐。目無所見。耳無所聞。服

至五十日。瀉青蛇五七條。長四寸許。惡膿三升。

愈。王氏患大風。病眉髮墮落。手掌生瘡。服之

半月。瀉出癩虫二升。如馬尾。長寸許。後愈。李

靈患肥氣。日服五丸。經一月。瀉出肉鼈三枚。愈。

茹黃門。卒中風。病發時服藥。瀉出惡膿四升。

赤黃水一升。一肉虫如亂髮。愈。李知府妻楊

氏帶下病七年。月崩不止。骨痠着床。日服五丸。至十丸。十五丸。取下膿血五升。黃水一升。肉塊如雞子狀愈。此藥治一切萬病如神。唯初有孕者不宜服。

寶鑑沉香桂附丸 治中氣虛弱甚。脾胃虛寒。藏府積冷。心腹疼痛。手足厥逆冷。便利無度。七疝引痛不可忍。喜熱熨少緩者。

沉香

附子

炮

川烏

炮

乾薑 炮

良薑

官桂

吳茱萸

湯泡去苦水

茴香

炒各一兩

右末。好醋煮糊丸。梧子大。每五十丸。至七八十丸。空心米飲下。

代脉主病第三十三

代則氣衰。或泄膿血。傷寒心悸。女胎三月。

代亦歇止之脉。但促結之止。內有所礙。雖止而不

全斷。中有還意。代則大止不還。下復至。如更代者。

內有所碍之結。促與氣衰之代脉。乃虛實生死之分。

大要着意

悸者心氣不寧而動也

非元氣衰微之甚。不至此也。泄膿血者。則榮血耗

竭。隧道空虛。故見此欲脫不續之狀。

素問脉要精微論云。數動

一代者。病在陽之脉也。洩及便膿血。傷寒心悸。有中氣虛者。有停飲

者。有汗下後者。中氣虛。則陽陷。陽受氣于胸中。陽

氣陷。則不能上充于胸中。故悸。

宜黃耆建中湯之類

停飲者

飲水多而停于心下也。水停心下。水氣上凌。心不

自安。故悸。

宜小青龍湯之類

汗後則裏虛矣。况汗乃心液。

心液耗。則心虛。心虛故悸。

宜炙甘草湯黃耆建中湯之類

諸悸者。

余每見半產者多在三五七月按三月心五月脾七月肺蓋婦人于此三經不調者多至期當養不養則胎孕爲之不安下血而墮今按月依經視其氣血虛實而調之自能保全足月其或外感內傷等症各宜

未必皆脉代。今脉代者。正指汗後之悸。以汗爲心液。脉爲心之合耳。女胎十月而產。府藏各輸真氣。資次培養。一月之時。足厥陰脉養之。足厥陰者。肝也。二月。足少陽脉養之。足少陽者。膽也。三月。手厥陰脉養之。手厥陰者。心包絡也。四月。手少陽脉養之。手少陽者。三焦也。五月。足太陰脉養之。足太陰者。脾也。六月。足陽明脉養之。足陽明者。胃也。七月。手太陰脉養之。手太陰者。肺也。八月。手陽明脉養

之手陽明者。大腸也。九月。足少陰脉養之。足少陰者。腎也。十月。足太陽脉養之。足太陽者。膀胱也。是以諸經脉各養三十日也。若至期當養之經。虛實不調。則胎孕爲之不安。甚則下血而墮矣。十二經中。獨心與小腸不養胎者。何歟。夫心爲牡藏。小腸爲之府。主生血而合脉。素問平人氣象論曰。藏真通于心。心藏血脉之氣也。有孕。則經血不通。許學士所謂妊娠閉經。隧以養胎者是也。平人氣象論

又曰。婦人手少陰脉動甚者。姪子也。歷觀經論。是知胎以血爲體。而始終十月。皆賴乎心。自不當在輪養中。又分次第矣。三月之時。心胞絡養胎。靈樞經脉篇云。心包主脉。若分氣及胎。脉必虛代。在五藏生成篇。又云。心合脉。蓋心與心胞。雖分二經。原屬一藏故耳。

附方

黃耆建中湯

見第二十一

梔曰。心主脉其液汗。汗後心虛。故心悸而脉歇。麥冬

生液本經主

胃絡脉絕生

地養血本經

主折跌絕筋

皆續絕聖藥

阿膠乃驢皮

濟水煮成經

水篇云心合

濟水五藏生

成篇云肺合

皮毛所謂毛

脉合精而成

寸者不巧似

乎况人參補

藏真而生脉

大棗脾果耳

仲景小青龍湯

見第十六

仲景炙甘草湯

傷寒論云傷寒脉結代。心動悸。

炙甘草湯主之。

甘草

炙四兩

生薑

切三兩

桂枝

去皮三兩

人參

二兩

生地黄

一斤

阿膠

二兩

麥門冬

去心半升

麻子仁

半升

大棗

擘十二枚

右九味。以清酒七升。水八升。先煮八味。取三升

去滓。內膠烱消盡。溫服一升。日三服。一名復脉