

欽定四庫全書

子部

傷寒總病論卷四



北京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

傷寒總論卷四

暑病論

口冬傷於寒，夏至後至三伏中，變為暑病，其重溫也。如傷寒依三陽三陽傳見，其臧熱證者，各隨證治。

朱寵安時撰

如陽寒依三陽傳見

藏熱證者各隨證治

不亦不

暑病代桂枝并葛根證

桂枝

芍藥

知母

生薑

各一兩半

甘草

一兩

黃芩

半兩

葛根

二兩

棗

十六枚

呔咀水六升煮取三升通口服一盞相次取汗

暑病代麻黃證

桂枝

杏仁

知母

各一兩

麻黃

三兩

甘草

黃芩

各一兩

煎如前法

暑病代青龍湯証

麻黄二兩石膏三兩知母桂枝甘草各一兩杏仁三十枚

生薑一兩半棗十六个

如前煎服

暑病代葛根麻黄證

葛根二兩麻黄一兩半桂枝甘草知母黄芩芍

藥各一兩生薑一兩半棗十六个

如前煎服

暑病三日外至七日不歇内熱令人更相染大青消毒

湯

大青

芒硝

各二兩

山梔子

一兩

石膏

四兩

二升濕地黃

半升

呔咀水七升煮取三升去滓下芒硝化之溫服一盞

以熱除為度

暑病通用白虎一如傷寒與喝證用之

方在厥陰證中

暑病通用麥奴丸

方在雜汗證中

暑病若吐下後別見形一如傷寒門治之

暑病噦逆發斑瘡痘壞一如溫病門治之

已上四條先生所論

預防熱病急黃賊風葛粉散

葛粉二升生乾地黄一升香豉半升

細末食後服方寸匕牛乳蜜湯竹瀝米飲烏梅湯任

性調下日三服有病者日五服

素問載五種暑病

肝熱病者先左頰赤肺熱病者先右頰赤心熱病者顏

先赤顏額也腎熱病者頤先赤頤頰也脾熱病者鼻先赤上主

中病雖未發見赤色刺之名曰治未病

肝熱病者先小便黃腹痛多卧身熱熱爭則狂言及驚脅滿痛手足躁不安卧庚辛甚甲乙大汗氣逆則庚辛死刺足厥陰少陽其逆則頭痛員員脉引衝頭也

心熱病者先不樂數日乃熱熱爭則卒心痛煩悶喜嘔頭痛面赤無汗壬癸甚丙丁大汗氣逆則壬癸死刺手少陰太陽

脾熱病者先頭重煩痛心煩顏青欲嘔身熱熱爭則腰

痛不可俛仰腹滿泄兩頷痛甲乙甚戊己大汗氣逆則
甲乙死刺足太陰陽明

肺熱病者洗淅然厥起毫毛惡風寒舌上黃身熱熱爭
則喘咳痛起走胃膺背不得太息頭痛不任汗出而惡
寒丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死刺手太陰陽明出
血如豆大立已

腎熱病者先腰痛眵痾舌渴數飲水身熱熱爭則項痛
員員澹澹然戊己甚壬癸大汗氣逆則戊己死刺足少

陰太陽諸汗者至其所勝日汗出也

龐曰五種熱病肝腎二藏有逆證心脾肺三藏亡逆證凡五種熱病二三日逢尅未為逆忌在五六日也

時行寒疫論

病源載從立春節後其中無暴大寒又不冰雪而人有壯熱病者此屬春時陽氣發於冬時伏寒變為溫病也從春分以後至秋分節前天有暴寒皆為時行寒疫也三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱為寒所折病熱猶

輕五月六月陽氣已盛為寒所折病熱則重七月八月
陽氣已衰為寒所折病熱亦微其病與溫病暑病相似
但治有殊耳其治法初用摩膏火灸唯二日法鍼用崔
文行解散汗出愈不解三日復發汗若大汗而愈不解
者勿復發汗也四日服藜蘆丸微吐愈若病困藜蘆丸
不吐者服赤小豆芡蒂散吐之已解視病尚未了者
復一法鍼之當解不解者六日熱已入胃乃與雞子湯
下之愈無不如意但當諦視節度與病耳食不消病亦

如時行俱發熱頭痛食病當速下之時病當待六七日
時病始得一日在皮二日在膚三日在肌四日在胃五
日入胃入胃乃可下也熱在胃外而下之熱乘虛入胃
然要當復下之不得下多致胃爛發斑微者赤斑出五
死一生劇者黑斑出九死一生人有強弱相倍也病者
過日不以時下之熱不得泄亦胃爛斑出矣若得病無
熱但狂言煩躁不安精神言語不與人相主當者治法
在可水五苓散證中

此巢氏載治時行寒疫之法焉溫
病暑病相似但治有殊者據溫病

無摩膏火灸又有冬溫瘡痘更有四時藏腑陰陽毒又
夏至後有五種熱病時令盛暑用藥稍寒故治有殊也

時行寒疫治法

初得時行赤色頭痛項強兼治賊風走注寒痺趙泉黃
膏

大黃 附子 細辛 川椒 乾薑 桂枝

各一兩

巴

豆

五十粒

以咀苦酒漬一宿以臘月猪膏一斤煎調火三上三
下去滓收之傷寒赤色熱酒調服梧桐子大一枚又

以火摩身數百遍兼治賊風最良風走肌膚追風所
在摩之神效千金不傳

崔文行解散時氣不和傷寒發熱

桔梗炒細辛各四兩白朮八兩烏頭炮一斤

細末傷寒服一錢五銖匕不覺復小增之以知為度
若時氣不和旦服一錢五銖匕辟惡欲省病一服了
去此時行寒疫通用之無病者預服以辟寒為佳皆

酒調下

藜蘆散辟溫疫傷寒

藜蘆

躑躅

乾薑

各四分

牡丹皮

皂角

各五分

細辛

附子

各三分

桂枝

朱砂

各一分

末之絳囊帶一方寸匕男左女右臂上着之覺有病之時更以粟米大內鼻中酒服一錢匕覆取汗日再當取一汗耳

赤小豆瓜蒂散在厥陰證中

雞子湯治熱盛狂語欲走

生雞子

七枚芒硝一兩

井華水一大升同攪千遍去沫頻服之快利為度

猪苓散即傷寒門五苓散也在可水證中

已上五方載巢氏治時行

寒疫合用之方

龐曰摩膏火灸可行於西北二方餘處難施莫若初服解散赤散之類如轉發熱而表不解乃行後四方為佳
天行壯熱煩悶無汗者麻黃葛根湯

麻黃

五兩葛根四兩

麤末每服五錢水二盞梔子二个蔥白五十豉一撮

煎八分去滓沫溫溫相次四五服取汗止後服

天行一二日麻黃湯

自汗者去麻黃加葛根二兩

麻黃

二兩

石膏

一兩

貝齒

五个無

升麻

甘草

芍藥

各一

杏仁

四十

兩

麤末每服五錢水二盞煎八分溫服取汗止後服

葛根解肌湯汗後表不解宜服此

自汗者去麻黃

葛根

四兩

麻黃

芍藥

大青

甘草

黃芩

桂枝