

卷八

卷八

頭痛

心腹痛

腰痛

痢

小便閉澀



卷九

大便不通

小便不通

小便不禁

遺精

赤白濁

痰飲

欬嗽

喘

掃葉山房重校醫宗必讀卷之八

雲間李中梓士材父著

門人李立度公超父叅

姪孫李廷芳蘅伯父訂

頭痛

經曰風氣循風府而上則爲腦風新沐中風則爲首風首風之
狀頭面多汗惡風當先風一日則病甚頭痛不可以出內至其
風日則病少愈風府者督脉穴入項髮際一寸太陽之脉連于
沐則腠開風客乃爲首風風傷衛則汗出而惡風風爲陽邪故
先風一日則病發先甚者亦先衰故至其風日則病少愈也
頭痛數歲不已當犯大寒內至骨髓髓以腦爲主腦逆故頭痛
齒亦痛名曰厥逆髓以腦爲主者諸髓皆屬於腦也夫寒入髓
則腦痛其邪深故數歲不已髓爲骨之充齒
者骨之餘也故頭痛齒亦頭痛巔疾下虛上實過在足少陰巨
痛是邪逆於上故名厥逆太陽之脉交巔上其支別者從巔至耳上角
陽頭痛巨陽病也太陽之脉交巔上其支別者從巔至耳上角
其直行者從巔入絡腦下虛少陰腎虛也上實巨陽膀胱實

也腎虛不能攝巨陽之氣頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生耳
故虛邪上行而為頭痛也耳鳴也九竅不利者氣虛不能達也腸胃
者七衝門之道路氣之所以往來者也氣虛則不能上升於巔
頂故頭痛甚則腦盡痛手足寒至節死不治三陽受邪伏而不
去久則陽氣敗絕
故手足之寒
上至於節也

愚按經之論頭痛風也寒也虛也運氣論頭痛十條傷寒論太
陽頭痛一條皆六氣相侵與真氣相薄經氣逆上干於清道不
得運行壅遏而痛也頭為天象六府清陽之氣五藏精華之血
皆會於此故天氣六淫之邪人氣五賊之變皆能相害或蔽覆
其清明或瘀塞其經絡與氣相薄鬱而成熱脉滿而痛若邪氣
稽留脉滿而氣血亂則痛乃甚此實痛也寒溼所侵真氣虛弱
雖不相薄成熱然邪客於脉外則血泣脉寒卷縮緊急外引小
絡而痛得溫則痛止此虛痛也因風痛者抽掣惡風因熱痛者

煩心惡熱因濕痛者頭重而天陰轉甚因痰痛者昏重而欲吐不休因寒痛者紉急而惡寒戰慄氣虛痛者惡勞動其脉大血虛痛者善驚惕其脉芤頭痛自有多因而古方每用風藥何也高巔之上惟風可到味之薄者陰中之陽自地升天者也在風寒濕者固爲正用卽虛與熱者亦假引經須知新而暴者但名頭痛深而久者名爲頭風頭風必害眼者經所謂東風生於春病在肝目者肝之竅肝風動則邪害空竅也察內外之因分虛實之證胸中洞然則手到病去矣

風溼挾熱頭痛上壅損目及腦痛偏正頭痛年深不愈

並以清空膏主

之痛甚如細辛痰厥頭痛太陰脉緩

清空膏去羌活防風加半夏天麻

陽明頭痛發熱

惡熱而渴

白虎湯加白芷

腎厥頭痛卽經所謂下虛土實其脉舉之則

弦按之則堅

玉真丸來復丹

傷食頭痛胸滿噯酸噫敗卵與惡食雖發

熱而身不痛

香砂枳米丸

傷酒頭痛

葛花解醒湯

怒氣腸肝

沉香降氣散蘇子降氣湯

頭痛九竅不利屬氣虛

補中益氣湯加芍藥川芎細辛

眉尖後近髮際曰魚尾

魚尾上攻頭痛屬血虛

四物湯加薄荷

動作頭痛胃熱也

酒炒大黃五錢濃茶煎服

心煩頭痛

清室膏加麥門冬丹參

上熱頭痛目赤下寒足脣為甚大便微

秘既濟解

偏頭風

半邊頭痛

左為血虛右屬氣熱

萆薢子五錢去殼大棗十

五枚去核共搗研如泥塗綿紙上用筋一隻捲之去筋納鼻中

良久取下清涕即止

生蘿蔔汁仰臥注鼻中左痛注右右痛

注左 芎犀丸極效

雷頭風

頭痛而起核塊或頭中如雷鳴

震為雷震仰孟用青荷葉者象震之形

與色也

清震湯

有因痰火耳如雷鳴

熱半夏一兩大黃煨二兩天麻黃芩各六錢薄荷葉三錢

甘草二錢水泛菜豆大臨回茶吞二錢痰利為度

頸頭痛

手足青至節且發
夕死夕發旦死

腦為髓海受邪則死炙百會穴猛進

大劑參附亦有生者

大頭痛

頭大如斗此
天行時疫也

感天地非時之氣甚而潰裂出膿此邪客

上焦

普濟消
毒飲子

輕者名發頤腫在兩耳前後

甘桔湯加薄荷荆芥
鼠粘子連翹黃芩

眉稜骨痛外挾風寒內成鬱熱上攻頭腦下注目睛眉骨作痛

有屬心肝壅熱者有風痰上攻者有濕氣肉鬱者

選奇湯
神效戴元

禮云眼眶痛有二證俱屬肝經肝虛見光則痛

生熟地
黃丸

肝經停

飲痛不可開晝靜夜劇

導痰
湯

脉候寸口緊急或短或弦或浮皆頭痛

浮滑為風痰易治

短濇為虛難治

浮弦為風

浮洪為火

細或緩為溼

少宰蔣恬菴頭痛如破昏重不甯風藥血藥痰藥久治無功余

曰尺微寸滑腎虛水泛為痰也地黃四錢山藥丹皮澤瀉各一

錢茯苓三錢沉香八分日服四貼兩日輒減六七更以七味丸人參湯送五日其痛若失

清室膏

丹溪曰東垣清室膏諸般頭痛皆治惟血虛頭痛從魚尾相連者勿用太陽厥陰巔頂痛宜來復丹等亦非此

藥所
能治

羌活

防風

各一兩

柴胡七錢

川芎五錢

甘草炙一兩半

黃連

炒一兩

黃芩

三兩一半生用一半酒炒

爲細末每服三錢茶調如膏抹在口中少用白湯臨卧送下

白虎湯

見中暑

安神丸

治鬱熱頭痛

黃耆

羌活

黃檗

酒炒各一兩

防風

二錢半

知母

酒炒

生地黃

酒潤

柴胡

升麻

各五分

炙甘草

三錢

生甘草三錢

每服五錢水二鍾煎至鍾半加蔓荊子五分

川芎三分煎至一鍾臨卧熱服

透頂散 治新久偏正頭風及夾腦風

細辛 表白者 二莖 七個 丁香 三粒 糯米 七粒 冰片

麝香 各一 分半

將冰麝研細將前味研勻另自治為末後人乳鉢內與冰麝

和勻磁瓶蜜同用一大豆許隨患人左右搐之久出涎則安

大川芎丸 治風寒痰飲偏正頭疼

川芎 一觔 天麻 四兩 為末蜜丸每丸一錢 每服一丸食後茶酒下

玉壺丸 治風痰吐逆頭痛目眩胸滿吐涎

南星 生 半夏 生各 一兩 天麻 半兩 白麵 三兩

為末水丸桐子大每服三十九丸用水一碗先煎沸下藥煮候

藥浮即熟漉起生薑湯下

玉真丸 腎虛逆上頭痛謂之腎厥

硫黃

二兩

石膏

煨赤研

半夏

湯洗

硝石

研各一兩

爲末生薑汁九桐子大陰乾每服二十九薑湯下炙關元百

壯寒甚者去石膏用鍾乳粉

來復丹

見中暑

葛花解醒湯

見泄瀉

沉香降氣散

治氣壅痞塞頭痛

沉香

二錢八分

砂仁

七錢五分

甘草

炙五錢五分

香附

鹽水炒去毛六兩二錢半

爲極細末每服二錢淡薑湯下

蘇子降氣湯

虛陽上攻氣不升降痰涎壅盛

蘇子

炒研

半夏

湯泡各二錢半

前胡

去蘆

甘草

炙

厚朴

薑製

陳皮

去白各一錢

當歸

去蘆一錢半

沉香

七分

水二鍾生薑三片煎一鍾服

虛寒者加桂五錢

既濟解毒湯

治上熱頭目赤腫而痛煩悶不得安卧下體寒足肘尤甚大便微秘

大黃勿用
黃連酒炒
黃芩酒炒
甘草炙
桔梗各二錢

柴胡
升麻
連翹
當歸身各一錢

水一鍾煎一鍾食後服

神芎散 治風熱上攻頭痛鼻塞

青黛二錢五分
蔓荊子
川芎各一錢二分
鬱金
芒硝各一錢

石膏二錢
細辛根一錢
薄荷葉二錢
紅豆一粒為細末摘鼻

茶調散 治風熱上攻頭目昏痛

黃芩酒浸炒
川芎一兩
細茶三錢
白芷五錢
薄荷三錢

荊芥穗四錢
為細末每服三錢茶送下
蘇木蔓荊子各三錢

菊花散 治風熱頭痛

甘菊花去蒂
旋覆花去梗
防風
枳殼去蘂炒
羌活

蔓荊子
石膏
甘草炙各一錢五分

水二鍾薑五片煎一鍾服

芎藭丸

治偏正頭風鼻流臭涕服他藥不效者服此決效

川芎

硃砂水飛

石膏研

片腦各四兩

人參

茯苓

甘草炙

細辛各二兩

犀角

梔子各一兩

麥門冬

去心三兩阿膠炒半

為末蜜丸彈子大每服一九

茶送

清震湯

治頭面疙瘩或聞雷聲

青荷葉

一個全用升麻錢四

蒼朮

四錢

水二鍾煎八分食後服

黑錫丹

治真頭痛

沉香

附子製

葫蘆巴

肉桂各五錢

茴香

破故紙

肉豆蔻

金鈴子

木香各一兩

黑錫

硫黃

與黑錫結砂子各兩

為末研勻酒煮麵糊丸桐子大陰乾

每服五錢空心薑鹽湯送下

一方有陽起石五錢巴戟一兩

普濟消毒飲子

治大頭瘟

腫甚者宜
砭刺之

黃芩

黃連

各八分

人參

五分

橘紅

玄參

甘草

生各四分

馬屁勃

牛旁子

板藍根

連翹

白殭蚕

炒

升麻

各二分

柴胡

桔梗

各五分

薄荷

六分

水二鍾煎一鍾服便秘加酒煨大黃一錢

選奇湯

治眉稜骨痛

防風

羌活

各三錢

黃芩

酒炒一錢

甘草

三錢夏生冬炙

每服三錢水煎熱服

生熟地黃丸

治肝虛頭痛目暗

生地黃

熟地黃

各一兩半

甘菊

去蒂一兩

石薺

枳殼

防風

牛膝

各六兩

羌活

杏仁

各四兩

爲末蜜丸桐子大每服三錢以黑豆三升炒令烟盡淬好酒

六升每用半鍾食前送下

導痰湯 治痰飲頭痛

半夏 熟四兩

天南星 炮去皮

赤茯苓 去皮

枳實 炒

橘紅 各一兩

甘草 炙五錢

每服四錢水一鍾薑十片煎八分食後服

心腹諸痛

心痛

胃脘痛 少腹痛

胸脇痛

經曰厥心痛與背相控善瘕如從後觸其心偃僂者腎心痛也

腹脹胸滿心痛尤甚胃心痛也如以錐針刺其心心痛甚者脾

心痛也色蒼蒼如死狀終日不得太息肝心痛也卧若徒居心

痛間動作痛益甚色不變肺心痛也○陽明有餘上歸於心滑

則病心疝心痛引少腹滿上下無定處漫便難者取足厥陰心

痛腹脹齧然大便不利取足太陰心痛短氣不足以息取手太

陰心痛引背不得息取足少陰

兩章論心痛凡十種皆他藏病干之而痛非本經自病也

愚按內經之論心痛未有不兼五藏爲病者獨詳於心而略於胸腹舉一以例其餘也心爲君主義不受邪受邪則本經自病名真心痛必死不治然經有云邪在心則病心痛喜悲時眩仆此言胞絡受邪在府不在藏也又云手少陰之脉動則病隘乾心痛渴而欲飲此言別絡受邪在絡不在經也其絡與府之受邪皆因怵惕思慮傷神涸血是以受如持虛而方論復分九種曰飲曰食曰熱曰冷曰氣曰血曰悸曰蟲曰疰苟不能徧識病因將何以爲治耶胃屬濕土列處中焦爲水穀之海五藏六府十二經脉皆受氣於此壯者邪不能干弱者着而爲病偏熱偏寒水停食積皆與真氣相搏而痛肝木相乘爲賊邪腎寒厥逆爲微邪挾他藏而見證當與心痛相同但或滿或脹或嘔吐或不能食或吞酸或大便難或瀉利面浮而黃本病與客邪必參

雜而見也胸痛卽膈痛其與心痛別者心痛在歧骨陷處胸痛則橫滿胸間也其與胃脘痛別者胃脘在心之下胸痛在心之上也經曰南風生於夏病在心俞在胸脇此以胸屬心也肝虛則胸痛引背脇肝實則胸痛不得轉側此又以胸屬肝也夫胸中實肺家之分野其言心者以心之脉從心系卻上肺也其言肝者以肝之脉貫膈上注肺也脇痛舊從肝治不知肝固內舍肱脇何以異於心肺內舍膺脇哉若謂肝經所過而痛何以異於足少陽手心主所過而痛者哉若謂經脉挾邪而痛何以異於經筋所過而痛者哉故非審色按脉熟察各經氣變卒不能萬舉萬當也且左右肺肝氣血陰陽亦有不可盡拘而臨證者可無詳察耶復痛分爲三部臍以上痛者爲太陰脾當臍而痛者爲少陰腎少腹痛者爲厥陰肝及衝任大小腸每部各有五

賊之變七情之發六氣之害五運之邪至紛至博苟能辨氣血虛實內傷外感而為之調劑無不切中病情矣

心痛有停飲則惡心煩悶時吐黃水甚則搖之作水聲小胃丹或胃苓

湯食積則飽悶噫氣如敗卵得食輒甚香砂枳木丸火痛忽增

忽減口渴便秘清中湯外受寒內食冷草豆蔻丸虛寒者歸脾湯加氣

壅攻刺而痛沉香降氣散死血脉必澁飲下作呃手拈散甚者心痛

而煩發熱動悸此為虛傷炒香散蟲痛面上白瘰唇紅能食或食

後即痛或痛後即能食或口中沫出上半月蟲頭向上易治下

半月重頭向下難治先以鷄肉汁或蜜糖飲之引蟲頭向上隨

服剪紅丸虻蟲嚙心痛有休止或吐虻蟲動則惡心嘔吐烏梅

散黃鬼疰心痛昏憤妄言蘇合香丸熱厥心痛金鈴子散寒厥心痛尤附

胃脘痛治法與心痛相倣但有食積按之滿痛者下之大柴胡湯虛

寒者理中湯

胸痛肝虛者痛引背脇補肝湯肝實者不得轉側喜太息柴胡疏肝散

有痰二陳湯加薑汁

脇痛左痛多留血代抵當湯右痛多痰氣痰二陳湯左為肝邪枳實散

右為肝移邪於肺推氣湯挾寒理中湯加枳殼死血日輕夜重或午後熱

脉瀼或芤桃仁承氣湯痰飲導痰湯加白芥子食積有一條扛起者是

也枳朮丸加吳茱萸肝火盛龍薈丸虛冷理中湯送黑錫丹肝脉軟補肝湯

驚傷脇痛桂枝散

腹痛芍藥甘草湯主之稼穡作甘甘者已也曲直作酸酸者甲也甲已

化土此仲景妙方也脉緩傷水加桂枝生薑脉洪傷金加黃芩

大棗脉澀傷血加當歸脉弦傷氣加芍藥脉遲傷火加乾薑綿

綿痛而無增減欲得熱手按及喜熱飲食其脉遲者寒也香砂理中