

訂正東醫寶鑑外形篇卷之三

御醫忠勤貞亮庵 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許泰教撰

胸

胸膈之名有義

謂夫人之胸者呼吸之所經飲食之所過一或失節則疾病相氣交至於胸中乃有凶之兆故謂之胸也(入式)○膈膜在心肺之下與背脊胸腹周圍相著如幕不漏蓋胸者膈也遮膈

濁氣不使上熏於心肺故謂之膈也(入門)

胸膈度數

胸圍四尺五寸缺盆以下至臑脇長九寸(靈樞)

胸膈部位

膈者心肺之分野也(綱目)○胸腹者藏府之郭也膈中者心王之宮域也(靈樞)○咽之下胃脘也膈與肺系相連在肺系之後其上下即咽門也胃脘之下即胃之上口也(謂之貴門其膈膜

相貼之間亦漫脂相包也(入門)○胃脘(作管)膈與心肺相通膈膜相綴也(謂之貴門其膈膜在心下橫膈膜之上豎斜膈膜之下與橫膜相黏黃脂漫包者心也漫脂之外細筋膜如絲與心肺相連此包絡也(入門)

臟腑經脈皆膈

手太陰之脈上膈屬肺○手陽明之脈下膈屬大腸○足陽明之脈下膈屬胃絡脾○足

下膈屬小腸○足少陰之脈上膈貫肝膈○手厥陰之脈下膈歷絡三焦○手少陽之脈下膈偏屬三焦

○足少陽之脈貫膈絡肝屬膽○足厥陰之脈上貫膈布脇肋○已上十一經皆貫膈惟足太陽循下

脈法

脈陽微陰弦則胸痹而痛陽微故知在上焦陰弦故知胸痹心痛(仲景)○胸痹痛寸口脈沈而遲關

脈上小緊而數(仲景)○心腹脹痛宜見沈細不宜見浮大(得效)○心腹脹痛宜沈細忌浮大弦長(醫鑑)

在尺脈象顯然(脈訣)○胸痞脈滑為有痰結弦伏亦痞滿則氣劣(脈)○心痛左手脈數熱多也

脈滿有死血也右手脈緊實是痰積也脈大必是久病也兩手脈堅實不大便可下之痛甚者脈必伏

(丹心)○痞病右關脈多弦滑而遲者必心下(正傳)心脈微急為痛微大為心痹引背痛短而數

或瀉者心痛(正傳)

心痛與胃脘痛病因不同

心之包絡與胃口相應往往脾痛連心或陽虛陰厥亦令心下急痛(直指)○真

作有時經久不得差也(得效)○胃之上口名曰賁門賁門與心相連故經所謂胃脘當心而痛今俗呼為心痛者誤也夫九種心痛詳其所由皆在胃脘而實不在於心也(正傳)○胃脘當心而痛脾藏連心而痛局方皆云心痛蓋心痛少而脾胃痛居多心痛因傷思慮脾胃痛因傷飲食或痰飲故也(入門)○心病者府中痛(內經)諸經心痛引背多屬風冷諸胸心痛難俛仰嘔瀉多屬熱(入門)

心痛有九種

一曰虫二曰症三曰風四曰悸五曰食六曰飲七曰冷八曰熱九曰去

手拈散

治九種心痛及心脾痛極驗詩曰草果玄胡索

九痛丸

治九種心痛及積冷心胸痛炮附子三兩吳茱萸人參乾薑炮巴豆去

通靈散

治九種心痛黃五靈脂各一兩木通赤芍藥

拈痛丸

治九種心痛乾薑生七錢半五靈脂木香當歸蓬朮各

蟲心痛

胃脘痛痛定便能食時作時止者是虫痛也(丹心)○心痛吐水者虫痛不吐水冷心痛(綱目)○虫痛之證心腹痛上下攻刺嘔噦涎沫或吐清水面色青黃宜化虫丸化虫散妙應丸(二方並見

虫門)○虫痛小兒多有之當與虫部參考治之

症心痛

卒感惡忤尸症神昏卒倒口噤不省宜蘇合香丸(方見

風心痛

因傷風冷或肝邪乘心兩脅引痛宜麻黃

悸心痛

因七情怔忡驚悸以致心痛宜四七湯(方見氣門)加味四七湯(方見神門)七氣湯正氣天香湯

妙香散(方見

食心痛

因食生冷或食物過多以致心痛宜香蘇散(方見寒門

飲心痛

傷水飲聚痰涎心痛如刺宜芎藭湯(方見痰飲)五苓散(方

冷心痛

寒氣客於背俞之脈則血脈凝滯血脈凝滯則血虛血虛則痛背俞注於心故相引而痛(內經)○形寒欲冷當風取涼或腎邪乘心痛則心懸若飢泄利下重宜五積散(入門)○寒冷心痛宜扶陽助胃

湯桂枝四七湯

散草豆蔻丸溫胃湯抽刀散二薑丸

扶陽助胃湯

薑炮壹錢半草豆蔻壹錢半白芍藥酒炒人參甘草炙官桂各壹錢吳茱萸白朮陳皮各五

分右剉作一貼薑三片

桂枝四七湯治寒邪客搏心痛桂枝半夏各二錢白芍藥酒炒一錢半白茯苓厚朴枳殼各七

雞舌香散

治心腹冷痛丁香白芍藥酒炒二兩良薑一兩

神效散

治一切心脾疼遇冷痛作引入背脊痛不可忍服之絕根木香青皮陳皮麥芽枳殼三棱蓬朮神

效散

白芍藥白朮肉桂玄胡索破故紙甘草各七分華澄茄丁香各二分右剉作一貼薑五片棗二

却痛散

治心氣冷氣不可忍川烏炮一錢半當歸肉桂石菖蒲木香胡椒各一

草豆蔻丸

治秋冬傷寒冷物胃脘當心而痛枳實二兩草豆蔻煨白朮各一兩麥芽炒神麴炒半夏製各

溫胃湯

治服寒藥多胃脘痛陳皮黃耆各七錢益智仁六錢白豆蔻薑黃乾薑澤瀉各三錢縮砂厚

抽刀散

治急心冷痛斑斑七個胡椒四十九粒右同炒

二薑丸

治心脾冷痛炮乾薑良薑等分為末麴糊和

熱心痛

積者大承氣湯(方見寒門)下之(入門)○實熱心痛小柴胡湯(方見寒門)去人參甘草加枳殼

連附六一湯

治熱鬱胃脘痛甚黃連六錢附子一錢右

連附六一湯

剉作一貼入薑三棗二水煎熱服(入門)

金鈴子散

治熱厥心痛金鈴子玄胡索各一兩右為末每二錢酒調下痛止

莎芩散

治曾服熱藥致胃脘痛久成痼疹香附子川芎各五錢黃連枳子各二錢半木香乾薑各一錢半檳榔酒黃芩芒硝各一錢右為末每二錢熱薑湯調痛時下（入門）

梔薑飲

治胃熱作痛山梔仁十五枚炒焦水一盞煎至六分入薑汁三匙再煎熱服或入川芎一錢尤妙（入門）

去來痛

心痛或作或止久而不愈也○心包絡為風邪冷熱所乘痛故成疹不死發作有時經久不得差神

上）妙應丸（方見蟲門）
丁香脾積丸（方見內傷）

心痛亦有六

積心痛五曰厥心痛六曰真心痛（類聚）

脾心痛

着心下急痛也○心痛甚而至於脅下如刀刺之痛者已連及於脾臟矣古方名為脾病者是也（正傳）○如以錐針刺其心心痛甚者脾心痛也（靈樞）○宜用訶子散手拈散（方見上）復元通

氣散（方見氣門）

訶子散

治心脾冷痛不可忍一眼見效訶子炮厚朴乾薑炮草果陳皮良薑炮茯苓神麴炒麥芽炒甘草炙各等分右為末每三錢水一盞入鹽一捻候痛時煎服（得效）

胃心痛

腹脹而心痛胃脘當心而痛也（綱目）○蓋木氣被鬱發則太過故民病有木敗土賊之候也夫胃為脾之府

賜先於陰故藏未病而府先病也（正傳）○宜用草豆蔻丸（方見上）加味枳朮丸清熱解鬱湯清鬱散

加味枳朮丸

治清痰食積酒積茶積肉積在胃脘當心而痛及痞滿惡心嘈雜噯氣吞酸嘔吐脾疼等證

白螺螄殼煨各七錢縮砂草豆蔻黃芩東壁土炒青皮羅蔔子炒乾生薑各五錢陳皮去白便香附心

百九（正傳）

清熱解鬱湯

治心痛即胃脘痛一服立止山梔子炒黑一錢半枳殼川芎香附子各一錢黃連炒蒼朮

清鬱散

治胃中有伏火膈上有稠痰胃口作痛及嘔吐酸水惡心煩悶半夏陳皮白茯苓蒼朮便香附神

黃連薑汁炒枳子薑汁炒各一錢川芎六分乾薑炒黑五分甘草炙三分右剉作一貼入薑三

片水煎服

(醫鑒)

腎心痛

心痛與背相控善癰如從後觸其心偃僕者腎心痛也(靈樞)○下重而若泄寒中名腎心痛(類聚)○腎傳之心病筋脈相引心下急痛病名曰癰(內經)○腎之積名曰奔豚自臍下上衝心痛

最甚五苓散(方見寒門)○去白朮倍肉桂服之(入門)○宜用神保丸烏沈湯(方並見氣門)○喘急散(方見胸陰)○神聖復氣湯

神聖復氣湯

治腎元與膀胱經中陽氣不足致胸脅膈腹牽引冷痛大惡風寒或上熱如火下寒如冷等證預先一日用黃柏黃連生地黃並酒洗枳殼各三分別用新水浸又取細辛川芎蔓荊子

碎各三分別用新水浸別取羌活柴胡各一錢薑本甘草各八分半夏升麻各七分當歸六分防風人參郁李仁各五分乾薑炮附子炮各三分白葵花三朵去心碎右剉作一貼水五大盞同煎至一盞入

黃芪草豆蔻煨各一錢橘紅五分同煎至一盞乃入前浸兩藥再煎至一大盞去渣熱服空心(東垣)

積心痛

此因內外邪犯運發名曰積心痛(類聚)○凡入飲食後忽然暈倒口噤不言目不識人四肢不舉多因飲食過度氣道室塞或者氣惱而然急用薑鹽湯多灌探吐之後服平胃散(方見內傷)六君

子湯(方見痰飲)○食積心痛宜用行氣香蘇散煮黃丸(方見下)○草豆蔻丸(方見上)○加味枳朮丸(方見上)

行氣香蘇散

治內傷生冷外感風寒又觸七情惱怒飲食填滯胸腹脹痛紫蘇葉陳皮蒼朮香附子烏藥川芎羌活枳殼麻黃甘草各一錢右剉作一貼薑三片水煎不拘時溫服(回春)

厥心痛

此因內外邪犯心之包絡或他臟之邪犯心之支脈謂之厥者諸痛皆火陰厥陰氣逆上衝又痛極厥逆而通身冷汗出尿清不渴氣微力弱以不附湯(方見寒門)○溫之熱厥心痛者身熱足冷痛甚

煩躁其脈洪大可與金鈴子散(方見上)○保命○○乍開乍甚成疹久不死名曰厥心痛(類聚)

真心痛

心痛手足青至節名曰真心痛(類聚)○真心痛者手足青至節心痛甚朝發夕死夕發朝死(靈樞)○真心痛者大寒觸犯心君或汚血衝心手足青過節者朝發夕死夕發朝死(正傳)○心為

諸臟之主不可傷傷之而痛者為真心痛手足青至節朝發夕死夕發朝死

心腹並痛

心腹並痛宜二炒香良散二胡散厚朴湯桂靈散雞舌香散(方見上)○喘急散(方見前陰)○五積散(方見寒門)○備急丸(方見救急)○蘇合香丸(方見氣門)

二炒香良散

治心腹痛香附子良薑等分各炒為末入鹽火

二胡散

治心腹痛玄胡索胡椒等分為末每二錢溫酒調下(入門)

更

上海交

厚朴湯 治虛寒心腹滿痛厚朴陳皮各二錢赤茯苓乾薑炮甘草炙各一錢右剉水煎服之（東垣）

桂靈散 治心腹大痛危急者桂心五靈脂良薑炒厚朴製各等分右細末熱醋湯一錢立止（丹心）

七情作心痛食積痰飲瘀血皆作胃脘痛

七情心痛 七情者喜怒哀思悲驚恐蓋喜則氣散怒則氣上憂則氣沈思則氣結悲則氣消驚則氣亂恐則氣下六情皆令心氣鬱結所以作痛惟喜則氣散所以散六情之鬱能止痛也○息城司候聞父死于賊乃大悲哭哭罷便覺心痛日增不已月餘成塊狀如覆盆大痛不堪百藥無效載人至學巫者雖以狂言以謔病者至是大笑不忍回面向壁數日心中結硬皆散載人曰憂則氣結喜則氣散又云喜勝悲內經自有此法（入門）○宜用加味

四七湯（方見神門）分心氣飲（方見氣門）

食積胃脘痛 飲食過多以致積滯成胃脘痛先用吐法次用香蘇散（方見寒門）人生薑葱白烏梅煎服得效○或平胃散（方見內傷）加神麴麥芽山查肉（入門）○宜用加味二陳湯（方見痰飲）

飲一加味枳朮丸（方見上）

痰飲胃脘痛 胃中若有流飲清痰作痛腹中漉漉有聲及手足寒痛或腰膝背脇抽掣作痛宜用小胃丹控涎丹（方並見痰飲）三花神祐丸（方見下門）芩夏湯（方見痰飲）加味二陳湯（方見內傷）

加味枳朮丸（方見上）○一方治痰飲胃脘痛白螺螄殼火煨南星炮滑石梔子炒便香附子蒼朮各一兩枳殼青皮木香半夏縮砂各五錢右為末薑汁浸蒸餅和丸菜豆大每五七十九丸薑湯下春加川芎黃連冬吳茱萸（丹心）

○一名白螺殼丸（入門）

瘀血胃脘痛 心○痛脈澀者有死血也又云作時飲湯水下作吃者有死血桃仁承氣湯方見寒門下之（丹心）○如平日喜食熱物以致死血留於胃口作痛者桃仁承氣湯下之輕者韭汁結梗開之甚者五積散（方見寒門）加三棱蓬朮桃仁紅花（入門）○宜用失笑散（方見婦人）神仙沈麝丸（方見氣門）玄

胡索丸勝金散

胡索丸勝金散

玄胡索丸 治死血作心痛玄胡索一兩半桂心紅花滑石紅麴各五錢桃仁三十枚右為末湯浸蒸餅和丸梧子大醋湯下五七十九丸（入門）

勝金散 治瘀血心痛桂枝玄胡索五靈脂當歸各等分右為末每三錢酒水各半煎服（直指）

心胃痛當分虛實
神門 加味小建中湯參朮散
仲景 ○實痛宜
按之痛止者為虛二陳湯（方見痰飲）加炒乾薑和之（丹心）○虛痛宜歸脾湯（方見

神門）
加味小建中湯參朮散
○按之痛反甚者為實宜大柴胡湯（方見寒門）下之（

加味小建中湯
治心腹不可忍按輕却痛按重則愈皆虛寒證白芍藥酒炒三錢桂心一錢
半甘草炙遠志薑汁炒各一錢右剉作一貼薑五片棗二枚水煎服（得效）

參朮散
治虛弱人心脾痛人參白朮乾薑炮白豆蔻縮砂木香橘皮甘草炒各一錢右剉作一貼薑三片水煎服入炒過真蚌粉一錢併服尤效（得效）

旋更丸
治氣實心痛按之尤痛山施仁炒焦一兩半吳茱萸香附子各二錢半右為末蒸餅和丸如川椒大以生薑生地黃煎湯下二三十九丸（入門）

煮黃丸
治大實心痛因怒後飲食卒痛注悶心胸高起手不可近便閉者可下之雄黃水飛一兩巴豆肉五錢白麩二兩右研以水丸梧子大取十二丸用漿水煮熟澆入冰漿內沈冷每一時冷漿水下

一丸一日盡用十二丸得利即止
宜用煮黃湯以去餘邪（入門）

薑蒼湯
服煮黃丸後服此斷根薑本五錢蒼術一兩右剉每五錢水煎服（入門）

心胃痛治法
凡心胃痛須分新久若明如身受寒氣口吃寒物而得者於初得之時當與溫散或溫利之溫散謂麻黃桂枝湯桂枝四七湯（方見上）溫利謂九痛丸煮黃丸（方並見上）得之稍久則成

鬱鬱久則蒸熱熱久必生火若行溫散溫利宜不助火漆病即由是方中多以山施為熱藥之向導則邪易伏病易退正氣復病安矣（丹心） ○寒冷自外而入初則是寒鬱久則變熱始終俱是熱也宜分

寒熱血虫四條寒則溫之熱則清之血則散之虫則殺之庶乎不惑也（丹心）

麻黃桂枝湯
治外因寒冷心痛惡寒發熱內攻五藏拘急不得轉側麻黃桂枝芍藥細辛乾薑甘草各一錢香附子半錢各七分右剉作一貼薑五片水煎服（三因）

諸痛不可用補氣藥
痛甚則脈必伏多用溫藥附子之類不可用參朮蓋諸痛不可補氣故也（丹心） ○諸痛不可用補氣藥氣旺不通而痛愈甚矣 ○（醫鑒）

心胃痛剉藥
止痛初藥用倉卒散連附六一湯（方見上）抽刀散（方見上）愈痛散乾薑飲（方見上）神靈丹治心頭疼方 ○心痛用山施並却藥止之又復發前藥必不效可加玄明粉一錢即止（丹

倉卒散
治氣自腰腹間掣急疼痛不可屈伸痛不可忍自汗如洗手足冰冷垂死者山施子四十九枚連皮燒半過大附子一個炮去皮臍右粗末每三錢一盞酒半盞煎至七分入鹽少許服（得效）

○加川芎一錢尤妙（醫鑒）
○一名施附湯治疝（入門）

愈痛散

治急心痛胃疼五靈脂玄胡索炒蓬朮煨當歸良薑炒各等分右為末每二錢熱醋調服（丹心）

神靈丹

專治急心痛立效五靈脂滴黃炒各一兩良薑五錢以班貓二十個同炒焦去貓防己丑錢右細末醋糊和丸如皂角子大每一丸艾醋湯調下或為末酒下二錢亦可（活心）

治心頭疼方

歌曰三個烏梅三個棗七個杏仁一處檳榔香一粒用酒煎永不心疼直到老○烏梅三個大棗三個俱去核杏仁泡去皮去麝香如小豆一粒右共搗為泥黃酒一鍾同煎兩沸溫服

正疼時服之婦人尤神
效當時即止（丹心）

心胃痛宜吐

凡心痛皆痰粘通用二陳湯（方見痰飲）隨證加減（入門）○凡痛攻走腰背發厥嘔吐諸藥不效二陳湯加蒼朮川芎梔子煎服探吐積痰碗許乃愈（入門）○多飲鹽湯以鵝翎探吐痰

積痛即止（醫鑒）○飲食過傷心痛甚不省人事多飲薑鹽湯探吐之即止痛（雜著）○食積痰心胃痛甚以瓜蒂散（方見吐門）吐之又蘿蔔子五合油炒搗碎和漿水濾汁入油與蜜各少許旋旋溫服吐之

（丹心）

心胃痛吐下

心脾痛大小便不通者此是痰隔中焦氣聚下焦也（丹心）○心痛脈堅實不大便者下之宜大柴胡湯（方見寒門）胃脘有濕而痛小胃丹（方見痰飲）下之（丹心）○通則不痛不通則

痛又云諸實為痛痛隨利減凡心胃痛甚須用下藥利之是為捷法（東垣）○大凡心腹痛嘔吐大便不通者欲利其大便諸藥皆吐惟蘇合丸薑汁泡湯吞下最妙麝香蘇合丸（方見氣門）四分感應丸

（方見大便）六分研和作丸菴豆大下二三十丸（直指）
宜用九痛丸煮黃丸（方並見上）神保丸（方見氣門）

飲食禁忌

心痛雖日數多不吃飯不死若痛止便吃物即還痛必須三五服藥方可吃物（丹心）○凡心痛數日不食何妨痛止恣食即復發（入門）○病安之後若縱恣口味病必復作勿歸咎於醫也（

丹心）

龜胸

詳見小兒門

胸痞

胸滿而不痛者為痞滿而痛者為結胸痞悶比之結胸為輕始末用藥俱同但有輕重之殊耳（入門）○痞者心下滿而不痛是也太陰濕土主壅塞乃土來心下而為痞也傷寒下之早亦為痞乃寒傷榮

血心主血邪入於本故為心下痞仲景瀉心湯數方皆用黃連瀉心下之土邪其效如響應梓（東垣）
一○酒積雖病下之過亦作痞蓋胸中之氣因虛而下陷于心之分野故致心下痞宜升胃氣以血藥

兼之若全用氣藥導之則氣愈下降必變為中滿鼓脹矣（東垣）○痞滿與脹滿不同脹滿內脹而外亦形痞則內覺痞悶而外無脹急之形蓋由陰伏陽蓄氣血不運而成位于心下之中填滿痞塞皆土邪之所為耳（丹心）○內經曰大陰所至為積飲痞隔○痞者否也如易所謂天地不交之否內柔外剛萬物不通之義也物不可以終否故痞久則成脹滿而莫能療焉（正傳）○痞者胸膈飽悶而不舒暢也（醫鑒）○寒痞枳實理中丸熱痞加減陷胸湯痞痞柴梗半夏湯痞痞瓜實丸久痞黃連消痞丸食已心下痞平補枳木丸虛痞枳實消痞丸飲食不消痞橘皮枳木丸（方見內傷）或二陳湯（方見痰飲）加山查神曲麥芽陰伏陽蓄為痞香砂養胃湯加味枳不丸（方見上）○通用枳梗枳殼湯解鬱和中湯二陳湯加減

枳實理中丸

治寒實痞滿枳實炒人參白朮白茯苓乾薑炮甘草炙各等分右為末蜜和一兩作四丸熱湯化下（得效）○傷寒結胸心胸痞痛手不得近氣欲絕陷胸湯丸皆不效用此如神（綱目）

綱目

加味陷胸湯

治熱痞胸膈滿痛枳梗枳殼各一錢五分半夏黃芩黃連各一錢五分麥門冬各一錢右剉作一貼薑五片水煎服（醫林）

柴梗半夏湯

治痰熱盛胸痞脇痛柴胡二錢瓜蒌仁半夏黃芩枳殼枳梗各一錢青皮杏仁各八分甘草四分右剉作一貼薑三片水煎服（入門）

瓜蒌實丸

治胸痞痛徹背喘急妨悶瓜蒌仁枳殼半夏製枳梗各一兩右為末薑汁糊丸和梧子大薑湯下五七十九（濟生）○瓜蒌仁潤肺降痰枳殼破滯氣半夏燥濕結梗開膈載藥可謂善治痞

悶喘急矣然痰因火動加黃連尤妙（丹心）

黃連消痞丸

治心下痞久不愈黃芩黃連炒各六錢枳實炒五錢半夏製四錢薑黃白朮澤瀉各三錢人參陳皮厚朴各二錢枳殼一錢半縮砂乾薑神麴甘草各一錢右為末蒸餅和丸梧子大白湯下百丸（丹心）

白湯下百丸（丹心）

平補枳朮丸

治食已心下痞去痰健脾調中白朮三兩白芍藥一兩半陳皮枳實黃連各一兩人參朮香各五錢右為末荷葉濃煎湯煮糊和丸梧子大末飲下百丸（入門）○白朮補脾氣為君白芍藥補脾血為臣陳皮枳實消痞黃連清熱以為佐人參補氣不香調氣以為使如此平補氣血均去痰火兼通氣道則病邪日消而脾胃日壯矣（丹心）

枳實消飲丸

治心下虛痞惡食懶倦右關脈弦枳實黃連各五錢厚朴四錢半夏炒人參白朮各三錢乾生薑白茯苓麥芽甘草各一錢右為末蒸餅和丸梧子大白湯下百丸空心（入門）○一名

失笑丸

（東垣）

香砂養胃湯

治陰伏陽蓄而為痞滿能調養脾胃升降陰陽成天地交之泰白朮陳皮半夏白茯苓各一錢香附子縮砂木香枳實藿香厚朴白豆蔻各七分甘草三分右剉作一貼薑三片棗二枚

水煎服加味枳木丸同功(回春)

桔梗枳殼湯

治痞氣胸滿不利煩悶欲死不論寒熱通用又傷寒結胸胸滿欲死服之神效桔梗枳殼各二錢甘草一錢右剉作一貼薑五片煎服直指(一名桔梗湯)(入門)

解鬱和中湯

治痞滿內熱夜不安臥則愈悶悶則愈去白一錢二分便香附赤茯苓枳殼梔子炒各一錢半夏前胡各七分黃連薑汁炒神曲炒厚朴青皮蘇子炒各五分甘草四分右剉作一貼薑五片水煎服

(回春)

痞有寒熱

治痞不渴脈遲宜辛甘散之枳實理中丸之類(方見上)熱痞煩渴脈數宜苦寒泄之黃連消痞丸加味陷胸湯之類(方並見上)(綱目)

痞有虛實

痞有虛實之殊實痞大便閉厚朴枳實湯(方見大便)主之虛痞大便利芍藥陳皮湯主之(東垣)○痞有虛有實大便秘而利者為虛大便秘而閉者為實(入門)

痞宜吐下

飲食過傷心胸痞悶凡欲吐者宜吐之(東垣)飲食傷脾痞滿輕者黃連消痞丸(方見上)橘皮枳朮丸(方見內傷)甚者微下之吐之下者枳實導滯丸加檳榔木香(方見內傷)煮黃丸(方見上)吐者二陳湯(方見痰飲)

方見上(承蒂散)(方見吐門)(丹心)

痞證治法

心下痞須用枳實炒黃連○如稟實氣實而痞宜枳實黃連青皮陳皮枳殼○如稟弱氣弱飲食不化而痞宜白朮山查神麴麥芽陳皮○如肥人心下痞乃濕痰宜蒼朮半夏縮砂茯苓滑石○如瘦人心下痞乃鬱熱宜枳實黃連葛根升麻○如感寒食不化心下痞宜藿香草豆蔻縮砂吳茱萸○痞疾血成窠囊宜桃仁紅花香附大黃(丹心)○王道消補不輕吐下故古人治痞用黃連黃芩枳實之苦人泄之厚朴生薑半夏之辛以散之人參白朮之甘溫以補之皆苓茯苓澤瀉之淡以滲之大小便與濕同治使上下分消其溼可也(正傳)○傷寒本無痞應發汗醫反下之遂成痞枳實理中丸(方見上)最良審知是痞先用桔梗枳殼湯尤妙枳桔能行氣故也(活人)

○蓋痞自血中來治痞獨益脾土以血藥治之其法無以加矣(海藏)

會痞氣法

薤白三合生薑二兩葱白七莖橘葉一握白粳半合共搗勻炒令溫會痞滿之處外用絹帛縛之候半日許胸中煩熱即解去復以熱手揉之不拘寒熱虛實並用之無橘葉代椒葉(入門)

變痞氣法

治心胸痞及一切胸膈寒熱結水結食結痰結痞皆治之生薑一斤搗取汁別取只取渣炒熱帛色變心胸膈下其痛結然而愈若薑令再拌汁炒再變之若熱結不用炒(入門)

結胸

傷寒病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因作痞所以成結胸者以下之太早故也(仲景)○結胸之證當

痛而煩水漿不入但能仰而不能俛項強如柔痙狀(入門)心下滿

而硬痛為結胸滿而不痛為痞半裏瀉心湯方見寒門主之(仲景)○有大結胸小結胸裏實結胸熱實結胸水結胸血結胸陰陽毒結胸又有支結證○桔梗枳殼湯治結胸痞氣通用(入門)

大結胸 不按而痛胸連膈腹痛硬手不可近不大便日晡潮熱宜大陷胸湯大陷胸丸(方並見寒門)穿結散○大結胸者心下滿而硬痛手不可按(仲景)

穿結散 治大實大滿心胸高起氣塞不通為結蟾酥麝香輕粉巴豆肉各少許右研細人乳汁和米黍丸大薑湯下二三丸(綱目)

小結胸 按之方痛只心下硬宜小陷胸湯(方見寒門)○小結胸者並在心下按之則痛(仲景)

寒食結胸 身不熱口不渴只心中脹硬而痛無熱證宜枳實理中丸(方見上)甚者三物白散(方見寒門)○入門

熱實結胸 心下滿硬懊憹煩躁而渴宜加味陷胸湯(方見上)柴陷湯(入門)

柴陷湯 治實熱結胸及水結痰結半裏二錢承薑仁柴胡各二錢黃芩黃連各一錢人參七分甘草五分右剉作一貼入薑五片棗二枚水煎服即小柴胡湯合小陷胸湯也(入門)

水結胸 傷寒結胸無大熱者此為水結在胸脅但頭微汗出(仲景)○傷寒飲水過多水停心下為水結胸但頭汗出身無大熱心下滿按之汨汨有聲謂之水結胸宜赤茯苓湯甚者大陷胸湯(方見寒門)

(入門)○凡水結胸脇間頭必有汗(綱目)○一人忽患微熱心下滿頭有汗衆醫以為濕病或以為食積孫兆曰水結胸用半裏茯苓湯遂差衆問其故答曰頭有汗心下滿非濕病乃水結胸脇也既去其病當愈若濕氣心下滿自常過身汗若食積頭豈有汗手故知之(綱目)○水結宜枳朮湯

半裏茯苓湯 治水停心下為水結胸痞滿頭汗半裏赤茯苓各二錢陳皮人參川芎白朮各一錢右剉作一貼入薑五片水煎服○一名赤茯苓湯(綱目)

枳朮湯 治心下堅大如碗邊如旋盤名為氣分乃飲水所結也白朮四錢枳實二錢右剉煎服(千金)

血結胸 婦人傷寒血結胸痛不可忍宜服海蛤散玄胡索散(入門)

海蛤散 治血結胸痛不可忍手不可近海蛤粉滑石甘草各一兩芒硝五錢右為末每二錢雞子清調下服此則小腸利而膈中血自散矣蓋小腸壅則膈中血不流行小腸通利則膈中血散而痛自止矣(得效)○雞子

一作鴨子(入門)

玄胡索散 治婦人血結胸心腹作痛連腰脇背脊上下攻刺甚作搐搦玄胡索炒當歸蒲黃炒赤芍藥官桂各一錢薑黃木香乳香沒藥各七分甘草炙五分右剉作一貼入薑三片水煎服(得效)

東醫寶鑑外篇 卷之三 上海校經山房石印

陰陽毒結胸 傷寒陰陽二毒伏逆變為結胸自利者有不得利者依結胸灸臍法以利之陽毒內服活龍散

不可治

活龍散 治陽毒結胸藥下不通或稍通而復再結者活地龍四條大者去土研爛入薑汁薄荷汁蜜各一匙新汲水調和徐徐灌盡若熱熾加片腦火許

條橋欄蜜半盞水半碗和灌之得效

破結丹 治陰陽毒伏逆變為結胸五六日大便結攻之不可達之不及此主之長砂青礞石葶藶子肉豆

長砂附子黑丑三味熬成膏次入餘藥和丸

支結 傷寒心下妨悶不滿不硬者謂之支結宜桂枝人參湯

桂枝人參湯 治支結桂枝甘草各二錢人參白朮乾薑各一錢右剉作一貼水煎服

柴梗湯 治胸膈滿悶痞痛藥胡二錢黃芩半夏枳殼桔梗各一錢人參七分甘草五分右剉作一貼薑五片棗二枚水煎服

柴陳湯 治痰熱胸痞滿藥胡二錢黃芩半夏枳殼陳皮各一錢人參七分甘草五分右剉作一貼如上述法煎服

禽結胸法 治初起黃毛雞子一隻生薑四兩共搗爛炒微溫攤在胸前結實之處外以絹帛縛之候半日許覺腹中熱燥解去更以熱手揉之

變結胸法 治陰證結胸手足厥逆大蔥白十莖生薑一兩搗爛作餅炙熱貼臍中以熨斗火熨餅上待熱氣入內覺響即住復用枳實理中丸之類

結胸不治證 結胸脈浮大者不可下下之即死仲景

單方 凡三十八種

伏龍肝 治卒心痛取為末溫水調服

白礬 治心痛取細末一錢茶清調下

二錢醋半盞煮化溫服即止去熱涎之功也

百草霜

治心痛取細末二錢以熱童尿調服即愈(丹心)

鹽 治胃脘痛卒急無藥以鹽置刀頭燒紅淬入水中乘熱飲之吐痰即愈(正傳)

木香

治九種心痛為末和酒服○木香專泄決胸腹間滯塞冷氣得橘皮肉豆蔻生薑相佐絕佳(本草)

生地黄

治一切心痛無問新久搗絞取汁搜麴作餅饅作冷淘食之良久當利出虫長一尺許不復患矣後有二人患心痛垂絕皆服此得虫出遂愈(本草)

乾薑

主心痛為末米飲調二錢服(本草)

生薑

和半夏煎服主心下急痛○又生薑汁和杏仁作煎服下氣結心痛痞神效

黃連

治心下痛對水煎服日三○黃連治心下痞滿必用藥也仲景治九種心下痞五等瀉心湯皆用之○黃連瀉心下土邪故治痞最效(湯液)

瓜蒌實

治胸痞痛不得臥心痛微背黃瓜蒌大者一枚蘆白三兩半夏製四兩並剉白酒七升煮取二升分再服(綱目)○治胸痛及痰嗽瓜蒌子連皮炒細研鈎糊和丸梧子大米飲吞下五十九丸(本草)

草

草豆蔻

主心腹冷痛草豆蔻仁及梔子炒為末薑汁糊和丸服之或單煮服之亦佳(丹心)○此藥性溫能散滯氣若胃脘因寒作痛用之如鼓應桴瘳瘳作痛服之亦效但熱痛不可用也(正傳)

陳艾葉

治心腹痛取熟艾濃煎服之即差(本草)

玄胡索

止心痛為末酒調服雷公云心痛欲死連覓玄胡即此也(本草)○又治血刺心痛丸土炒為末每二錢溫酒調下即愈(得效)

白附子

主心痛地為末每二錢溫水調服即差(本草)

半夏

消胸痞去痰又治心下急痛堅痞半夏研為末香油炒熟薑汁浸蒸餅和丸薑湯下三五十丸亦治喘而心痛(綱目)

牛膽南星

治結胸久不羸狂言大小便不通取牛膽南星末二錢人參湯調服少頃更以熱人參湯投之便尿下黃黑物是效(得效)

乾漆

治九種心痛及瘀血心痛乾漆炒烟盡為末醋糊和丸梧子大熟酒或醋湯下五七丸(本草)

梔子

治心下痛非梔子不可須以薑汁佐之川芎開之○心痛取大梔子十五枚去皮炒濃煎湯一小盞入薑汁令辣加川芎末一錢再煎服即效○又方梔子仁炒為末薑汁糊和丸服之亦效(丹心)

枳實

治心下痞潔古用此去脾經積血故能去心下痞脾無積血則心下不痞矣○枳實能去脾間瘀血瘀血去而痞自消○非枳實不能除痞(東垣)○胸痞痛楚炒為末米飲下二錢水煎服亦可(本草)

茶久心痛不可忍或煎水
和醋服之甚良(本草)

胡椒止心腹冷痛酒煮取汁服之○又取四十九粒乳
香一錢為末男用薑湯下女用當歸湯下(丹心)

川椒治心胸冷痛酒煮取汁飲之○若熱食冰雪冷物過多積冷心脾痛半歲不愈川
椒三十粒浸漿水中經一宿漉出還以漿水吞下其病即脫更不復作(得效)

蛤粉治心氣不可忍蛤粉炒白湯調服(丹心)○蛤粉和香附末薑汁調服治痰
痛甚效(丹心)○熱心痛蛤粉百草霜為末茶清或冷水調下(丹心)

田螺殼治卒心痛田螺爛殼燒為末熱酒調下一錢半即
愈(綱目)○亦治濕痰胃脘痛服之立止(正傳)

鰻鱺魚治諸虫心痛多吐涎取魚凌
炙令熟食三五度差(本草)

烏賊魚墨婦人崩漏而心痛甚名曰殺血心痛烏賊墨炒為
末醋湯調服亦治小產後下血過多心痛(入門)

蜜治卒心痛蜜與薑汁各一
合水和頓服即止(本草)

桃又治心痛及症痛桃奴為末每二錢
溫酒下空心各日蟠桃酒(醫鑑)

芥子治心痛酒醋研取
汁服之(本草)

絕徐文伯視之曰髮瘕也以油灌之吐一
物如蛻無目懸之滴盡惟一髮(本草)

灌下但得葱下喉其人必甦腹中虫積
化為黃水微利即愈永除根(綱目)

蒜血氣心痛生蒜搗取汁飲一盞即差○久心痛不可
忍小蒜醋煮頓服取飽不着鹽隨手神效(本草)

韭汁治胸痞心中急痛或痛徹背上欲死搗取汁灌服之即吐胸中惡血而愈(本草)○食鬱久則胃脫
有痰血作痛韭汁一盞先嚼桃仁十數枚以汁送下(正傳)○韭汁能去胸中惡血滯氣(綱目)

雞卵治心痛取一枚打開好醋二
合和攪頓服即差(本草)

熊膽治虫心痛取大豆許
和水服大效(本草)

麝香主鬼症心痛取大豆許
溫水研服之(本草)

桃仁止心痛取七枚去皮共熟研水一合
和頓服良亦治三十年久痛(本草)

桃枝治卒心痛取枝一握切酒一升
煎取半升頓服大效(本草)

暗麻油治心痛無問冷熱生香油一合服之○又治
蛔心痛飲之良○一人患腰痛牽心發則氣

蕙白根治心腹痛又治急心疼牙痛欲死老葱白三五
根搗為膏挖開口將膏送入咽喉以香油四兩

針灸法

九種心痛取間使靈道公孫大衝足三里陰陵泉（綱目）卒心痛取然谷上臑氣海涌泉間使支溝三里大敦獨陰（綱目）胃脘痛取足三里（靈樞）病在膺必灸刺魂門（資生）陰維為病

苦心痛取內關(難經) 心主之病實則心痛取內關(綱目) 心痛即腎心痛先取京骨崑崙不已取然谷委陽(靈樞) 心脾痛取巨闕上脘中脘(綱目) 厥心痛取腎心痛即腎心痛先取京骨崑崙不已取然谷

大都太白大谿行間大衝魚際大淵（靈樞）○虫心痛灸上腕中腕陰郄（得效）○血心痛取期門（綱目）○傷寒結胸先使人心蔽骨下正痛處左畔揉之以毫針刺左畔支溝穴次刺左間使名曰雙

闕刺次刺左行階左一壁結胸立效右畔依法刺之慢慢呼吸停針即時愈（綱目）○結胸灸法巴豆十粒去皮

研細黃連末一錢右以津唾和成餅填臍中以艾灸其上腹中有聲其病去矣不拘壯數去病為度灸過湯侵手怕試之恐生瘡（綱目）○一切腹心胸脇腰背苦痛川椒為細末醋和為餅貼痛處用熟

艾鋪餅上發火燒
艾痛即上（醫鑒）

乳

度數兩乳之間廣九寸半(實區)

乳腎為根本男子以腎為重婦人以乳為重上下不同而性命之根一也直指○女人屬陰陰極則

縮也。一曰：自下而上，衝故卒戾大而陰戶絳也。男子陰陽相見，又自上而下，陰故陰莖垂而乳頭

產後乳

汁不行有一乳汁

亡津液故也須

服滋益之藥以動之雖有乳却又不甚多者須服通經之藥以動之仍以姜朮引之蓋

婦人之乳資於心脈與胃經通故也。大抵婦人素有病在經者，乳汁少而色黃，所生之兒怯弱多病。（良方）○氣血虛弱，乳汁水者，鍾乳粉二錢，煅蘆煎湯調服，或

猪懸蹄一隻通

宜漏蘆散氣塞乳少者宜涌泉散（入門）○益元散（方見暑門）以冷蘆湯或井水調

乳粉服
日三服
下乳汁最妙
(入門) 〇下乳汁宜猪蹄湯
(方見上) 通乳湯
通草湯立效
方鍾乳散即上乳

治乳汁壅塞不行乳內脹痛欲作癰腫服此自消漏蘆一錢半蛇蛻一條燒灰萆

盧昔個右為末酒調二錢服無時仍食熱羹湯助之若乳多急痛以溫帛熨之（良方）

未幾直隸

卷三

1

100

451

八

卷之八



涌泉散 治乳汁絕少或不行脹痛瞿麥穗麥門冬穿山甲炮黃龍骨王不留行各等分右為末先

通乳湯 治乳汁不足乳汁凝少豬蹄四隻通草川芎各一兩穿山甲十四片炮黃甘

通草湯 治乳汁不通桔梗一錢瞿麥柴胡天花粉各一錢通草七分木通青皮白

立效方 治乳汁不行萬箇子糯米各一合細研水一

產前乳出 產前乳汁自出者謂之乳泣生子多不育產後

無兒則當消乳 無子飲乳房脹痛要消乳麥芽二兩炒為末分作四貼每用白湯調下(正傳)○一方要

吹乳如乳 乳房陽明所經乳頭厥陰所屬乳子之母不知調養忿怒所逆鬱悶所遏厚味所養以致厥陰之

乳而睡熱氣所吹遂成結核謂之吹乳於初起時便須忍痛揉令稍軟吮令汁透自可消散失此不治

必成癰痛(丹心)一嬰兒未能吮乳或為兒口氣所吹或斷乳之時捺出不盡皆令乳汁停蓄其間與血

氣搏結而腫痛繼而結硬至於手不能近則謂之妬乳(直指)○吹乳一口吹於產前乳房結核名為

便結惡汁於內引熱溫壯結堅掣痛大渴引飲乳腫急痛手不得近以成妒乳非癰也急灸兩手魚際

二七壯壯斷癰脈也不復惡手近乳汁亦自出便可手助連搏之則乳汁大出皆如膿狀內服連翹湯(

即五香連翹湯方見癰乳門)外以赤小豆麥塗之便

橘皮散 治吹乳及乳癰未結即散白丁散散立效散白丁散

勝金丹 治吹乳神效百齒霜即木梳上髮垢不拘多少以無根水為丸如梧子大黃丹為衣每服三丸以

皇蛤散 治吹乳意如何皇角煖灰蛤粉和熱酒一盃調八字雙手揉散笑呵呵(雲岐)

立效散 治吹乳立效生薑去皮一兩大黃甘草各五錢黃芩一箇右同搗作一塊

白丁散 治吹乳初覺服此即能下乳汁通血脈令自消