

痘科應用古今方藥

卷六下
俞天池輯錄加解釋

用桂以煖之。猶五苓散是矣。

十全大補湯

八十三

人參

白朮

茯苓

甘草

當歸

川芎

白芍

熟地

黃芪

肉桂

補氣用參朮草皆和平之味。故曰四君子。補血用歸芍。地四物足矣。故曰四物。加黃芪以助陽固表。加肉桂以引火歸元。名曰十全大補湯。金匱曰虛者十補勿一瀉之此湯是也治痘氣血兩虛之症。豈不大妙。史氏云痘瘡癰癤加落之時。當加金銀花爲君。以治餘毒。金銀花氣味俱薄非重用不爲功。

芫荽酒

八十四

芫荽四兩切碎如無芫荽子亦可用橘成細末以好酒一盞煎兩沸入芫荽用物蓋定再煎勿令洩氣去渣候溫吸一二口從項下微噴滿身至足令遍勿噴頭面恐引痘上聚頭面也覆煖移時卽出

此治痘欲出不出令其速出之仙方也

甘桔湯

八十五

甘草

桔梗

此方清肺熱利胸膈療咽喉腫痛甘草味甘氣溫平溫能除大熱甘則不峻下同桔梗能清上焦之邪熱桔梗味辛苦氣

微溫辛則能散苦則能清爲舟楫之藥載諸藥不下沉同甘草能戀胸膈消膈上之痰涎清肺中之鬱熱肺熱除而咽喉自利矣本方加連翹牛蒡訶子肉薄荷名甘桔清金湯加連翹牛蒡射干竹瀝名甘桔化毒湯

利咽解毒湯

八十六

桔梗 甘草 牛蒡 山荳根 防風 元參

麥冬 紫草茸

此方用山荳根爲第一利咽之藥咽喉腫痛氣管爲喉食管爲咽毒火上炎也非解毒不可諸品皆解毒利咽之品但紫草茸必須

痘色乾紅或帶紫血熱不化者方可用。

甘露飲

八十七

人參

白茯

甘草

生地

麥冬

五味

知母

花粉

葛根

上焦火加生藕汁桔梗山梔

中焦火加石膏黃連黃芩

下焦火加黃柏熟地去葛根

又方

王氏

天冬

麥冬

生地

熟地

石斛

茵陳

黃芩

甘草

枇杷葉

去毛

又方

生地

熟地

茵陳

麥冬

黃芩

石斛

枳殼

桔梗

枇杷葉

去毛

治喉舌牙疳痘後牙疳出血口臭口爛以上三方俱可斟酌
加減用之其效直如甘露之能潤萬物也

導赤通氣湯

八十八

人參

當歸

生地

石菖蒲

麥冬

木通

加燈心煎

導赤者導引心小腸之火而入膀胱從小便而泄也若心氣
不通則赤何由而導乎故用木通生地燈心以導心火用人

參麥冬以滋肺氣

膀胱以氣化氣足則津液通矣

更用菖蒲以通心氣益心

主生血血不足則火益盛

故用當歸生地以養心

本方去

木通菖蒲加升麻以涼心血

名養心化毒湯又名當歸養心

湯

清金散火湯

八十九

麻黃

去根節蜜水炒

紫蘇

桔梗

牛蒡子

炒

甘草

腹脹加厚朴腹皮

大小便秘加葶苈子

炒研山梔仁炒

此方因心肺有實火而製也。肺屬金，金空則鳴。有火則爲嗽、爲喘、爲痰、爲聲音不清，或因肺感風寒，久則變而爲火。或因

心火逼肺。或毒火上炎客於肺臟。用此方以清之。散之。肺與大腸爲表裏。腹脹大便秘之症。客或有之。若因心火而然。則心與小腸爲表裏。小便秘之症。亦所應有。用山梔仁清心火。草薢子性苦寒。走心肺二經。清火利小便者也。

宣風散

九十

牽牛四兩半生半炒搗止取頭末一兩 柘榔二兩 陳皮 甘草各五錢
右爲末。二三歲者蜜湯調下五分。

此治痘瘡纏出。或變黑。或青紫。或出不快。而黑陷。因平昔油膩炙燙飲食過多。以致腸垢者。用此以下之兼治。喘而腹脹。

大小便祕者

玉鎖匙 九十一

硼砂一錢

水片一分

兒茶三分

硃砂水研飛

文蛤卽五倍子打碎炒五分

右爲極細末將蘆管吹咽內

此治咽喉腫脹或閉或爛竝皆佳妙如玉匙之可以令鎖立開也兼治熱喘亦妙

人參清膈散 九十二

人參

白朮

茯苓

甘草

黃芪

當歸

白芍

柴胡

紫苑

桔梗

知母

地骨

桑皮

黃芩

石膏

滑石

加姜一片

此治氣血兩虧火積膈間或時時咳嗽而喘或大小便不利、或時時發熱故用八珍以補氣血不用地黃者恐其泥膈也。用餘藥以清上中下三焦之火使膈間不留餘毒也。

五苓散

九十三
附四苓散

猪苓 赤茯 白术 澤瀉 肉桂 爲末每服二三錢或加姜棗煎服 傷暑者加硃砂燈心煎服 小便不利而渴或水瀉者此方主之仲景治傷寒太陽病發汗得眠欲飲水者少少與之令胃氣和則愈若脈浮小便不利微熱消渴飲水過多者此方主之東垣曰無惡寒之症不可

用肉桂、本方去肉桂、名四苓散
周揚俊曰五苓散專爲渴而小便不利者設也若不渴則茯苓甘草湯足矣若不惡寒則四苓散足矣渴而用此方者何也爲其飲水過多也此皆爲傷寒症而言也至後人用此方而加減之其名更得多矣汪訏菴云若因汗下之後內亡津液而致小便不利者不可用五苓散恐重亡津液而益虧其陰也

翁氏加木通、東流水煎治痘內熱以之利小便按史氏曰經云濕勝則濡瀉故濕淫於內者令人水瀉濕併於大腸故小便不利白朮燥而淡燥則能健脾淡則能利濕茯苓甘而淡甘則能補中淡則能滲濕矣猪苓枯而淡枯者有滲利而無補益澤瀉鹹而淡鹹者能潤下而兼滲利肉桂性辛熱辛熱

則能化氣經云膀胱者州都之官津液藏焉氣化則出桂有化氣之功故併稱之曰五苓散

耕烟氏按陳來章曰治小便秘之道有三一曰肺燥不能化氣故用二苓澤瀉之甘淡以泄肺而降氣余接肺虛不能化人參麥冬氣則膀胱不泄用以滋化源二曰脾濕不能升精故用白朮之苦溫以燥脾而升精三曰膀胱無陽不能化氣故用肉桂之辛熱以溫膀胱而化陰使水道通利則上可以止渴中可以去濕下可以泄邪熱也余按飲食入胃施化津液必先上輸於肺而後下入於膀胱也

補托清解湯

九十四

人參 黃芪 甘草 連翹 半蕓 桔梗

丹皮 防風 黃連 加粘米圓眼肉水煎

補者補其虛。令毒不內入。托者托其裏。令毒得外出。清者清其火。令火不內燥。解者解其毒。令毒得外化。此湯之妙補托清解四字悉之矣。

人參白朮散

九十五

一名七味白朮散

一名參苓白朮散

人參

白朮

白茯

甘草

藿香

木香

乾葛

此養脾胃之方也。脾胃屬土。爲萬物之母。臟腑百骸皆受氣。

於脾胃。况痘瘡始終以脾胃爲主。脾胃喜甘而惡苦。喜香而惡穢。喜燥而惡濕。喜疏而惡滯。是方也。人參甘草味之甘者也。白术茯苓甘而微燥者也。藿香木香辛香而燥。可以聞胃。醒脾。乾葛味甘氣平。性輕浮。足陽明胃經之藥。可以升發胃氣。除胃熱。又能發諸毒達表。與諸品同用。能開導活動而不滯也。按史氏

大無比散

九十六

治熱毒太甚。驚狂譖語。兼治痘瘡紅紫黑陷。

滑石

飛過六兩

粉甘草

一兩

辰砂

飛過三錢

雄黃

飛過一錢

右爲末。每三五歲服一錢。十歲服二錢。一方無雄黃。
此方耑治前症。兼治發熱之初。用敗毒散煎湯調下。亦能稀
痘。若報痘後。用燈心湯下。

小無比散

九十七

治痘壯熱口渴。小水澀。大便秘。口氣熱。煩躁不安。或焦紫。或
紅斑。自發熱至起脹時。有熱者皆可用。痘後餘熱亦可用。

滑石

六兩

石膏

一兩

粉甘草

五錢

鬱金

甘草湯煮
七錢

俱製淨末。每五歲者服二錢。大者再加。冬月燈心湯下。
夏月井水調下。熱甚不解者。井水磨犀角汁調下。

若痘色紅紫頂陷不起加山甲末一分麝香半分紫草煎湯
加酒一二匙調下

此大小無比散能導火從小便而洩也與六二散義同與無
比散義別

六味地黃湯 九十八

熟地黃 山萸肉 白茯苓 丹皮 淮山藥
澤瀉

錢氏仲陽因仲景八味丸減去附桂以治小兒蓋因小兒純
陽故也後人加減一二味遂多立名色除六味八味外更有

九方大略益火壯水歸元都氣長壽補勞益陰治濕等義而已。按黃帝逸典換花煎書中有以六味湯爲主加減損益，以盡痘瘡之正變後人因之亦可奏效但不應泥於一方也。

愚按李士材曰用此方者有四失地黃非懷慶則力薄蒸晒非九次則不熟或疑地黃之滯而減之則君主弱或惡澤瀉之瀉而減之則使力微顧歸咎於藥之無功母乃愚乎。

理中湯

九十九

人參

附草

白朮 炒黃

乾姜

加熟附子名附子理中湯