

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百四十九



南京中医药大学图书馆版权所有

羊淡才朱

後詩疾

血重心

血夾

血

血

周王朱櫛 撰

血則凝滯不消逆上者

餘血不盡因虛冷則留

血結彌甚則變成血瘕

血奔心益是分挽了

不即與童子小便以逐瘀血及卧太速兼食不相宜之物所致但能依方療之無不痊可

方

治產後敗血衝心發熱狂言奔走脉大虛者方

出拔萃方

乾荷葉 生地黃乾牡丹皮等分

右濃煎湯調生蒲黃二錢一服即定四物湯加柴胡小柴胡加生乾地黃等分煎服亦可

捲荷散

出醫方大成

治產後血上衝心血刺血暈氣血腹痛

惡露不盡

初出荷捲

紅花

當歸

各一兩

蒲黃

細炒

丹皮

各半兩

右為細末每服二錢半空心溫酒送下一方內只使童子小便調如纔產後便服此藥即諸疾不生

荷葉散

療產後七日內宿血不散時時衝心迷悶不

識人

荷葉

六分

延胡索

八分

地黃汁

二合

右水二升煮三味取八合下延胡索空心三服忌肉

食一日

療產後餘血攻心或下血不止心悶面青冷氣欲絕

出肘

後方

當歸 桂心 川芎 吳茱萸 橘皮

生薑 各二兩 芍藥 三兩

右㕮咀以水三升煮取一升去滓空心服

治產後餘血攻心

出大全良方

用陳白梅搥碎濃煎湯服

金黃散

出大全良方

治產後惡血衝心時發躁

延胡索

一兩

蒲黃

半兩

桂心

一分

右為細末烏梅煎湯冷調下一錢

生地黃湯

出大全良方

治產後餘血奔心煩悶不知便與童

子小便以逐瘀血及睡太疾無食不宜食之物

生地黃

川芎

一兩

枳殼

半兩

芍藥

半兩

右為末酒服方寸匕日三服

赤鯉魚鱗

二兩燒灰

蜚蠊

半兩微炒黃去翅足

狗膽

半兩乾者

蒲黃

半兩

亂髮

二兩 燒灰

麝香

二兩 細研

右同研令細不計時候煎生姜湯童子小便調下一

錢

麒麟竭

出聖惠方

治產後惡血衝心痛氣欲絕

麒麟竭

二兩

沒藥

一兩

木香

一兩

代赭

半兩

麝香

半兩 細研

右搗細羅為散每服煎當歸酒調下二錢如人行五

七里候再服當下惡神效

沒藥散

治產後惡血衝心悶絕疼痛不可忍

沒藥 麒麟竭 當歸判微炒 芫花炒 姜黃

金羅華 凌霄花已上各半兩 麝香一錢細研 狗膽二枚乾者

右為散入研了藥令勻以醋煮麪糊和為丸如梧桐子大不計時候以溫酒調下

芫花丸出聖惠方 治產後惡血衝眼前黑暗或生寒熱或時

狂語或腹痛不可忍

芫花 香墨 釜下墨 當歸切微炒 姜黃

葳靈仙已上各一兩 砒黃半兩

右搗羅為末生薑汁一盞醋一盞同煎熬藥為膏入
神麴末半兩和為丸如菜豆大不計時候煎當歸酒
化下七丸

治產後惡血衝心迷悶

出聖
惠方

生地黄汁

半中
盞

凌霄根汁

半中
盞

檳榔

二枚
剉

羚羊角屑

半
兩

右相和煎至七沸入酒三合分三服溫服

又方

出聖
惠方

羚羊角一兩麝香一錢

右相和細研為散不計時候以熱酒調下一錢

又方出聖惠方

黑豆二合醎醋一大盞

右煎醋令極沸然後投入黑豆煎三兩沸便濾出每服用半合或入煎湯一合相合溫服血暈者服亦効

又方出聖惠方

鷄子一枚米泔一合醋二合

右先煎醋及泔三兩沸入鷄子攪令勻不計時候服

半合

地黃飲子

出聖惠方

治產後惡血衝悶亂口乾

生地黃汁

三合藕汁

三合童子小便

三合

右相和煎三兩沸分溫二服

益母散

出聖惠方

治產後惡血衝心煩悶多渴

益母草

乾藕節

紅花子

各一兩

右搗羅為散每服三錢以水一中盞入生姜半分煎

至六分去滓不計時溫服

療產後惡血衝心或胞衣不下腹中血塊等疾

一名備急方出

大全

良方

用大黃一兩為末以好醋半斤熬成膏以藥末搜膏為丸如梧子大溫醋湯吞五丸良久取下惡物不可多服亦治馬墜內損者及惡血不散服之神効

此藥難用大段虛弱不可服調藥醋不宜太酸恐傷肺臟兩家醫者斟酌

澤蘭散 治產後因驚敗血衝心昏悶發狂如有鬼祟

凡產前後諸病通治

澤蘭葉

石膏

研各二兩

白茯苓

卷栢

栢子

微炒別研

防風

厚朴

製

細辛

淨

桔梗

吳茱萸

炮炒各一兩

人參

藁本

乾姜

炮

五味子

白芷

白薇

半兩

川椒

閉口者炒出汁

黃耆

川烏

炮

丹參

各三分

蕪荑

微炒赤

當歸

判

甘草

炙

川芎

芍藥

各一兩三分

生乾地黄

二兩半

肉桂

一兩一分

阿膠

半兩炒

右為細末每服二錢空心臨卧熱酒調下加辰砂一字煎酸棗湯調一服安

血竭散 治產後敗血衝心胃滿氣喘命在須臾宜服此

真血竭

研

右細末三錢溫酒調服病勢危篤者盡二兩可活凡產後敗血衝心皆因惡露不下始則胃中微滿動加喘急者為難治產後所寶諸方無如此藥神速宜久

畜之以備急用

膏蜜湯 主產後餘血衝心痛急欲死方

猪膏二升 白蜜 生地黃切各一升

右膏煎地黄赤色出之內蜜和之令調分五服日三

紫金丹 治產後衝脹胃中有物狀似噎氣不降

代赭石 礞石各等分

右為細末醋糊丸如桐子大每服三五十九酒下胃中痛加當歸煎湯下久服治血癖

又方

代赭石

桃仁

三錢炒
去皮尖

大黃

五錢

右為末薄荷水為糊丸如桐子大每服三五丸溫水下無時

治產後血悶欲絕

以烏芋搗汁服之

治產後血上搏心悶絕疼痛

以生地黃搗汁飲之

治卒惡血欲死

以鷄蘇一升煮服之

產後積聚癥塊

積聚癥塊夫積者陰氣也五臟所生聚者陽氣也六腑所成皆由飲食不節寒熱不調致五臟之氣積六腑之氣聚積者痛不離其部聚者其痛無有常處所以然者積為陰氣陰性沉伏故痛不離其部聚為陽氣浮動故痛無常處產後血氣傷於臟腑虛弱為風冷所乘搏於臟