

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第二百四卷目錄

醫部彙考二百八十四

方一內五

治風冷寒濕邪致腹脹痛瀉嘔吐逆
吞酸寒濕困倦無力不思飲食一切脾胃之疾
丁香 沉香 木香各一錢半 陳皮 大腹皮
神麴炒各半兩 附子炮去皮臍六錢 萸萸炒
肉桂 白朮各一兩半 厚朴去皮薑製三兩
河子煨去核一兩二錢 人參 茯苓各四錢
縮砂八兩 萸萸加 白附子炮 異薑油炒
紅豆去紅皮 胡椒炒 藜蘆 川薑炮 甘草炙
各一錢 生薑十四兩切片焙乾
右為細末用好酢打糊為丸如梧子大每服五
七十九丸糯米飲送下空心食前下連三服忌一切
生冷物
神應丸

醫部彙考二百四卷

醫部彙考二百八十四

方二

治男子五勞六絕之病皆起於大勞服虛
外受風邪內受寒熱令人手足疼痛膝以下冷腹
中當鳴時泄痢或閉或利面目腫赤平慎慎不
欲聞聞人聲

行入司醫長

乾地黃 葛絲 山茱萸 地麥各五兩 連志
巴戟天各半兩 麥冬 五味子 甘草 人參
菴蓉 石斛 桂心 茯苓 附子各一兩
右十五味治下諸虛服方寸匕日三加至三七無
所禁

健脾丸

治虛勞羸瘦身健重脾胃冷飲食不消背鳴腹脹
泄瀉不止
淮糧三兩 赤石脂 好麴 大麥芽 當歸
黃連 人參 欬石解 龍骨 乾薑 白茯苓
細辛 桂心各二兩 附子一兩 蜀椒六兩
右十五味為末白蜜丸如梧子大酒服十九日三
加至二十九日若飲此方通治男女集驗無細
等症

養稜歸來二十四味養脾丸

治風冷寒濕邪致腹脹痛瀉嘔吐逆
吞酸寒濕困倦無力不思飲食一切脾胃之疾
丁香 沉香 木香各一錢半 陳皮 大腹皮
神麴炒各半兩 附子炮去皮臍六錢 萸萸炒
肉桂 白朮各一兩半 厚朴去皮薑製三兩
河子煨去核一兩二錢 人參 茯苓各四錢
縮砂八兩 萸萸加 白附子炮 異薑油炒
紅豆去紅皮 胡椒炒 藜蘆 川薑炮 甘草炙
各一錢 生薑十四兩切片焙乾
右為細末用好酢打糊為丸如梧子大每服五
七十九丸糯米飲送下空心食前下連三服忌一切
生冷物
神應丸

三台丸

治五臟寒熱積聚腹脹腸鳴而噎食不生腐腐甚
則驅逆者
大黃煨 前胡各二兩 厚朴 杏仁去皮尖
附石各一兩 茯苓半兩 厚朴 附子 細辛
半夏各一兩
右十味為末和蠟五斤杵如梧子大服五丸稍
加至十九丸以止為度
升麻除濕湯

升麻除濕湯

治自下而上者引而去之
蒼朮一錢 柴胡 羌活 防風 升麻 神麴
澤瀉 獨活各五分 炙甘草 陳皮不去白
養稜歸來各三分

右都作一風水一盞煎至一盞去粗空心服之如
胃寒腸鳴加益智仁半夏各五分生薑三片薑一
枚同煎若非腸鳴不得用
沉香溫胃丸

治中焦氣弱脾胃受寒飲食不美氣不調和臍膈
積冷心腹疼痛大便滑瀉腹中雷鳴霍亂吐瀉手
足厥逆便利無度
附子炮去皮臍 巴戟天酒浸去心 乾薑炮
茵香炒各一兩 官桂七錢 沉香 甘草炙
雷歸 吳茱萸洗炒去苦 人參 白朮 白芍
白茯苓 異薑 木香各五錢 丁香三錢
右為細末用好酢打糊為丸如梧子大每服五
七十九丸糯米飲送下空心食前下連三服忌一切
生冷物
神應丸

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第二百四卷目錄

醫部彙考二百八十四

方一內五

治風寒濕邪致腹痛滿刺痛嘔吐泄瀉吐逆
吞酸寒濕困倦無力不思飲食一切脾胃之疾
丁香 沉香 木香各一錢半 陳皮一大腹皮
神麴炒各半兩 附子炮去皮臍六錢 萸萸炒
肉桂 白朮各一兩半 厚朴去皮薑製三兩
河子煨去核一兩二錢 人參 茯苓各四錢
縮砂八兩 萸萸白附子炮 昆薑油炒
紅豆去紅皮 胡椒炒 華荳 川薑炮 甘草炙
各一錢 生薑十四兩切片焙乾 白朮嚼用
白湯送下食前服
三台丸

醫部彙考二百八十四

方二

治男子五勞六傷六絕之病皆起於大勞服虛
外受風邪內受寒熱令人手足疼痛膝以下冷腹
中當鳴時泄痢或閉或利面目腫赤慎慎不
欲閉情聞人聲

乾地黃 葛絲 山茱萸 地麥各五兩 連志
巴戟天各半兩 麥冬 五味子 甘草 人參
菴蓉 石斛 桂心 茯苓 附子各一兩
右十五味治下諸虛服方寸匕日三加至三七無
所寒

健腎丸

治虛勞羸瘦身健重腰骨冷飲食不消背鳴腹脹
泄瀉不止
鹿乳粉三兩 赤石脂 好麴 大麥芽 當歸
黃連 人參 欽石解 龍骨 乾薑 白茯苓
細辛 桂心各二兩 附子一兩 蜀椒六兩
右十五味為末白蜜丸如梧子大酒服十九日三
加至二十九日若飲此方通治男女氣虛無細
等症皆

秦越錦茶二十四味藥酒丸

治中焦氣弱脾胃受寒飲食不美氣不調和臍膈
積冷心腹疼痛大便滑瀉腹中雷鳴霍亂吐瀉手
足厥逆便利無度
附子炮去皮臍 巴戟天酒浸去心 乾薑炮
茵香炒各一兩 官桂七錢 沉香 甘草炙
雷歸 吳茱萸洗炒去苦 人參 白朮 白芍
白茯苓 芎藭 木香各五錢 丁香三錢
右為細末用好酢打糊為丸如梧子大每服五
七十丸熱米飲送下空心食前日進三服忌一切
生冷物
神應丸

治五臟寒熱積聚腹脹腸鳴而噎食不生腐腐甚
則嘔逆者

大黃煨 前胡各二兩 厚朴 杏仁去皮尖
附子 細辛
半夏各一兩
右十味為末和搗五千杵如梧子大服五丸稍
加至十九日為止為度
升麻除濕湯

治自下而上者引而去之

蒼朮一錢 柴胡 羌活 防風 升麻 神麴
澤瀉 獨活各五分 炙甘草 陳皮不去白
蜜製麴各三分

右都作一風水二盞煎至一盞去粗空心服之如
胃寒腸鳴加益智仁半夏各五分生薑三片薑一
枚同煎若非腸鳴不得用
沉香溫胃丸

治中焦氣弱脾胃受寒飲食不美氣不調和臍膈
積冷心腹疼痛大便滑瀉腹中雷鳴霍亂吐瀉手
足厥逆便利無度

附子炮去皮臍 巴戟天酒浸去心 乾薑炮
茵香炒各一兩 官桂七錢 沉香 甘草炙
雷歸 吳茱萸洗炒去苦 人參 白朮 白芍
白茯苓 芎藭 木香各五錢 丁香三錢
右為細末用好酢打糊為丸如梧子大每服五
七十丸熱米飲送下空心食前日進三服忌一切
生冷物
神應丸

治因一切冷物冷水及瀉乳酪水腹痛腸鳴米穀不化

黃連二兩 巴豆 杏仁去皮尖雙仁 百草霜 乾薑各五錢 丁香 木香各一錢

右先將黃連用好酢煮去粗殼將巴豆杏仁同炒黑相盡研如泥將黃連再上火入麻油半兩餘開入在杏仁巴豆泥內攪旋下丁香木香等藥末研勻揉作挺子油紙裹了錠丸用每服三五丸溫米飲送下食前日進三服

五福飲 治一切冷物冷水及瀉乳酪水腹痛腸鳴米穀不化

人參 熟地各陳宜 當歸二三錢 炙草一錢 白朮炒一錢半

治三陰氣血俱虛治轉不行而傷痞腹脹者

右水一鍾煎七分食遠溫服或加生薑三五片

大營煎 治心脾虛寒心腹疼痛等證

當歸二三錢 炙草一錢 熟地三五七錢 枸杞子 杜仲各二錢 肉桂各一二錢 牛膝錢半 右水一鍾煎七分食遠溫服

小營煎 治心脾虛寒心腹疼痛等證

熟地二三錢 當歸 白芍藥酒炒 山藥炒 枸杞各二錢 炙甘草一錢

右水二鍾煎七分食遠溫服

治寒濕傷脾軟滿腹痛 厚朴各錢半 乾薑炮二錢 炙草一錢

右水鍾半煎七分溫服 排氣飲

治氣逆食滯胃腹脹痛 陳皮 藿香 枳殼各錢半 木香七分或一錢 香附 澤瀉 烏藥各二錢 厚朴一錢 右水鍾半煎七分熱服

大和中飲 治飲食滯滯胃腹脹痛 陳皮一二錢 枳實一錢 山楂 麥芽各二錢 砂仁五分 厚朴 澤瀉各錢半 右水鍾半煎七分食遠溫服

小和中飲 治胃腸脹悶 陳皮 茯苓 厚朴各錢半 甘草五分 山楂 扁豆炒各二錢

右水鍾半加生薑三五片煎服 解肝煎

治寒濕傷脾氣逆胃腹脹滿 陳皮 半夏 厚朴 茯苓各錢半 砂仁七分 蘇葉 芍藥各一錢

右水鍾半加生薑三五片煎服 摩清飲

治三焦浮滯胃脹脹痛或肚腹脹氣實等證 白芥子五七分或一錢 枳殼二錢 茯苓連皮 澤瀉各三錢 陳皮 藿香子生一錢 厚朴錢半 大腹皮一二錢 右水鍾半煎七分食遠溫服

掃蕪煎 治諸虛上攻胃腹作痛 青皮 小茴香炒 吳茱萸各一錢 甘草八分 檳榔 烏藥各錢半 細梗子殼碎三錢 砂 雄黃各五分並研極細 烏梅一箇 右除砂雄黃二味餘八味水鍾半煎八分去渣 隨入二味再煎三四沸攪勻徐徐服如惡心加炒 乾薑一二錢或先啜午膳少許候茶頃頓服之炒 十香丸

治氣滯寒滯諸痛 木香 沉香 小茴香 香附酒炒 荔枝核 澤瀉 烏藥 陳皮 丁香各等分 皂角燒煙盡 右為末酒糊丸彈子大者磨化服小者湯引下

芍藥根木丸 治食積痞滿小兒腹大脹滿疼痛脾胃不和 白朮粉炒 赤芍藥酒炒各二兩 枳實數炒 陳皮各一兩

百積丸 治一切停滯胃腸因疼痛等證 陳皮四兩切用鹽二錢入水中拌洗一宿曬乾 半夏製 白芥子 茯苓各二兩 炙甘草五錢 乾薑炒黃一兩 右為末湯浸透餅為丸菜豆大每服錢許白湯下 如胃弱停滯者加台烏藥二兩 神香散

治前證諸藥不效者
丁香 白豆蔻各一分

右等分爲末白湯調下五七分甚者一錢日數服
不拘若寒氣作痛者薑湯下

復蘇丸
治蟲積積腹脹痛

乾漆炒炮壺 雄黃微炒 蘇熒 雷丸 桃仁
皂角燒烟壺 錫灰 檳榔 史君子各等分
輕粉混半 細糧肉加倍

右爲末湯浸蒸餅爲丸菜豆大每服五七分白湯
陸續下如蟲積堅固者加巴豆霜與輕粉同

百厭丸
治一切積滯胃腹脹痛

錦紋大黃一斤 牙皂角炒微黃一兩六錢
右爲末湯浸蒸餅九菜豆大每用五分或一二
錢的宜用引藥丸亦可

大分清飲
治熱閉腹痛

茯苓 澤瀉 木通各二錢 猪苓 車前子
梔子或倍之 枳殼各一錢

右水鍾半煎八分食遠溫服

如內熱甚者加黃芩黃連草龍膽之屬
如大便堅硬腹痛者加大黃二三錢

如邪熱蓄血腹痛者加紅花青皮各錢半
清瀉煎

治痰因火動氣逆青滿強渴
陳皮錢半 貝母散餅二三錢 白芥子五七分

膽星二錢 海石 木通各一錢
右水鍾半煎七分溫服

六味回陽飲
治陰陽將脫四肢寒彰脈

人參一二兩或數錢 炙甘草一錢 製附子
炮乾薑各三錢 當歸身三錢酒洗去心

熟地五錢或一兩
右水一鍾武火煎七八分溫服

理陰煎
治前證

熟地黃三五七錢或一二兩 炙甘草一二錢
當歸二三錢或五七錢 乾薑炒黃色一二三錢

右水二鍾煎七八分熱服或加肉桂一二錢
養中煎

治中氣虛感胃滿嘔泄
人參一二三錢 白扁豆炒二三錢 山藥炒

茯苓各二錢 乾薑炒黃一二錢 炙甘草一錢
右水一鍾煎七分食遠溫服

溫胃飲
治前證

人參 白木各二三錢或一兩 扁豆炒二錢
乾薑炒焦一二三錢 當歸一二錢酒洗 炙草

陳皮各一錢酒洗
右水一鍾煎七分食遠溫服

五君子煎
治前證

人參三錢 白木 茯苓各二錢 炙草一錢

乾薑炒黃二二錢
右水鍾半煎八分溫服

參薑飲
治前證

乾薑炮五分或一二錢或用炭生薑三五片亦可
人參三五錢或倍之 炙甘草三五分

右水鍾半煎七八分徐徐服之此方陳皮薑荔枝
茶皆可酌而佐之

胃腸煎
治脾胃虛寒腹痛不止

熟地三五錢或一兩 山藥炒 扁豆炒各二錢
焦乾薑 白木炒各一二三錢 炙甘草一二錢

吳茱萸製五七分
右水二鍾煎七分食遠溫服

聖木煎
治脾胃虛寒痞脹甚者即以此煎送神香散最妙

白木五六錢至一兩 乾薑炒 肉桂各二錢
陳皮的用或不用

右水鍾半煎七分溫服
內因消心散詳前頁

治井煎
粉甘草 升麻 當歸 川芎 黃芪 白芍藥

山柰仁 乳香 黃芩 羌活 桔梗 天花粉
青皮 白芷

右水煎服
穿心冷藥方

辰砂 伏神 遠志 白茯苓 人參 乳香

沉香 丁香 木香 藿香 麝香 藥仁各等分
右辰砂末二錢金箔五片同研盡心薄荷煎湯下

內毒散
治穿心冷瘡
人參 白朮 白茯苓 熟地黃 甘草 芍藥
黃芪 肉桂 當歸 黃芩酒炒 桔梗 防風

右木煎風濕服十貼常服黃藥丸護心散
六合同生丹
治前證有因生之妙

鉛粉一兩 輕粉 銀珠 雄黃 沒藥炙黃
乳香炙黃各一分五釐

右六味各擇真正好者研為極細末凡治其病先
用好苦茶洗淨瘡口紙箱拭乾復到瘡腫子片用

藥一二分搽腫子上却敷患上符腫子發熱如蒸
良久取去自此依去毒氣定黃毒苦瘡口出膿不

可手擠第二日依前法再敷之第三日亦較之惡
甚可敷七八九次瘡小只敷一次可愈瘡腫子不

發熱勿治矣
又方

治心胃前有毒孔久不愈并治胃癰并疽心肝癰
腫瘡去毛豚炙黃芩 附子炮去皮麻 鹽

右三味各等分爲水用粟肉去皮核爲丸每服三
十九空心酒下

醫胃藥
人參 黃芪 白朮 茯苓 甘草 金銀花
蓮肉 生地 白芍 山梔 黃芩 天花粉

桔梗 防風 青皮 乾薑 麥冬 鼠麴子

右木煎服各加官桂更加黃藥兩加澤瀉
六皮四子湯

治發壯毒
陳皮 青皮 腹皮 五加皮 薑皮 茯苓皮
花粉 蘇子 藟子 甘草 葶藶子 車前子

右水煎服
壯毒方
厚朴 砂仁 半夏 陳皮 人參 白茯苓
青皮 白朮 木香 枳殼 甘草 甜瓜子

黃芪 芍藥
右水煎服
內托洩氣散

治胎胎毒
人參 木香 黃芪 厚朴 甘草 紫蘇葉
桔梗 枳殼 官桂 檳榔 烏藥 天花粉

芍藥 白芷 川芎 防風 當歸
右薑三片薑一枚水煎服

薑附子散
薑附子散
治漏瘻有膿者

薤白仁十分 附子二分 敗醬五分
右三味并爲末取方寸匕以水二升煎淨頓服

小使當下
又方
治漏證

生地黃五兩 牡丹皮 甘草 敗醬 生薑
茯苓各二兩 桔梗 薤白仁 麥門冬各三兩

丹參 芍藥各四兩

右十一味改咀以水一斗煮取一斗三分服日三
又方

治前證
薤白仁一升 丹皮 桃仁各三兩 瓜瓣仁三升
右四味改咀以水六升煮取一升分再服

大黃牡丹湯
大黃四兩 牡丹三兩 芒硝二兩 瓜子一升
桃仁五十枚

右五味改咀以水五升煮取一升頓服當下膿血
奪命丹

治諸般腫毒疔疽惡瘡
硃砂三錢 白礬石 寒水石 銅綠 滴乳香
明沒藥 麝香各一錢 蝸牛三十一粒另研

曬酥 輕粉各五分
右爲細末丸如菜豆大知不就如好酒糊每服一

丸生葱三五莖嚼爛吐於手心包藥在內熱酒
和葱送下如重車行五七里許汗出爲效重者再

服一二丸
勝金丹

治前證
麝香 白礬石各五分 雄黃 辰砂 滴乳香
明沒藥 血竭各錢半 全蠍炮炙 穿山甲炙

天龍去頭足炙各三錢 白環蜜炙去絲五錢
蟾酥一錢

右爲細末和勻每服三分赤砂糖調薑酒送下
取汗爲度

一柱金丹

治前證

沉香 木香 滿乳香各五分 巴豆霜錢半
右為細末和勻用黑鹿膠半斤去皮搗爛為丸如
芡實大每服一丸單人虛實先呷水一口行一大
胃氣壯實者只可呷水三四口不可太過後用木
一口送藥下行盡數大以米飲補之

仙方活命飲

一名真人活命飲治一切癰疽疔成膿者內消已
成膿者即潰止痛消毒之聖藥也
瀟乳香研 防風 香白芷 赤芍藥 當歸尾
貝母 明沒藥研 皂角刺炒 花粉 甘草節
穿山甲炮各一錢 陳皮 金銀花各三錢
右為粗末大者四兩小者二兩作一劑無灰酒十
茶鍾沸小五茶鍾入有嘴瓶內以厚紙封口勿令
泄氣煎至三大鍾去滓作三次服接連不斷隨藥
上下服能飲酒者服藥後再飲三五杯忌酸薄酒
鐵器服後側睡覺痛定回生

十全大補湯

治一切潰瘍并老弱人之病
人參 肉桂 生地酒洗蒸常 川芎 白芍炒
白茯苓 白朮土炒 黃芪鹽水拌炒 當歸酒拌
各一錢 甘草炙五分
右作一劑水二鍾薑蔥煎服
十宣散
治一切癰疽
人參 當歸 黃芪製 生甘草 川芎 防風

厚朴 桔梗 官桂 白芷各一兩

右為細末每服二錢加至六錢止熱酒調下日數
服以多為妙不飲酒者用水香濃煎湯下

封勝散

治癰疽疔毒

陳艾葉 蛇床子各一兩 木鼈子二箇帶殼生用
右為末和勻用絹包裹安在勝上以紙團圍定以
煨斗火煨之為妙

代灸塗膏

治下元虛寒膀胱冷痛
大附子 馬薊子 蛇床子 木香 吳茱萸
肉桂各等分
右為末入白麝薑汁調稠作片貼臍上以絹包裹
定痛三香飲

治癰疽

乳香 香附 木香 延胡索 人參 黃芪
當歸 川芎 芍藥 防風 官桂 香白芷
桔梗 枳殼 烏藥 厚朴 甘草
右薑三片煎一校煎服夏天去桂加乾葛黃本生
地家冬

何首烏散

治癰疽
何首烏 蔓荊子 石菖蒲 荆芥穗 甘菊花
枸杞子 苦參 威靈仙各半兩
右為細末每服三五錢食後溫酒調下或茶清或
薑水亦得日連一服

單方

心腹冷痛男子病命女人取水一盞飲之女人病命
男子取水一盞飲之
獲勝沙涌陰陽腹痛手足冷但身上有紅點以聲草
攤攤點火烘於點上
卒患心痛舊地作王字撮取中央土水和一升服良
急心痛五十年陳壁王祐藥一錢為末蜜丸艾湯服
方寸金

獨勝死人塚上土作泥塗之良方

冷熱心痛伏龍肝末方寸七熱以水服冷以酒服

卒心氣痛鑊鑊二錢熱小使瀉下

中惡心驚鑊鑊五錢鹽一錢同研勻熱水一盞調下

心氣刺痛自熱銅火煨酢洋九次研末酢酒一字服

小兒腹脹肚皮青色並用胡椒粉熟色裹以麻腹上

血氣攻心痛不可忍藥根到酒浸服之速方寸

婦人心痛急者好官粉為末煎汁和九小豆每服

七九黃酒送下即止粉能殺蟲能透氣故也

痰結胃中不散密陀僧一兩酢水各一盞煎乾高木

每服一錢以酒水各一小盞煎一盞溫服少頃當吐

出痰涎為妙

心腹煩滿及胃弱痛欲死者比驗錢二十枚水五升

煮三分分三服

冷心氣痛古文錢一箇打碎大核桃三箇同炒熟入
酢一椀衝服方

走注氣痛車缸燒赤濕布裏熨病上方

寒氣心痛三十年者附固食菜黃等分其末蜜丸麻
子大每酒下二九日三服劉國英所藏之方方

心痛有亂光花一兩酢炒雄黃一錢為末每服一字
溫酢湯下方

一切心痛不拘大小男女大馬兜鈴一箇燈上燒存
性為末溫酒服立效方

胃痛微背心腹痛滿氣不得通及治痰嗽大苦薑去
蠟取子炒熟和殼研末糊丸梧子大每米飲下二
三十九日一服方

條終身不發
又方當歸為末酒調服方寸匕方

心寒心煩內無宿根煮汁頓服方

中惡心痛及連脈痛如蠶子大青布裏燒赤酒酒
心頓服毒吐惡物愈方

心腹脹痛四肢欲厥五合水一升煎服吐下即定
不吐更服方

男婦心痛用砂明膠各等分為末湯調服方

犀角燒粉炒鹽一包煎其心腹令氣透又以一包煎
其背方

諸心腹痛始痛者各一錢研細末每點少許入背
內名火龍丹方

心腹宿蠱及卒得蠱瘰砂研搜極以壁羅一隻微
二日以飯阿之炊養蠱燻為末溫酒服方寸匕日三
服服盡更作食乃止方

血痢腹痛服粉五錢定粉三錢同研水浸香餅心少
許和九菘豆大每服七九或十九艾一團水一盞煎
湯下方

結得鴉頂丹不開除陽毒黃沙燒研膏心等藥用
銀珠半兩明礬一兩同研以鬚斗盛火瓦垂暴暴鎔
化急刮投丸每服一錢煎入薑汁少許服之心上
腫腫有聲結肉自散不動膿膿不傷氣明變化痰
銀珠破積也方

女唾調塗外腎女用明鹽塗乳上得汗即愈方

冷氣心痛薑砂三分五厘酒一升為末糊丸麻子
大每服二九食前石菖蒲生薑湯下方

胃積氣滿心痛不想食一錢炒微黃為末非特
以清酒飲調下二合方

卒熱心痛生麻油一合服之良方

絞腸沙痛薑麥粉一椀炒水吞服方

卒心氣痛樗米一升水六升煮六七沸服方

心氣疼痛高案根煎湯溫服甚效方

心痛不差數十年者桑木淘汁溫服方

冷氣心痛桃仁二兩去皮水研絞汁入青桑米四合
煮粥常服方

蠶蟲心痛薑黃根一斤切末七升煮三升服之蠶死
盡出也方

羅滿腹大四散枯瘦尿澀用甜葶藶菜根等分
為末煉蜜丸彈子大每服一丸陳皮湯下只二三九
小便清十餘丸散如故方

小腹痛手足厥逆或欲苦寒之劑多未食先嘔不
思飲食山藥半升炒為末依服一錢一日服
心腹脹服手不厥逆或欲苦寒之劑多未食先嘔不
思飲食山藥半升炒為末依服一錢一日服
大有功效忌穀生方

腹脹黃腫用亞歷亞連子燒存性每服一箇食前
溫酒下不飲酒者白薑下十餘日見效方

心下急痛桑耳燒存性熱酒服二錢方

胃毒痛如錐刺不得視仰自汗出或散背不上治或
至此可取生韭或根五升洗淨汁服之方

卒心急痛牙關緊閉欲絕以老葱白五莖去皮搗為
膏以匙送入咽中灌以麻油四兩但得下咽即見少

頭暈昏化黃水而下水不再發者得故人

腹及麻痺不仁者多疑惡白食之即自愈

心痛吐水不下飲食止不定難黃一兩煎一斤復

火煎成膏用乾漆餅和九栲子大每服七九薑湯下

除毒疫痛厥逆辟疔瘡六脈欲絕者用葱一束去

根及青白二寸烘熱安罽上以髮斗火熨之薑湯

別灸之良久熱氣透入手足溫有汗即罷乃服四逆

湯若發而手足不溫不可治

胃痛症而復發者根五升搗汁飲之立瘥

奔豚氣痛難白搗汁飲之

積年心痛不可忍不拘十年五年者隨手見效

小蒜食飽勿著鹽甘用之有效再不發也

血逆心痛生蒜搗汁服一升即愈

鬼疰腹痛不可忍者獨頭蒜一枚香墨如蠟大傷和

醬汁一合頓服

卒患腹痛山豆根水研汁半盞服之

心腹惡痛艾葉搗汁飲之

心痞嘔噦心下痞堅用生薑八兩水三升煮一升半

五合洗水五升煮一升取汁同煮一升半分再服

腹中脹滿結裏蠅蟻內下部冷即易之

凡心胃脘下有邪氣結實痛脹滿者生薑一斤搗

查煎汁慢炒待酒以絹包於患處軟散之冷再

以炒再製良久豁然寬快也

蛇蟲心痛吐清水七月七日採茨菰子陰乾方寸七

日二服

心腹結氣杏仁桂枝橘皮阿膠粉皮等分為丸每服

三十丸白湯下無忌

心腹脹痛短氣欲絕者烏梅一七枚水五升煮沸納

大錢二七枚煮一升半頓服

卒然心痛桃仁七枚去皮尖研爛水一合服之

人有氣從膝左右起上背胃滿氣促鬱胃厥者用梨

木灰伏出雞卵殼中白皮紫蓋蒸黃去柄等分為末

搗丸栲子大每服十九酒下亦可為末服方寸匕或

黃湯服

勝下絞痛木瓜三片桑葉七片大棗三枚水三升煮

半升頓服即愈

冷逆心痛腹去白煎湯飲之甚良

途驅氣及酒食後飽急快痛瀉青橘皮一斤分作四

分四兩用鹽湯浸四兩用百沸湯浸四兩用酢浸四

兩用酒浸三日取出以刀切絲以鹽一兩炒微焦

研末每用二錢以茶末五分水煎溫服亦可點服

卒腹痛古上寫風字紙上寫藥二字相支吞之

急心氣痛楊桃一箇去殼藥子一枚去核用紙裹

熨熱以生薑湯一鍾細送下水久不發名蓬瀉湯

脾胃冷痛白艾末湯調服二錢

蛇蟲心痛如刺口吐清水白蠶艾一升水三升煮一

升服吐蠶出或取生艾搗汁五更食香蒲一片乃飲

一升當下蟲出

血氣脈滿刺奇奴種實為末每服三錢酒服不可

過多令人吐利此破血之仙藥也

男女氣厥心悶飲食不下冷熱相攻久患不愈用厚

朴薑汁炙焦黑為末以陳米飲調服二錢七日三服

方寸

重氣刺痛紅藍子一升搗碎以無灰酒一大升拌于

曝乾重搗碎蜜丸栲子大空心酒下四十九

小兒卒然肚皮青黑乃血氣大發風寒來之危惡之

候也大青為末納口中以酒送下

又方用厚朴薑汁炙研末新汲水服二錢如神

九疔心痛及腹痛梨瀝氣筒因乾漆一兩搗炒烟

盡研末酢漿粉糊丸栲子大每服五丸至九九熱酒

下

心氣痛白芨石榴皮各一錢為末煉蜜丸黃豆大

每服三丸艾煎湯下

腹中絞痛瀉瀉為末以酢和方寸匕服之

九種心痛當太腹上取新生楊枝一握去兩頭用木

三大升煮取一升頓服

胃中絞結皂莢三挺去皮切水五升浸一夜攪取

汁

第四三九篇之〇四篇

汁攪熬至可丸如梧子大每食後鹽麥水下十九

又方用半夏酢煮過以皂角膏和勻入明礬少許以

柿餅搗膏丸如彈子大噴之各釣痰膏方

應瀉癖症如石積年不損者必效方用白楊木東枝

去粗皮辟風細剉五升熬黃以酒五升淋泛用絹袋

盛淨漉酒溫中密封再瀉每服一合日三服

脾痛不止荔枝核為末酢服一錢數服即愈

傷寒痲疹滿胸下早成瘡按之虛軟而不痛檳榔

實等分為末每服二錢黃連煎湯下

分一服

心脾作痛難心慎擲高良薑各一錢半陳米百粒同

以水煎服之

天行痢四五日結胃滿痛壯熱苦參一兩以酢三升

煮取一升二合飲之取吐即愈

腹內感冷生根擲去不折者用四十粒以漿水洗

宿令合口空心新汲水吞下入服暖臍駐顏黑髮

明目令人思飲食

心腹冷痛以布裹椒安痛處用杖半發合椒出汗即

止

冷感心痛川椒四兩炒出汗以酒一椀淋之只服酒

卒然心痛黃連八錢炙咀木煎熱服

肝火為痛黃連薑汁炒為末粥糊丸梧子大每服三

十九白湯下

留飲腹痛每服一二兩巴豆二兩去皮心敷搗以棗膏

又方飯豆十四枚巴豆一枚鼓十六枚合搗為二九

服之取吐即愈

心腹冷痛胡椒二七枚清酒吞之或云一歲一粒

心下大痛用川椒四十九粒香各一錢研勻男用生

薑女用當歸酒下

又方用椒五分汶麥三錢研細分二服溫酒下

心腹冷痛吳茱萸五合酒三升煮薄分三服

冷氣腹痛吳茱萸二錢搗爛以酒一鍾調之用香油

一杯入鍋煎熱飲吳茱萸酒不飲吳一滾取服立止

轉難已成小腹腫痛小便似淋或大便難溼下藥用

藍瓜子一合當歸炒一兩乾薑一條炙咀每服四錢

水一盞半煎一盞食前服和惡物為妙

腹中筋脈白帶以酒二升煮服之不遇再服

急心疼痛用黃蠟燈上燒丸九疋子六百草霜為衣

井水下三九

陰毒腹痛露蜂房二錢燒存性慈白五寸同研為丸

男左女右著手中懸隊之汗出即愈

心疼痛用五倍子生研末每服一錢鐵杵內炒起

煙黑皂為度以好酒一鍾入杵內服之立止

腹內龜病時云人間龜病不堪言杜葉生成硬似磚

自死覆白馬鬃不過時則軟如綿神效

男婦心痛不可忍者服薑汁一兩滾酒過湯淨取

清水服即止

除腹腹痛桑菊包煎煎飲伏天為末每服三錢熱

酒下取汗

卒倒無醒實搗末湯服方寸匕日三夜

蛇咬心痛背口中沫出臨死者取烏竹十斤剉以

水一石煎至一斗去滓煎如飴獨宿勿食空心服一

升臍即下也仍常煮汁作飯食

心脾痛芭蕉花燒存性研鹽湯服二錢

傷寒後卒倒無醒實搗末湯服二錢

二服

產後腹痛枳實炒芍藥酒炒各二錢水一盞煎服

亦可為末服方

老幼腹脹血氣凝滯用此寬勝氣名四炒丸商州

枳殼厚而味背者去鹽四兩分作四分一兩用黃末

一兩同炒一兩用薑末一兩同炒一兩用乾漆一

兩同炒一兩用茵香一兩同炒黃去四味只取枳殼

為末以四味煎汁黃鈔糊為丸梧子大每食後米飲

下五十九

冷熱腹痛疝刺不思飲食山梔子川烏頭等分生研

為末酒糊丸如梧子大每服十五丸生薑湯下小腹

痛尚香湯下

腹脅刺痛因腎虛冷不可忍者練鐵鈎子一合焙

漉分二錢半水一盞煎五分入好酒半盞更煎三五

沸分二服

卒心刺痛梅李仁三七枚攪爛以新汲水或溫湯下

須臾痛止却押薄荷湯下

地膚子即愈方
惡氣心痛碾硝中燒灰一錢留屎燒灰五分溫酒服

譚龜心痛吐清水飽脹淡菟包食三五度即差方
心氣痛痛氣實有痰者牡蠣殼粉酒服二錢心丹

心氣疼痛真蛤粉炒香附末等分白濁洋服方
心脾痛不止者水甲散主之用田螺殼燙開者亦可

以松葉片屑層疊上燒過火吹去松灰取殼研末以
烏沉湯中散之麵調服一錢不傳之妙

瀉氣疼痛白玉散用壁土陳白蠟蟬研每服一錢
酒下甚效

卒然心痛白雞一頭治如食法水三升羹一升去雞
煎取六合入苦酒六合真珠一錢煎取六合納麝香

一豆許頓服之方
陰毒卒痛用雄雞冠血入熱酒中飲之腰臥取汗

陰毒腹痛雞糞烏地膚子各一把亂髮一團同炒
烟起俟入好酒一椀浸之去淨熱服即止

小兒心痛白烏骨雞屎五錢麝研松脂五錢為末葱
瀝汁和丸梧子大黃丹為衣每醉湯服五九忌生冷

硬物三四日立效
心氣作痛羅子一枚打破酢二合調服

就雞攻心吐清水以蠶子一枚去黃納好酒入雞
子燒中和合仰頭吞之蠶即出也

除惡腹痛面青甚者鴿子糞一大抄研末熱酒一
錢和勻溫頓服即愈

蝨蟲腹痛白鴿屎研飲和服之

冷氣心痛鴿屎炮存性酒服一錢即止
血氣刺痛用五靈脂生研三錢酒一盞煎軟薄熱服

卒暴心痛五寶脂炒一錢半乾薑炮三分為末熱酒
服立愈

心脾痛不拘男女用五靈脂檳榔等分為末水煎
石菖蒲酒服三錢作餅用猪肉一二片

細蕪攻心刺痛吐清水草龍膽一兩去頭刺水一盞
煮一盞隔湯勿食平旦頓服之

急心疼痛猪心一枚每破入胡椒一粒同鹽酒煮食
中風腹痛支大醫秘方以猪肝一具薑一升共煎分

二十服或為丸服
智腹冷痛猪腎一對桂心二兩水八升煮三升分三
服

攪腸沙痛用母猪生兒時拋下糞日乾為末以白湯
調服

脾胃虛冷腹痛瀉痢痛肥狗肉半斤以水同鹽豉煮粥
頓食一兩頓

血氣痛不可忍者用黑狗膽一箇半乾牛溲煎開
以鴿子排九菜豆大給粉滾過每服四十九以微滓

酒送下痛立止
心氣疼痛不同遠近以山羊糞七枚油頭裝一團燒
灰酒服

卒心氣痛羅羅殼計五合熱服即止
蝨蟲心痛用六畜心生切作四瓣橫橫到路夾砂

或埋黃於中吞之鼻死即愈
蝨蟲心痛熱煎一大豆和水服之

胃弱痛用羚羊角燒末水服方寸匕
心痛不止散藥頭三箇燒末無根水服立效

急肚痛用本人頭髮三十根燒過酒服即以水調
芥子末封在臍內大汗即愈

絞腸痧痛宜小便服之即止
卒然腹痛令人解其腹瀉

小兒腹痛蟲積或藥毒驚倉一錢為末每用一字
乳汁調下

腹中冷癖水致寒結心下停痰兩脅痞滿鳴轉逆害
飲食大蠅蝨一枚去皮腸支解之芒病強人一升中

人七合病人五合水七升藥四升頓服得下為度
腹大如箕用蜈蚣三五條酒炙研末每服一錢以雞

子二箇打開入米在內攪勻紙糊湯湯煮食之日
一服連連三服

陽毒結胃按之極痛或通而復結喘促大躁狂亂取
生地龍四條洗淨研如泥入生薑汁少許

荷汁少許新汲水調服若燥者加片薑少許即與
採心下片時自熱汗出而解不應再服

凡心下硬按之則無常覺脹滿多食則吐氣引前後
噎呃不除由思慮過多氣不以將而引則結滯謂之

結氣人多一兩痛皮去白四兩為末煉蜜丸梧子大
每米飲下五六丸

胃滿不痛用枳殼枳殼各等分水一鐘煎一鍾溫服
胃院氣作痛水紅花一大撮水一鐘煎一鍾服百

戶毛茛菪散方也

脾寒氣鬱胃痛不可忍者萊菔桃仁各一兩和炒令
萊菔焦黑後去萊菔取桃仁去皮尖明細葱白三莖
煨以酒浸溫分三服方後

心痛氣效方冰梅一箇去核生硫黃糯米相和搗勻
以可丸為度作一丸白湯下立愈痛不再作

治內癰未作頭者用伏龍肝服之即愈方後
脾冷腹痛嘔吐乾薑三錢甘草炙半錢棗一枚同
煎服或為末和飲服方後

又方稻殺苦酒空腹服方寸匕佳

又方七月七日採葉萎于陰乾燒灰先食鹽方寸匕
日三即愈

非心痛用楝白皮糞汁空腹以意服方後
暴心痛苦參十斤咬咀以水一石糞取二斗去滓下
苦酒一斗更糞取五升加大黃末熟和汁中煎令可
丸併手丸之如梧子大每服以酒一升送三四九
日一當倒腹吐不吐下利更瀉清苦參一斤浸久瀉
佳非止暴痛凡是腹中之疾悉主之又治積冷血結
除蟲蠱用有效大良

又方桂心一兩咬咀以水四升糞取一升半分三服
暴心痛用鷄蘇為末蜜丸如梧子大服四十九丸蜜湯
下日一服可加至五十九丸極酒肉

腸蠱蟻雜頂上毛并屎燒存性為末空心酒服之
又方截取糖頭尖少許燒灰水和服當作孔出膿血
取愈

凡腸蠱其狀兩耳輪文理甲錯初患腹中苦痛或積
膈有瘡如粟皮熱便血出似赤白下不治必死方
用此踏灰以蓮子白和塗即投氣不過再

內癰馬牙灰以麩子白和塗之乾則易
腸蠱瓜子仁三升搗末以水三升糞取一升五分分
作三服

寸白蠟心胃痛復牙五兩搗末蜜丸梧子大隔宿不
夜食朝旦以漿水下合服委愈

一切心痛無問新久生地黃一味隨人所食多少搗
汁攪麪作餅乾或冷淘食良久當利出蟲方後

欽定古今圖書集成博物彙編醫部全錄

第二百五卷目錄

醫部全錄一百八十五

醫部全錄一百八十五

鍼灸

專引

醫案

藝術典第二百五卷

醫部全錄一百八十五

醫部全錄一百八十五

鍼灸

專引

醫案

卷問曰中滿者滿之於內

心滿者胃中痛脅支滿脅下痛膈背肩胛間痛虛則

胃腹大谷下與腹相引而痛取其經少陰太陽舌下

血者其變病刺邪中血者

痛痛者除也痛而以手按之不得者陰也深刺之

忌諱李青引少腹而痛腹刺瀉瀉

肝病者兩脅下痛引少腹令人善怒取其經厥陰與

少陽

脾虛則腹滿腸鳴泄食不化取其經太陽陽明少

陰血者

腎病者腹大腰腫喘欬身重寢汗出憎風虛則胃中

痛大腹小腹痛滿腹意不舉取其經少陰太陽血者

腸明之厥則瀉疾走呼吸腹滿不得臥而赤而熱者

見而妄言太陽之厥則腹滿腹後不利不欲食食

五八副書集茂

醫部全錄
醫部全錄
醫部全錄

則腹不得臥少陰之厥則口乾澀赤腹滿心痛厥除

之厥則少腹脹滿腹脹泄瀉不利好臥足膝陰縮腫

厥內藏空則胃之虛則補虛不盛不虛以揮取之

太陽厥逆新急擊心痛引腹治主病者

厥陰厥逆新急擊心痛引腹治主病者

手足陰厥逆虛而致者喘沫治主病者

少陰厥逆虛滿嘔噦下泄清治主病者

胃經經口心痛引腹吞酸取足少陰

心痛腹脹脈滿大便秘利取足太陽

心痛引背不得息刺足少陰不足取手少陽

心痛引小腹滿下無常處便難刺足厥陰

心痛短氣不足以息刺手太陽

心痛當九刺之痞已刺按之立已下求之

得之立已

厥心痛引背相按者控如從後觸其心僂僂者腎心

痛也先取脊背按脊脊欲取然谷

厥心痛腹脹胃滿心九種取胃心痛也取之大都太

白

厥心痛痛知以難刺其心痛甚者腎心痛也取之

然谷太谿

厥心痛名若若如死狀終日不得太息心痛也取

之百間太衝

厥心痛臥者能居心痛間動作痛甚甚不覺肺心

痛也取之魚腹太淵

心痛不可刺者中取有聲不可取於腹

腸中有蟲聲及絞痛皆不可取以小鍼心腸痛慢作

痛難聚在上下行痛有休止然熱者湯遲出者是

蛟蛇也以手按其而堅持之令合得將以大鍼刺之

入持之過不動乃出鍼也甚腹腹痛形中上者

小腸控等引腹脊上衝心邪氣盛則厥逆上衝腸胃

薰肝散於背結於臍故取之背腹之刺太陽以

之經以調之

大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬日重感於寒即泄

當臍而痛不能入立與胃同候取巨虛上廉

胃病者腹脹胃脘當心而痛上支兩脅為咽不通

食飲不下取之三里也

小腸病者小腹偏腫而痛以手按之即欲小便而不

得取委中夾

三焦病者腹氣滿小腹大堅壓不得小便者急澀則水

留即為脹取委陽

邪在脾胃則病肌肉痛腸氣不足陰氣有餘則寒中

腸鳴腹脹皆調於三里

邪在腎則骨痛除痹脹腰痛大便難取之湧泉

見審視有血者盡取之

邪在心則病心痛喜悲特眩仆視有餘不足而調之

其驗也

腹中常鳴氣上衝胃脘不能入立邪在大腸刺胃之

原巨虛上廉三里

厥逆腹脹滿腸鳴皆滿不得息取之下臂二臂軟而

動手者與背腹以手按之立快者是也

厥面腹脹滿然多寒氣腹中發酸復洩難取足太陽

腹滿食不化腹脹滿然不能大便取足太陽

第四三九篇之〇六葉

博物彙編醫部全錄第二百五卷醫部全錄

邪之所在皆為不足中氣不足便為之變腸為之
苦鳴補足外舉下陷之

甲乙藥曰胃滿痛瘕瘕主之

暴厥胃滿積滿足寒大便難面黃白時時嘔血太衝
主之

胃得積滿痛引胃中華蓋主之

胃得積滿痛癆骨疼飲食不下嘔逆上氣煩心紫宮
主之

胃中滿不得息骨痛骨疼喘逆上氣嘔吐煩心玉堂
主之

胃背背相引痛心下胃中嘔吐多睡飲食不下齒門
主之

胃背積滿痛引腹不得息問亂煩滿不得飲食重城
主之

胃中暴滿不得眠飯積主之

胃背積滿寒如風吹狀候診主之

胃背積滿切背痛臥不得轉側胃師主之

大寒不得息息即胃中痛實則其身重寒虛則百
節盡縱大包主之

胃中滿天客主之

胃得積滿發寒主之

胃得積滿發寒便主之

胃滿不得息頭暈睡臥各主之

胃得積滿滿寒飲食不下嘔吐食後遺出中庭主之

胃得積滿頭痛項內寒熱外丘主之

胃得積滿滿寒引膈腹痛短氣煩滿巨關主之

胃得積滿不得息欬逆孔癰泄瀉惡寒神封主之
胃得積滿腸逆不通呼吸少氣喘息不得舉臂步耶
主之

胃得積滿惡聞人聲大音巨虛上廉主之

胃下滿積滿積乳根主之

胃得積滿逆上寒呼吸喘息不知食味氣戶主之

胃得積滿腸痛切痛太白主之

心痛不可孩煩心巨關主之

心痛痛尺澤主之

心痛有最多滿不得反側上管主之

心痛上搶心不欲食支痛引唇建里主之

心痛善怒厥逆變心知微之狀心恆如驚大陵及關
使主之

心寒痛難以得伸心痛骨死不知人中腕主之

心痛如喉痛血驚惡畏人神氣不足卻門主之

脾逆氣厥急短心善睡噫噎胃滿嗝呼胃氣上逆
心痛太滿主之

心痛卒欬逆尺澤主之出且立已

胃脾心痛胃內振大天并主之

胃脾心痛不得息痛無常虛盛逆主之

腹中寒寒外腹主之

大腹寒中大便難腹中切痛者胃輸主之

臍脾痛準心察寒注利腹結主之

大腸轉氣接之如實杯熱引胃痛脾氣寒四肢不收
不嗜食脾虛主之

胃中寒腹食多身腫寒逆腹中滿而鳴腹脹風腹骨
脅積滿吐吞急肺積寒食不下胃虛主之

頭痛食不下腸鳴腹脹欲嘔時溼三焦命主之
腹脹腸鳴胃中傷飽食飲不化中庭主之

腸中常鳴時上衝心炎腸下

腸鳴相逐不可傾倒承滿主之

食飲不下腹中雷鳴大腸不節小使黃腸積主之

多臥善睡胃滿腸鳴三關主之

胃胃間逆氣切痛食不化不嗜食身腫依臍空天樞
主之

腹中鳴鳴益盈飲食不化胃痛不得臥煩熱中不嗜
食胃得積滿喘息而衝膈心痛及傷飽面黃骨立

腹脹章門主之

腹滿響響然不便心下有寒痛商丘主之

腹中熱若寒腹善鳴強欠時內痛心惡氣逆腹滿滿
谷主之已刺外踝上氣不止腹脹而氣怏怏引肘脅
下背主之

大腸有熱腸鳴腹滿快腸痛食不化喘不能久立巨
虛上廉主之

腸中寒腹滿善噎聞食臭胃氣不足腸鳴腹痛泄食
不化心下脹三里主之

厥逆腹滿腹脹鳴胃滿不得息取之下胃三助開取
而動應手者與胃俞以指按之立快

小使黃赤腸鳴相逐上廉主之

千金方曰胃脾心痛發腹中百壯穴在鳩尾上一寸
忌針

胃得積滿心痛弱門隨年壯穴在第一助端下一寸
通谷及章門及曲泉與膈虛期門食積格石門等

主臂支滿

大行及心脈主臂中鬱鬱

本神及顯惠主臂氣相引不得傾側

天樞主腹脈喘喘氣上衝胃

氣衝主臂腹中大熱不安腹有大氣暴脹滿鬱閉注

澤

神堂主臂腹滿

三間主臂滿脹

關竅及天容主臂滿不得息

期門及缺盆主臂中熱息貫得下氣上

曲池及入逆與神道章門中府臨泣天池環璣府輸

主臂中滿

支滿主臂腹急痛

豐隆及丘墟主臂痛如刺

臨泣主季背支痛臂痹不得息

陽輔主臂臂痛

陽交主臂滿脹

環跳及至陰主臂臂痛無常處嚴臂相引急痛

太白主臂中寒欬唾有血

然谷主臂中寒欬唾有血

大體主臂喘息聚

臍輪及章門主臂痛不得臥臂滿無所出

大包主臂臂中痛

臍中及天井主臂中痛

華蓋及紫宮中庭神藏靈墟胃脘俠步廊商陽上廉三甲氣戶周榮上皖勞宮涌泉陽泉主臂臂注

膺虛主臂臂痛

乳根主臂下滿痛

雲門及中府應日期門神庭魂門大陵主臂中痛又

云雲門主臂中暴逆

鳩尾主臂滿欬逆

巨關及間使主臂中澀澀又云主臂臂相引

大衝主風痙恐懼氣不足腹中他他

梁門主臂下積氣

大泉主臂滿臂痛

魚際主臂走臂背不得息

經渠及丘墟主臂背念臂中影影

少衝主臂痛口乾凡臂滿短氣不得汗汗絨補手太

陰以出汗

心痛支滿及太髀然谷主心痛如錐刺甚者手足寒

至節不舉者死又云然谷主心知懸少氣不足以息

大都及大白主暴泄心痛腹聚心痛尤甚

臨泣主臂痛不得反側

行間主心痛色蒼蒼然如死灰狀曰不得太息

通谷及巨闕及太倉與心膈腹中神府主心痛

通里主卒痛煩心中懊憹數欠頓伸心下悸甚恐

期門及長強及天突俠白中衝主心痛短氣

尺澤主心痛形熱心煩悶亂少氣不足以息

腎輸及復溜及大陵及雲門主心痛如懸

章門主心痛而嘔

鳩尾主心寒腹滿不得食息貫吐血厥心痛善噦心
 痛太息

上皖主心痛三蟲多涎不得反側

中膈主心痛難以後仰

不容及期門主心切痛喜吐酸

胃門主心下大堅

靈道主心痛鬱恐相引痙痙

間使主心懸如微

孤門及曲澤大陵主心痛

商丘主心下有寒痛又主脾虛令人癯不美好太息

凡卒心痛汗出刺大放出血立已

內關主凡心實則心中暴痛虛則心煩惕然不能對
 夫背

腹病復留及中封腎輸承筋陰包承山大敦主小腹
 痛又云復留主腹厥

石門及商丘主小腹堅痛下引陰中

氣海主小腹痙氣遊行五臟腹中切痛

關元及委中照海太髀主小腹痛熱而痛痛

臍輸及陰谷主腹脹因脹暴痛及腹積聚肌肉痛

高曲主主腹中積聚時切痛

四滿主腹俯切痛

天樞外陵主腹中重痛

尾骨主身痛喘暴滿

氣衝主身熱腹脹

腹結主臍痛痛心

街門主寒氣滿腹中積痛淫淫

隱白主腹中寒冷氣脹痛

鳩尾主腹皮膚痛癢癢

中極主腹中熱痛

水分及石門主小腹中拘急痛

巨關及上脘主小腹踴主腹中滿暴瀉汗出

行間主腹痛而熱上狂心下滿

太陰主腹中相引痛

涌泉主腹入腹中小腹痛

豐隆主胃痛如刺腹若刀切痛

中極主小腹聚聚堅如石小腹滿又云中極主裏中

腹脹

通谷主結積胃飲瘕囊胃滿飲食不消

上脘主心下積聚聚冷脹

胃脹及三焦踴主小腹積聚堅大如盤胃脹食飲不

消

三里及壺門居門屬兌內庭陰合絡都胃署商丘陰

谷曲泉陰陵泉主腹脹滿不得息又云陰陵泉主腹

中脹不嗜食脅下滿腹中盛木脹逆不得臥又云衝

丘主腹中滿鬱鬱然不使心下右寒痛

期門主腹大堅不得息裏滿小腹九大大陰邪主

度滿積聚

解絡主腹脹不通理大使堅裏思損傷氣積聚腹中

某病有膿積往來上下

水道主小腹痛痛引脅中

巨關及上脘主小腹欲走太息

五里主心下鬱積痛上氣

太白及公孫主腹脹食不化鼓腹腹中氣大滿

蠶溝主數噎恐悸裏不足腹中中極

凡腹滿痛不得息正邪以腹一脈伸一脈逆氣衝鍼

入三寸氣至湧之

灸臍中治胸中常鳴氣上衝心寒絀

陰支主腸鳴濯濯如有水聲

陰都主心滿氣逆嘔噦

治腸中雷鳴但逢咽下食承滿五十壯穴在候巨關

相去五寸巨關在心下一寸灸之者候巨關滿邊各

開一寸半

滿谷主腸鳴強大心悲氣逆腹脹滿急

陷谷溫留瀉谷復留瀉瀉主腸鳴而痛

廣意主腸鳴泄注

太白公孫主腸鳴

灸臍難法屈兩肘止灸兩頭發骨各百壯則下膿血

即瘥

李杲十書曰胃脘痛取期門治皮二寸支溝臍俞治

皮一十五分

胃脘暴痛腹中堅痛取石門商丘陰谷大腸俞陽俞

朱熹穿心法曰穿心痛不可忍以冷酸水及原融氣

少灸足大指大指內約文中各一壯如小麥大下火

立瘥

醫學綱目曰內痔灸刺骨痛有兩其一取心經云心

少陰太陽血者按刺法不分滿瀉但言取血玉註謂

先取血脈後調虛實也

其三取膽經云膽足少陽脈所生病者胃脅助脾瘵

外皆滿詳感虛寒陷下取之也

其四取經云手少陰之筋其病當所過者支轉筋

痛及胃滿息貫治在燔鍼劫刺以知為數以痛為驗

又足太陽之筋是少陽之筋痛皆引臂痛治在燔鍼

劫刺以知為數以痛為驗也

內經灸刺謂滿有三法其一取氣海經云腹中者氣

之海其輸上在手柱骨之上下前在於人逆氣浮有

餘者氣滿胃中悅息面赤審守其輸而調其虛實無

犯其害也

其二取肝經云肝足厥陰脈所生病者胃滿噦逆噎

滿狐疝滿閉囊詳盛虛寒陷下取之也

其三取胃經云陽虛腹滿面腫唇漂漉然暴言難甚

則不能言取足陽明是也

諸藥結胃先使人刺心蔽脊下止使名曰雙關大刺

左行間左一壁結胃立效右畔依上注刺之慢慢呼

吸氣鍼即時愈

心胃痞取涌泉太陰中衝大陵隱白太白少衝神門

結胃身黃取涌泉

胃脘痛不堪取期門四分章門六分灸七壯至七七

壯又取行間丘墟涌泉

中 醫 書 局 影 印

其一取足少陰刺節云取京雷屬雷不已取然谷者是其穴也又經云腎足少陰之脈所生病者煩心心痛視盛虛熱寒陷下取之也又經云心痛引腰脊欲嘔取足少陰者是也蓋手足少陰脈貫脊絡心故亦治心痛引背也

其二取足少陽經云心痛引背不得息則足少陰不已取少陽者是也蓋手足少陽之脈散於心脈又三焦下會日晏陽是足太陽絡足太陽循背當心入散絡故亦治心痛引背也

其三取督任脈經云升與心相控而痛所治天突與十椎及上紀上紀者胃脘也下紀者關元也又云心痛當九節刺之按已大按之立已不已下下之得立已者是也蓋十椎與九節者督脈也胃脘與天突者任脈也

其四取督任脈經云升與心相控而痛所治天突與十椎及上紀上紀者胃脘也下紀者關元也又云心痛當九節刺之按已大按之立已不已下下之得立已者是也蓋十椎與九節者督脈也胃脘與天突者任脈也

其五取足太陽經云取大翳大心者是其穴也又經云脾足太陽之脈是動則病胃脘痛腹脹所生病者煩心下急痛者視盛虛熱寒陷下取之又云心痛腹脹當熱大便不利取足太陽者是也蓋足太陽脈從胃上膈注心中故心痛腹脹者取之也

其六取足陽明經云胃病者腹脹胃脘當心而痛飲食不下取之三三里者是也蓋胃脘當心痛者似心痛實非心痛也

漢三里

胃脘痛取足三里
病在膈必灸到魂門
手心主之痛實則心痛取內關
心脾痛取巨門上皖中皖
心心痛灸上皖中皖陰都
心心痛取期門

內經謂發腹痛有四法其一取肥腎經曰邪在脾胃腸氣不足陰氣有餘則來中脘鳴腹脹當調於三里又云足太陽之別名曰巨脹去本節之後一寸實則腹中切痛取之所謂也又云瘦瘠刺膈左右動脈已刺按之立已不已刺臑衝已刺按之立已者是也

其二取太陽經云太陽者痛中切痛而鳴濯濯厥於臑即泄瀉而痛取巨廉上廉是也
其三取腎經云腎虛則胃中痛大腹小腹痛滿厥意不寒取其經少陰太陽血者是也
其四取任脈經云任脈之別名曰尾髀下端尾散於胞實則腹皮痛取之所別也

絞腸沙手足厥冷腹脹不可忍者以手蘸溫水外病者摩腹內拍打有紫黑點去鍼刺去瘀血即愈
腹瀉并氣塊取內關去瀉脈
氣痛并積痛食不化取氣海一寸半灸五十壯中皖二十半灸十壯臑一分瀉之灸七壯
又法取巨關足三關皆大
廣痛鳴取氣海八寸半灸五十壯
勝痛取除陰良大經三里支溝不已取中膈關元天施

博物彙編醫術典第一百五卷醫部 胃腹門

機痛公孫三陰交陰谷

內經鍼灸陽鳴有三法其一補脾經云脾虛則腹滿勝鳴食泄食不化取其經太陽陽明少陰血者是也其二補足太陽經云中氣不足腸鳴之苦鳴補足外踝下留之申脈穴也入五分
其三取太陽經云腸中雷鳴氣上衝胃邪在大腸刺胃之原巨虛上廉二里是也

導引

保生秘要曰心邪用一指認尻尾穴而行泄法後二指用實至骨分之
運功守氣處或歸元注念太乙救苦默咒以正其心邪自不見
心痛其機在目前脈看湧泉念或從痛處推下大勝九曲去
心頭冷積感兩手用力推開心頭至膈轉行周天法即愈

胃管疼痛於足三里稍之九九極之九九
運功行歸元逐痛處流行胃火自然得散
胃腹脹悶雙手叉依頭顱腦以兩手貼胃口將身往下不論數推搗能寬胸臆止腹疼兼後運功自效
運功先定歸元後行輪旋至膈前推散左右分開如未通暢以良背任之無不效矣
腹痛先念痛處想火燒之
腹熱或疼念膈自小而大又自大而小閉於膈上膈皮痛患處先推散兩旁然後水洗之復行周天

第四三九冊之〇八葉

法

中脘氣脹須臾頃省思去愁便不滯於胃腸而火自
然流行如不進飲食須臾降氣安心而食自進或病後
而發過熱渴飲之太多一者不能以前法瀉之可通
其一二便或開其腹理微瀉汗亦清水脹之乘通便之
法須臾摩輪并摩腎臟一處仍吹噓其氣十二編

醫案

瘡毒全書曰一人腹中如鐵石臍中出水旋變作蟲
行之狀養身固勝瘡毒雖忍扒搔不盡瀉煎者未湯
浴之以養木加壽香水調服之藥

僊門事類曰沈丘王宰妻胃腸不利口流白沫自言
咽下即中常雷聲心間作微痛又復發昏胃乳之間
象報如砂化雷利瀉等藥服之三載病亦依然其家
知載人吐葉無根來求之一酒而出蛋白蟲一條長
五六寸有口鼻牙齒走於涎中病者忿而斷之中有
白髮一草此正與徐文伯所吐官人髮殺一同藥出
立安

一將軍病心痛不可忍載人曰此非心痛也乃胃脘
當心痛也內經曰成木太過風氣流行民病胃脘當
心而痛乃與神丸一百餘粒藥不效或問曰此胃
脘有寒宜溫補將軍素知載人明了復求藥於載人
載人復與神丸二百餘粒作一服大下六七行立
愈

一人病心痛脘不飲食飲身腫壯熱口燥舌乾大

小便不利有一工治之兩下元感冷便後塊塊十數
服其病不愈又一醫所論與新亦同又投燒藥五七
日其症轉加困弱全無胃口數日食大小便何似小
便赤若七八便黑已此乃傷寒重之證宜用大黃芍
藥湯一劑次日用犀角地黃湯二劑後日用通草丸
一服投過大便黃白以為效驗此藥服十餘帖方可
獲愈可試用病初效

酒宿物伴仁病心氣痛此人常好飲酒初飲二三杯
必奔走三五十丈其治痛散不能復痛欲至前量醉
後至明日應清黃水數口或變魚腥臭六七日後始安
載人曰宜吐乃吐蟲一條青長六寸寸口鼻俱全
俱全一目黑如鼠如蛇形楊脫示人

李果十書曰一婦人重痰六個月困憊哭口吸風寒
愈病心痛不可忍瀉身冷氣欲絕曰此乃寒寒犯胃
故胃脘當心而痛急與益壽半夏乾生薑艾甘草
急習仁之類或曰半夏有小毒重服則可乎曰乃
有政而用也吸伯曰有故無病故也服之愈

朱震亨心法曰監製之關年五十餘香心脾疼腹
脹滿手足寒過肝脈絡腫大拱背體畏熱却喜飲
露得飲亦則快飲皆沉細而滑重則經脈取似弦
而短口渴乾而喜熱飲肉不食速以草豆蔻丸
三個加黃連清石砂神龍丸白木為君佐赤為佐
陳皮為使作湯送下二百丸服至一兩許盡皆愈
許文鑑公因飲食作酸成積腹痛後偏風寒腿骨痛
醫以黃芽散丹烏附治十餘年久食黃計又目寒而
痛加膠脂開合藥發時將指按痛則疼止此初
因中既有食積痰飲將指按痛則疼止此初

因中既有食積痰飲將指按痛則疼止此初

津液不通痰飲注入腎節往來如潮湧上則為肺液
降下則為膀胱濁滯之液以甘速米一錢入猪膽子
內煨食之連泄七行足能步履後復原水不足自煩
躁氣弱不語記金匱云無脈熱而煩氣不足以息者
實也其病多年難醫一旦診之產引動其猖獗之勢
無他少制便之藥故也仍以吐劑連其上下焦大藥及
其中下二焦連日服用附子六三枚和藥水以灌飲之方
大吐痰一人大補以外補清石黃冬石黃連等一
斤濃煎置井中極冷飲之四日服四斤後復效痛二
後脫脈歌至於卯酉時平謂卯酉為手足陽明之應
此乃胃與大腸有積滯水虛常瀉濁之積留成陰乃
作寒害一日服至兩服稍安後又小促閉痛飲以羅
蘆子汁得吐立通又小腹滿痛以大黃半等分水
丸服至三百丸下如瀉腸痛者一升許脈不歇又大
便逆痛小腹滿問又與前丸藥百粒腹大尺許腹脹
重眼火出不言瀉瀉下穢物如相油條一尺許腹門
如火以水沃之自病半月不食不語至此方吸稀粥
始有生意數日平安自嘔吐至安日服昔年常飲大
次半行則愈法全愈

一人以酒飲牛乳惡心痛年久無計得多以丁附藥
劑加麥連白木桃仁神牛仁等湯得而自之湯出散
藥食故每痛以物拄之脈逆逆而苦杏仁散以二
苦黑木汁如爛木耳者服至二百粒貼腹脹退至添
挽並而漸充滿時發暖其欲汗而血氣未充以參
木歸芍陳皮半夏甘草炮製與黃實木芍藥歸下
咽逆須臾而斃大疔痛止

咽逆須臾而斃大疔痛止

咽逆須臾而斃大疔痛止