

瘈瘲

醫藥綱目云瘈者筋脉急也瘲者筋脉緩也急則引而縮緩則縱而伸或縮或伸動而不止者名曰瘈瘲俗謂之發搐是也凡癩瘡風瘈破傷風三證皆能瘈瘲但癩瘡則什地不省風瘈瘈瘲則角弓反張破傷風瘈瘲則有瘡口竊謂瘈者屬肝經風熱血燥或肝火妄動血傷瘈者屬肝經血氣不足或肝火汗多亡血以致手足伸縮不已抽搐不利若因風熱血燥用麝羊角散妊娠加鈞藤山梔若肝火妄動用加味四物湯即四物加柴胡丹皮山梔加鈞藤鈎山梔若肝經血氣不

瘦形 女利二

足用八珍湯即雜病虛勞加釣藤鈎山梔若肝火亡

血用加味道遙散經調加釣藤鈎山梔如不應須用六

味丸雜病虛勞以補腎水生肝木為主佐以前劑治之若

其脉長弦者是肝之本脉則易治其脉短澁者是肺

金尅肝木也則難治其面色青中見黑者是水生木

也當自愈青中見白者是金尅木也必難愈 一婦

人素口苦月經不調或寒熱妊娠五月兩臂或拘急

或緩縱此肝火傷血所致也用四物加柴胡山梔丹

皮釣藤鈎而愈 一妊婦因怒寒熱頸項動掉四肢抽

搐此肝火血虛風熱用加味道遙加釣藤鈎效劑痊

顫振

黃帝曰人之顫者何氣使然岐伯曰胃氣不實則諸
脉虛諸脉虛則筋脉懈墮筋脉懈墮則行陰用力不
復故為顫因其所在補分肉間醫學綱目云顫振與
瘛瘲相類瘛瘲則手足牽引而或伸或屈顫振則但
顫動而不伸屈也胃虛有痰用參朮以補氣茯苓半
夏以行痰如實熱積滯用張子和三法 **薛**顫振者
掉眩也易曰鼓萬物者莫疾乎風鼓之為言動也大
抵掉眩乃風木之搖運也諸風掉眩皆屬于肝治法
若肝木實熱用瀉青丸 幼科 肝木虛熱用六味丸 雜

虛勞肺金尅肝木用瀉白散雜病發熱肝木虛弱用逍遙散

調經加參朮釣藤鈎脾血虛弱用六君子湯雜病虛勞加芎

歸鈎藤鈎胃氣虛弱用補中益氣湯雜病傷勞倦加鈎藤

鈎若產後顫振乃氣血虧損虛火益盛而生風也切

不可以風為論必當大補斯無誤矣 一婦人性善

怒發熱經水非過期則不及肢體倦怠飲食少思而

顫振余謂脾氣不足肝經血少而火盛也午前以調

中益氣湯加茯苓貝母送六味丸午後以逍遙散送

六味丸兩月餘而愈 一婦人身顫振口妄言諸藥

不効余以為鬱怒所致詢其故蓋為素嫌其夫而含

怒久矣投以小柴胡湯傷寒少陽稍可又用加味歸脾湯

歸脾湯加而愈
柴胡山梔

交加散 治痰癆或顫振或產後不省人事口吐痰涎

涎

當歸

荆芥穗 各等分

右為細末每服三錢水一盞酒少許煎至七分灌

下咽即有生理

增損柴胡湯 治產後或經適斷致手足牽搐咬牙

昏冒異證

柴胡八分

黃芪炒伍分

黃芩炒

石膏

各四斤

半夏

三斤

知母

甘草

炙各二斤

右為麤末每服半兩薑五片棗四枚水煎溫服

本事青鹽丸

治肝腎虛損腰膝無力顫振羸曳

懷香末

三兩

兔絲子

四兩

乾山藥

二兩

青鹽

一兩

又先將兔絲子洗淨無灰酒浸晒七日冬天近火

煨炙乾另為細末和勻酒糊丸梧子大每服五七

十丸溫酒或鹽湯下常服壯筋力進飲食一婦人

素患足羸曳服此藥屢效如故

本事星附散 治中風正言而手足彈曳脉虛浮

數

天南星

製同半夏

半夏

薄切片薑汁浸透

黑附子

炮

白附子

炮

川烏頭

炮

白僵蠶

炒

沒藥

人參

白茯苓

各等分

右為麤末每服二錢酒水各一盞同煎至八分去

滓熱進三三服汗出即瘥 在桐廬有患此證用

前藥三服得汗手足即能舉動

三因獨活散

治氣虛感風或驚恐相乘肝膽受邪

使土氣不守正位致頭招搖手足顛掉漸成目昏

獨活

地骨皮

細辛

芎藭

菊花甘味者

防風去叉

甘草炙等分

右為麤末每服三錢水盞半煎至一盞去滓煎取清汁六分入竹瀝少許再煎一二沸食後溫服日

二服

世傳茯苓丸 治手臂抽牽或戰掉不能舉物服此

藥立愈又治脾氣虛弱痰邪相搏停伏中皖以致

臂內筋脉攣急而痛

茯苓


半夏薑製各二兩

枳殼炒

風化朴硝 一兩

右為末薑汁糊丸桐子大每服二十九丸食後薑湯

下



下
自然未對其脈其脈之大如洲之平其脈之

風之部

驚悸 失血 心神不安

婦人血風驚悸者是風乘於心故也心藏神為諸臟之主若血氣調和則心神安定若虛損則心神虛弱致風邪乘虛襲之故驚而悸動不定也其驚悸不止則變惚恍而憂懼也非風湯亦可用

醒丹 溪先生云驚悸

者血虛用硃砂安神丸痰迷心竅用定志丸怔忡者屬火屬痰思慮便動者屬虛時作時止者火動也假如病因驚而致驚則神出其舍痰乘而入矣蓋人之所主者心心之所養者血心血一虛神氣不守此驚悸之所由生也治當調養心血和平心氣而已金氏

婦暑丹赴筵因坐次失序自愧成病言語失倫兩脉
弦數予曰當補脾導痰清熱不信以數巫者噴水咒
之而死或謂病既無邪以邪治之何至於死予曰暑
月赴筵外受蒸熱辛辣適口內傷鬱熱而况舊有積
痰加之愧悶其痰愈盛又驚以法尺益驚其神而氣
血不寧噴以法水閉其肌膚而汗不得泄內燔則陰
既銷而陽不能獨立不死何待故滑伯仁先生云若
膽氣虛寒用茯神湯膽氣實熱用酸棗仁丸心氣虛
熱用定志膏茯苓補心湯心氣實熱用硃砂安神丸
茯神散 又學歸雲橋內人月事不及期忽崩血昏

憤發熱不寐或謂血熱妄行投以寒劑益甚或謂胎
成受傷投以止血亦不效余曰此脾氣虛弱無以統
攝故耳法當補脾而血自止用補中益氣湯雜病傷
勞倦

加炮薑不數劑而驗惟終夜少寐驚悸別服八物湯

不效余曰雜矣乃與歸脾湯雜病
健忘加炮薑以補心脾

遂如初 一婦人勞則心跳怔忡寒熱往來用歸脾

湯為主佐以八珍湯諸證漸愈又用加味道遙散寧

志九而安後復作服歸脾定志二藥即愈 一婦人

患驚悸怔忡日晡發熱月經過期飲食少思用八珍

湯加遠志山藥酸棗仁三十餘劑漸愈佐以歸脾湯

全愈後因勞發熱食少體倦用補中益氣湯又因怒
 適月經去血不止前證復作先以加味逍遙散熱退
 經止又用養心湯治之而痊 一婦人驚悸怔忡無
 寐自汗盜汗飲食之甘怠惰嗜卧用歸脾湯而愈至
 年餘懷抱鬱結患前證兼衄血便血仍用前湯而愈
 茯神散 治婦人血風五臟大虛驚悸安神定志

茯神 去木

人參 去芦

龍齒 另研

獨活 去芦

酸棗仁 各壹兩 微炒

防風 去芦

遠志 去心

桂心

細辛 去苗

白朮 去芦各 柴錢半

甘草

乾薑 炮各 半兩

右咬咀每服五錢水一中盞半煎至一大盞去粗
溫服不拘時候

龍齒丸 治婦人血風上攻心神恍惚驚悸眠卧不

安

龍齒 另研

茯神 去木各壹兩

硃砂 研水飛

人參 去芦

當歸 去芦

天麻 各柒錢半

檳榔

防風 去芦

生乾地黄

犀角屑 各半兩

遠志 去心

赤箭 各貳錢半

麝香 壹錢 另研

右為細末煉蜜和搗三五百下丸如梧桐子大每

服三十丸薄荷湯送下不拘時

朱寶琥珀散

治婦人血風驚悸

琥珀研

沒藥研

木香

當歸

芍藥

白芷

羌活

乾地黃

延胡索

川芎各半兩

土瓜根

牡丹皮去心

白朮

桂心各壹兩

右為末每服壹錢水壹盞煎至七分加酒壹分再

煎少時熱服重者數服効

茯苓補心湯 治心氣不足善悲愁怒衄血面黃五