


136

中等卫生学校护士专业

外科学及护理多选题集

福建省外科学校际教研组编


长沙市卫生学校图书馆



CW0045358

014937

外科学及护理多选题集



福建省外科学校际教研组编

前 言

一、为了适应和推广多选题考试方法，我省对护士专业毕业生进行了模拟考试和全省统考，在这基础上又组织三个校际教研组的教师分别编写和汇集成多选题集。本书分内科、外科和基础护理三册印刷，内部发行。本册为“外科学及护理多选题分册”。

二、本书主要根据卫生部所颁布的中等卫生学校护士专业教学大纲和现行教材为基准，并较广泛的收集各兄弟院校所编写的试题汇集编写而成。（总题量1078题）。

三、本书供中专卫校护士专业学生复习、考试时使用，其他专业和初晋中考生也可作参考。

四、由于编写时间仓促和限于编者水平，书中难免有欠妥和错误之处，请读者批评指正。

编 者

1984年4日

答 题 说 明

A型题为最佳回答题，常以叙述形式提出问题，在每道试题下面列出A、B、C、D、E五个备选答案以供选择，五个备选答案中只有一个最佳最正确（亦可能是问题中要求指出错误的一个）的，称为正确答案或正确选择，其余四个为干扰答案，可以完全不正确，也可以是部分正确的。在答题时应从中选出一个最佳答案，并在答案上将相应题号相应字母涂黑，以示正确回答。选两个或两个以上答案者，视为无效。

B型题又称配伍题，五个备选答案在前试题在后，若干试题共用这五个备选答案，应试者应在这五个备选答案中给每道题选择一个与之配伍的正确答案。答题时如果认为这道题的正确答案是A，则在答卷上将相应题号的相应字母A除黑，如认为正确答案是B，则将答卷上相应题号相应字母B涂黑，以此类推。在备选答案中每一答案可被重复选用，也可一次也不被选用。

C型题，本型与B型题相似，但备选答案只有四个，后随几道试题，应试者对两种现象如症状、体征、化验结果加以比较，故存在四种可能性。答题时如果认为这道题的正确答案是A，则将答卷相应位置的A涂黑；如认为这道题的正确答案是B，则将答卷相应位置上的B涂黑；如果认为这道题的正确答案是C，（即与A、B两个备选答案均有关）则将答卷相应位置上的C涂黑；如果认为这道题的正确答案是D，（即与A、B两个备选答案均无关）则将答卷上相应位

置上的D涂黑。每道题只许选一个正确答案，若选择两个或两个以上，视为无效。

K型题又称复合是非题，由一个试题和四个备选答案组合而成，组合方式固定不变，其方式为：

- A: ① + ② + ③
 - B: ① + ③
 - C: ② + ④
 - D: ④
 - E: ① + ② + ③ + ④

应试者如认为正确答案应包括①②③，则将答卷相应位置上的A涂黑；如果认为正确答案应包括①③，则将答卷上的B涂黑；如果认为正确答案应包括②④，则将答卷相应位置上的C涂黑；如果认为正确答案只包括④，则将答卷相应位置上的D涂黑；如果认为正确答案应包括①②③④，则将答卷相应位置上的E涂黑。每道题只许在答卷相应位置上涂黑A、B、C、D、E答案中的一个，若涂两个或两个以上以视为无效。

外科学及护理多选题集目录

第一、二章 外科无菌方法和手术室工作

A型题	(1)
B型题	(8)
C型题	(9)
K型题	(11)
标准答案	(12)

第三章 体液平衡与体液疗法

A型题	(13)
B型题	(24)
C型题	(25)
K型题	(28)
标准答案	(30)

第四章 休克

A型题	(32)
B型题	(40)
C型题	(41)
K型题	(42)
标准答案	(44)

第五章 麻醉

A型题	(45)
B型题	(49)
C型题	(50)
K型题	(52)

标准答案 (53)

第六章 复苏术

A型题 (53)

B型题 (57)

C型题 (57)

K型题 (57)

标准答案 (58)

第七章 手术前后的护理

A型题 (59)

B型题 (61)

C型题 (63)

K型题 (64)

标准答案 (66)

第八、十章 外科感染、伤口处理及更换敷料

A型题 (66)

B型题 (78)

C型题 (82)

K型题 (84)

标准答案 (86)

第九章 损伤

A型题 (87)

B型题 (97)

C型题 (98)

K型题 (99)

标准答案 (100)

第十一章 肿瘤

A型题 (101)

B型题	(103)
C型题	(104)
K型题	(104)
标准答案	(106)

第十二章 先天性疾病

A型题	(106)
K型题	(108)
标准答案	(108)

第十三章 颅脑损伤

A型题	(109)
B型题	(114)
C型题	(116)
K型题	(116)
标准答案	(117)

第十四章 颈部疾病

A型题	(118)
B型题	(120)
C型题	(121)
K型题	(121)
标准答案	(123)

第十五章 胸部疾病

A型题	(124)
B型题	(129)
C型题	(130)
K型题	(130)
标准答案	(133)

第十六章 腹部疾病

A型题	(133)
B型题	(152)
C型题	(155)
K型题	(159)
标准答案	(172)

第十七章 直肠肛管疾病

A型题	(174)
B型题	(177)
C型题	(177)
K型题	(177)
标准答案	(180)

第十八章 周围血管疾病

A型题	(180)
K型题	(181)
标准答案	(181)

第十九章 泌尿系及男性生殖系疾病

A型题	(182)
B型题	(184)
C型题	(184)
K型题	(185)
标准答案	(188)

第二十章 骨与关节疾病

A型题	(189)
B型题	(193)
C型题	(194)
K型题	(196)
标准答案	(200)

第一、二章 外科无菌 方法和手术室工作

《A型题》(1—34题)

- 1、煮沸灭菌法时，为提高沸点缩短煮沸时，在水中加入 NaHCO_3 ，使溶液浓度成为
- A、0.5%
 - B、1%
 - C、3%
 - D、5%
 - E、6%
- 2、下列那种物品不宜高压蒸汽灭菌
- A、布类敷料
 - B、锋利器械
 - C、玻璃用品
 - D、橡胶制品
 - E、搪瓷制品
- 3、高压蒸汽灭菌后物品在干燥情况下，超过多少时间不能使用
- A、3—5天
 - B、1—2周
 - C、2周
 - D、3周
 - E、1个月
- 4、流动蒸汽灭菌法的蒸时为
- A、15分

B、30分

C、60分

D、3小时

E、10分

5、酒精浸泡金属器械时，为防锈可加入

A、氢氧化钠

B、氯化钠

C、亚硝酸钠

D、碳酸氢钠

E、石碳酸

6、新洁尔灭浸泡金属器械时，为防锈可加入

A、亚硝酸钠

B、碳酸氢钠

C、氢氧化钠

D、石碳酸

E、氯化钠

7、杀菌力最强的酒精浓度为

A、60%（重量比）

B、70%（容量比）

C、75%（重量比）

D、70%（重量比）

E、65%（容量比）

8、穿无菌手术衣及戴手套时，那项是错误的

A、先穿无菌手术衣，后戴湿手套。

B、先穿无菌手术衣，后戴干手套。

C、先戴湿手套，后穿无菌手术衣。

D、戴手套时勿使手套外面与皮肤接触。

E、穿戴完毕，其前胸、手臂、腰部以上为无菌区。

9、正规手术区皮肤消毒范围要包括切口周围区域

A、5cm

B、10cm

C、15cm

D、20cm

E、25cm

10、手术中如手套破损或接触有菌区时应

A、重新洗手

B、用碘酒、酒精消毒

C、另换无菌手套

D、再加戴一副手套

E、终止手术

11、会阴部手术采用的体位为

A、侧卧位

B、俯卧位

C、仰卧位

D、截石位

E、以上都不是

12、手术进行中，下列哪项是错误的

A、手术人员双手不可下垂超过腰以下

B、不可从手术者后递送器械

C、所铺无菌单要有2层

D、术中如手套接触到非无菌区或有穿破时，应立即更换。

E、无菌区的布单有沾湿时，应加铺盖上无菌巾。

13、用1—2%的碳酸氢钠溶液煮沸消毒灭菌，需煮沸时

间为

- A、5分
- B、10分
- C、15分
- D、20分
- E、30分

14、成人每日体内有食物氧化生水

- A、100毫升
- B、150毫升
- C、200毫升
- D、250毫升
- E、300毫升

15、为防止手术感染必须熟练掌握

- A、消毒法
- B、抗菌术
- C、灭菌法
- D、无菌术
- E、无菌技术

16、关于高温灭菌哪项是错误

- A、无芽胞比有芽胞细菌易杀死
- B、湿热比干热杀菌力强
- C、高温比低温杀菌力强
- D、蒸汽比沸水杀菌力强
- E、细菌与脓血混合不易被杀灭

17、不能达到灭菌的是

- A、高压蒸汽消毒敷料30分钟（15磅/时）
- B、2%碳酸氢钠溶液煮沸后20分钟

- C、防锈新洁尔灭溶液浸刀片10分钟
 - D、注射器用高压锅消毒20分钟
 - E、缝合线甲醛蒸汽法1小时
- 18、检查高压消毒是否达到灭菌，通常在手术包中放
- A、升华硫磺粉
 - B、明矾粉
 - C、碳酸氢钠
 - D、高锰酸钾
 - E、亚硝酸钠
- 19、消毒手术敷料最有效和常用的方法是
- A、流动蒸汽
 - B、高压蒸汽
 - C、干热法
 - D、煮沸
 - E、甲醛熏蒸
- 20、用流动蒸汽消灭芽胞需
- A、半小时
 - B、2小时
 - C、1—2小时
 - D、15—30分钟
 - E、以上都不能
- 21、无菌术后接台手术时手套未破可以
- A、重新洗手后，酒精浸泡5分钟
 - B、酒精泡手5分钟，再重新穿手术衣戴手套
 - C、直接更换手套、手术衣
 - D、用无菌N·S洗手套后连台手术
 - E、用酒精擦手套后接连台手术

22、面部疖肿需手术哪种消毒法较好

- A、用3%碘酊及70%酒精由外向内涂擦
- B、用3%碘酊及70%酒精由内向外涂擦
- C、0.1%新洁尔灭由外向内涂擦
- D、0.1%新洁尔灭由内向外涂擦
- E、70%酒精由内向外涂擦

23、0.1%新洁尔灭泡手一般可用

- A、10次
- B、20次
- C、30次
- D、40次
- E、50次

24、手术者身上无菌区除双上肢外包括

- A、整个躯干
- B、颈及整个躯干
- C、腰部以上前胸后背
- D、整个躯干除背部
- E、腰部以上的前胸

25、煮沸灭菌哪项错误

- A、器械用纱布包好浸入水中
- B、消毒锅需盖紧
- C、水沸后煮30分钟
- D、可加入苏打成1—2%溶液
- E、夹紧血管钳、剪刀后没入水中（玻璃类物品应在煮沸后放入）

26、刀、剪、针最好的消毒法是

- A、高压蒸汽

- B、煮沸
- C、干热
- D、化学药液浸泡
- E、流动蒸汽

27、粘膜及特殊部位的皮肤（如面部、会阴部）消毒，下列哪项消毒液是错误的

- A、2%红汞
- B、0.1%硫柳汞酊
- C、0.1%新洁尔灭溶液
- D、0.2%洗必太溶液
- E、2.5%碘酊

28、用10%甲醛溶液浸泡物品需

- A、30分
- B、40分
- C、60分
- D、90分
- E、120分

29、外科洗手用氨水浓度为

- A、0.05%
- B、0.01%
- C、0.10%
- D、0.15%
- E、0.20%

30、酒精、新洁尔灭泡手时间不少于

- A、3分
- 、4分
- C、5分

分 D、

E、15分

31、手术室的温湿度应维持在

- A、15—20°C, 30—40%
- B、20—22°C, 40—45%
- C、22—25°C, 45—50%
- D、25—28°C, 50—55%
- E、28—30°C, 55—60%

32、下列哪项不是手术护士的职责

- A、提前15分洗手，做好手术器械及用品的准备
- B、手术前后与巡回护士共同清点器械，敷料及针线
- C、配合术者传递器械、物品
- D、术毕清洗器械用品，固定手术标本
- E、术毕送病人回病室并进行病情交班

33、四肢手术消毒范围为

- A、以切口为中心上下20cm↑，消毒成套状
- B、以切口为中心上下20cm↑
- C、以切口为中心上下30cm↑，消毒成套状
- D、以切口为中心上下30cm↑
- E、整个肢体都消毒

34、手术护士的职责

- A、负责检查手术室内各种设备是否完善
- B、根据手术需要安排病人体位
- C、手术中及时主动传递器械
- D、术中密切观察病情变化
- E、监督无菌技术的正确执行

《B型题》（35—41题）