

欽定古今圖書集成博物彙編醫術典

第四百三十九卷目錄

醫部彙考四百十九

小兒諸熱門一

黃帝素問

錢乙小兒直訣

羅天益衛生寶鑑

朱震亨幼科全書

方賢奇效良方

萬氏幼科發揮

醫伯嗣學要旨

王倫明醫雜著

樓英醫學綱目

陶華六書

王肯堂證治準繩

黃元御

陳治幼幼近編

小兒衛生總微論方

醫術典第四百三十九卷

醫部彙考四百十九

小兒諸熱門一

黃帝素問

通評虛實論篇

帝曰孔子而病熱脈小者何如

化熱雖盛不耗於陽氣生於精水之中男子八

歲女子七歲腎氣始實孔子天癸未至腎氣未盛

故帝有此問焉夫心主脈而資生於腎心腎水火

之氣上下時交腎氣不能上資於心則心熱如病

微而寸口之脈微絕小者腎氣未盛也

岐伯曰手足溫則生寒則死

伯答孔子之生陽後天之氣也四支皆秉氣

於胃故陽受氣於四末是以手足溫者胃氣尚盛

故生寒則胃氣已絕故死夫木穀入於胃津液各

走其道腎為水臟受五臟之精而藏之是先天之

精養神後天之所資養者也又則出兩行營衛之

道其大氣之推而不行者名曰宗氣積於胸中上

出於肺以司呼吸是四支之原命又受資於胃府

所生之營衛宗氣是以手足溫者生寒者死

帝曰孔子中風熱喘喘者何如岐伯曰喘鳴

則息者脈實大也微則生寒則死

此復論後天所生之宗氣而亦不可傷也宗氣

者五臟六腑十一經脈之宗故曰宗氣凡息者

呼吸搖動也風熱之邪始傷皮毛喘鳴則息是風

熱盛而內子肺氣宗氣散實大也夫脈之所以

和緩者胃陽明之胃氣也急則胃氣已絕故死

宋錢乙小兒直訣

諸經發熱證治

潮熱者時聞發熱過時即退來日依時而發此欲發

熱也

計熱者常熱不已其則發熱驚也

風熱者身熱而口中氣熱乃風邪外感也

溫壯者肢體微熱也

發熱而不欲飲水者胃氣虛熱也用白朮散

發熱而飲水者渴喜冷飲食胃氣實熱也用黃芩

散

按說就保嬰集云小兒潮熱或壯熱不退多是

變蒸及五臟相勝不必用藥又多食積鬱熱由中

於外見於肌未理其中清陽明之熱而表熱自

除不可認作外感用小柴胡輕利等藥重傷其內

又潮熱不退是出痘亦當審察勿便用藥驚謂

發熱飲水者熱在內不飲水者熱在外也又當以

此辨之其諸熱證見名類

黃疸

若大病後身目皆黃者黃疸也

身痛背強大小便澀一身盡黃小便黃赤此黃疸也

瀉者難治

若百日或半年不因病而身黃者胃熱胎疸也若淡

黃兼白者胃怯也

按大病後身目皆黃或肢體黃者皆脾氣虧損

而真臟為邪宜用白君子湯參苓白朮散調補元

氣病後發黃者脾氣虛而津液少也用七味白朮

欽定古今圖書集成博物彙編醫部典

第四百三十九卷目錄

醫部彙考四百十九

小兒諸熱門一

黃帝素問

錢乙小兒直訣

羅天益衛生寶鑑

朱震亨幼科全書

方賢奇效良方

萬氏幼科發揮

醫伯嗣學要旨

王倫明醫雜著

樓英醫學綱目

陶華六書

王肯堂證治準繩

黃元御

陳治幼幼近編

小兒衛生總微論方

醫部彙考第四百三十九卷

醫部彙考四百十九

小兒諸熱門一

黃帝素問

通評虛實論篇

帝曰孔子而病熱脈小者何如

化熱雖盛不耗於陽氣生於陰水之中男子八

歲女子七歲腎氣始實孔子天癸未至腎氣未盛

故帝有此問焉夫心主脈而資生於腎心腎水火

之氣上下時交腎氣不能上資於心則心熱如病

微而寸口之脈微絕小者腎氣未盛也

岐伯曰手足溫則生寒則死

伯答孔子之生陽後天之氣也四支皆受氣

於胃故陽受氣於四末是以手足溫者胃氣尚盛

故生寒則胃氣已絕故死夫木穀入於胃津液各

走其道腎為水臟受五臟之精而藏之是先天之

精養神後天之所資養者也又則出兩行營衛之

道其大氣之運而不行者名曰宗氣積於胸中上

出於肺以司呼吸是四支之原命又受資於胃府

所生之營衛宗氣是以手足溫者生寒者死

帝曰孔子中風熱喘喘者何如岐伯曰喘鳴

則息者脈實大也微則生寒則死

此復論後天所生之宗氣而亦不可傷也宗氣

者五臟六腑十一經脈之宗故曰宗氣肩息者

呼吸搖肩也風熱之邪始傷皮毛喘鳴則息是風

熱盛而內于肺氣宗氣散實大也夫脈之所以

和緩者胃陽明之胃氣也急則胃氣已絕故死

宋錢乙小兒直訣

諸經發熱證治

潮熱者時聞發熱過期即退來日依時而發此欲發

熱也

計熱者常熱不已其則發熱驚也

風熱者身熱而口中氣熱乃風邪外感也

溫壯者肢體微熱也

發熱而不欲飲水者胃氣虛熱也用白朮散

發熱而飲水者渴喜冷飲食胃氣實熱也用黃芩

散

按說就保嬰集云小兒潮熱或壯熱不退多是

變蒸及五臟相勝不必用藥又多食積鬱熱由中

發外見於肌末只理其中清陽明之熱而表熱自

除不可認作外感用小柴胡輕利等藥重傷其內

又潮熱不退是出痘亦當審察勿便用藥驚謂

發熱飲水者熱在內不飲水者熱在外也又當以

此辨之其諸熱證見名類

黃疸

若大病後身目皆黃者黃疸也

身痛背強大小便澀一身盡黃小便黃赤此黃疸也

瀉者難治

若百日或半年不因病而身黃者胃熱胎疸也若淡

黃兼白者胃怯也

按大病後身目皆黃或肢體黃胖者脾氣虧損

而真臟為邪宜用白君子湯參苓白朮散調補元

氣病後發黃者脾氣虛而津液少也用七味白朮

散若輕熱濕熱滯滯一便祿熱理不得流泄而為
患者名為黃疸用茵陳湯初生身黃壯熱不孔便
膠此為胎熱用地黃湯若一便赤黃腹脹而赤飲
水用茵陳湯調五苓散若清便自調四腹脹並用
金黃散黃白用調中丸

元羅天金衛生寶鑑

小兒身熱黃熱

小兒身熱黃熱黃熱煩滿皮膚如黃橘之黃眼中白
睛亦黃筋骨痿弱不能行立此由季夏之熱加以濕
熱而蒸熱薄於經絡入於骨髓使氣不平故脾逆
乘心濕熱相合而成此疾也蓋心火實則身熱蒸熱
胃煩煩滿脾濕則皮膚如黃橘之黃有餘之氣必
乘己所勝而侮不勝是腎肝受邪而筋痿弱不能
行立內經言脾熱者色黃而肉蠕動又言濕熱成瘕
信哉斯言也此所謂子能令母實實則滋其子也若
脾土過其本位腎水得復心火自平矣又內經曰治
瘕瘕取於陽明正謂此也予用加減黃散主之

發熱

凡小兒有病皆熱證既不同治亦當異須明虛實不
可妄自汗下

凡傷風發熱其汗出身熱阿欠面赤目痛多睡惡
風喘氣此因解脫受風所致宜疏風解肌退熱先服
柴葛解肌湯發去風邪俟熱之時再服麻黃九以防
凡傷寒發熱其汗無汗身熱阿欠煩悶項急面赤喘
急發口中心熱氣此因解脫受寒所致宜發散寒邪

退熱藥先服健胃散去寒邪後服涼驚九以防
內熱

二證如小兒發熱厚者可用密膏九虛怯者用胃
九其效

如傷風發熱又吐瀉者不可發散此脾家虛怯也
以五苓散各理中湯最效

凡傷風發熱多待於夏其汗身熱自汗作渴昏睡手
足俱熱此因天氣已熱而太厚受其熱也先用
白虎湯調金元散以解其熱服調元生散散以補
元氣

傷暑發熱多待於夏其汗身熱自汗作渴昏睡手足
微冷此因陰寒之中取涼太過所致先服調元生散
散補其正氣大服四君子湯以防吐瀉之患

如夏月汗出當風以致身熱自汗不止者此名暑風
先用四君子湯加麻黃根黃芪以去其風大用益元
散以清其熱

傷食發熱其證手心熱肚有尤熱一暖氣便吐乳大
便酸臭或腹脹或嘔或腹脹或嘔不思乳食此得
之飲食過度所傷宜先利去其積用丁香餅九後
以集聖丸調之如傷食已久日漸新瘦作熱無時者
不可下輕者保和重者集聖丸百無一失

痘疹發熱其證面紅唇赤目赤亦阿欠煩悶年熱
乍寒咳嗽喘嗽手足指冷驚悸多睡此因時行痘疹
各相傳染宜清涼解毒每痘起宜用參蘇飲如未看
麻疹宜利防散散散不可妄用自發汗急生要證
變熱發熱此小兒正病不須服藥當於熱下求之不可
錯誤

潮熱者當分二證有時間發熱過時即退來日依時
復發其狀如蠶此肺熱也有時發熱每兩日兩度如
潮水應期此胃熱也蓋因感熱邪氣以致血脈凝滯
不即流通若不治之變驚者多矣肺熱者地骨皮
散主之胃熱者三黃九下之虛弱者集聖丸調之

驚熱者遍身發熱面赤目汗心悸不眠腹脹煩躁
叫性慄此心熱也以涼驚九退熱以安神九定心
夜熱者但夜間發熱晝作便住此血虛證也以人參
當歸散散之兼服抱龍丸以防作搐

餘熱者傷寒汗下後而熱又來乃表裏俱虛氣不歸
元陽浮於外不可再用寒藥蓋熱去則寒起古人戒
之甚者四君子湯加乾薑其效

前熱者形體羸瘦食不長肉胃弱盜汗泄瀉無常壯
大節弱此多傳於大經之後失於將息又或傷飢失
飽而致集聖丸大有奇功

壯熱者一向熱而不已由血氣壅滯五臟生熱發蒸
於內則脈數不寧身熱燥熱發於外則表裏俱熱
脈急喘粗其則驚驚驚也治法先以導赤散吞瀉青
九以治其熱後以抱龍丸鎮其驚如實熱大小便閉
者三黃九下之

煩熱者心火不安五臟煩熱四肢壯壯小便赤澀宜
用導赤散散門冬山梔仁治之再以涼驚九鎮其餘
邪

積熱者煩赤口痛大小便澀表裏俱實或因內酒
前傳熱藥發後外用重厚棉襪火烘迫皆能生熱
此內外壅滯之熱非食積之熱也先以三黃九下之

潮熱者當分二證有時間發熱過時即退來日依時
復發其狀如蠶此肺熱也有時發熱每兩日兩度如
潮水應期此胃熱也蓋因感熱邪氣以致血脈凝滯
不即流通若不治之變驚者多矣肺熱者地骨皮
散主之胃熱者三黃九下之虛弱者集聖丸調之

驚熱者遍身發熱面赤目汗心悸不眠腹脹煩躁
叫性慄此心熱也以涼驚九退熱以安神九定心
夜熱者但夜間發熱晝作便住此血虛證也以人參
當歸散散之兼服抱龍丸以防作搐

後以涼藥九調之

虛熱者或因汗下太過津液虛耗或因大瀉之後元氣受傷有能發熱其證固係少力面色青白虛汗自出神疲體軟手足厥冷此血氣俱虛虛處則發厥血虛則發熱也四君子湯加炒乾薑甚者加熟附子一片得熱少退以集聖丸調之

客熱者邪於心也心若受邪則熱形於頭故先起頭面而身熱次及四肢則惡寒則惡寒與真氣虛而邪氣勝也邪氣勝則真氣與之交爭發熱無時還退不定如夢之往來也宜以導赤散去其邪夜以導驚丸調之

癰熱者由乳食不消伏結於內致成癰塊以生熱於外也治法以集聖丸主之

發熱者寒熱往來有頭痛汗出者有嘔吐不食者有憎寒壯熱而作渴者有遍身疼痛者有腹痛者有吐瀉者證皆百出治非一端頭痛汗出遍身疼痛者小柴胡湯加羌活蒼朮治之腹痛者辨機丸治之作渴者白朮散治之吐瀉者理中湯治之俱用平穩藥脾丸調之

血熱者每日午間發熱過夜則涼此心熱也輕者導赤散重者四順飲治之

煩渴治熱不問其證所發虛者以胃苓丸竹葉妙米湯治之元氣虛者以涼膈丸竹葉燈心薄荷湯治之

小兒病則生熱須知得病根因風寒外感熱來潮飲食內傷煩燥吐瀉燥刺涕淚赤紫斑疹如癰骨蒸諸

弱熱成勞調治較般分統

若是風寒外感面紅又惡風寒極微散子妙難言有咳嗽蘇麻散飲食內傷可下二黃脾積散再添藥吐瀉胃者最好痢如赤白香連散手足麻痺邪子瘡疥癩癰丸散藥茶小兒常病不宜妄用丸湯如逢痘疹別科傳集聖散調治狀

治熱汗下休錯誤汗誤下傷人應汗而下病滿便惡下面汗瀉定只為不問未裏致令大命將傾果難捉摸且因循用藥苦茶聖明方黃資效良方

小兒諸熱須分主治

夫小兒驚熱者誤因驚者執以為常致令心氣不和身體微熱睡夢驚驚遍身有汗甚者手足掣縮癰成癰矣此由氣血不和實熱在內心神不定所以發搐又小兒痘藥亦微驚所以熱者亦熱盛故也治之以七寶散天竺黃散甘露散辰砂金箔散皆可治之小兒因驚則生熱熱則心不寧故睡臥不安身體微動心主驚實則發熱飲水虛則臥而悸動不安此其候也

小兒瀉壯者由胃氣不和氣行壅塞故積積體熱名曰瀉壯若大便黃臭而黃者此腹內有伏熱以四順飲子治之若黃白而酸臭則積宿食不當當服紫霜丸輕者小服重者酌量增九葉當取微利可也

小兒壯熱者因五臟生熱動於外故身體壯熱大抵與溫壯相類而有小異但溫溫然不甚盛是溫壯也其壯熱者一向熱而不止甚則發驚也以七寶散

大黃甘利湯皆能治之

小兒虛熱者身熱面黃口中亦熱煩叫不啼有微瀉者宜虎睛丸天竺黃散治之若熱甚人便微瀉者四順飲子亦可服之

小兒煩熱者由臟腑實熱血氣盛而兼熱則苦煩躁不安及清壯熱也以八珍散七寶散皆可服之小兒手足多熱心煩躁者深紅飲水不止只竹葉石膏湯即味甘露散治之

小兒清熱者由閉熱熱過時即退來日依時而發此欲發驚也夫大抵血氣盛五臟實熱熱於外故溫壯相類或來伏熱或帶宿寒來伏熱者人便黃而臭帶宿寒者大便白而帶酸臭皆脾臟所冷熱之氣供盛腸胃積滯故也治之以金匱石菴湯加味甘露散通利不解小柴胡湯或竹葉石膏湯錢氏云假如潮熱是一陽實一陰虛而內發熱也法當補導而瀉不瀉則愈且如日中發熱熱者是心虛也肝為心之母則宜先補肝實而後瀉心心得母氣則內平以瀉熱也醫兒潮熱者謂其實力以大黃甘利湯諸令藥利之利既多矣不能崇約而津液內竭縱取一時之涼鮮有不戒殆病而身死也

小兒瀉熱者由表裏俱熱則遍身皆熱燭赤口乾小便赤大便焦黃先以四順飲子三鮮竹黃散利動微瀉熱即去既去復熱者裏熱已解而表熱未解也當用竹葉散或紅梅散加麻黃微散治表熱乃去表熱既去又發熱者何也也醫到此蓋不能脫或再用涼藥或再解表或以為不可醫誤致天傷者甚多此表裏俱虛氣不歸原而陽浮於外所以再發熱非熱也

也只用其功收入稷米煎和其胃氣則收陽氣歸內
身便便涼熱重者辰砂金箔散治之錢氏白朮散亦
可

小兒虛熱者因晝夜不復血氣未勻四體虛弱時多
發熱治宜調氣補虛其熱自退如錢氏白朮散異功
散四君子湯之類或米退人參生厚片之為良
小兒實熱者頭骨煩赤口內熱小便赤澀狀如豆汁
大便堅硬或腹瀉不遇腹急此熱證也宜四順散子
大黃朴硝湯八珍散略按動脈脈即安

小兒疳熱者發熱形瘦多渴飲食不長肌膚者為之
疳熱三四歲後有此疾蓋嬰兒則有用金瓜丸玉
體丸肥兒丸之類治之最為穩當

小兒純陽未虛虛形瘠之證通補之聖藥矣且如
前人論小兒發熱有十四證見證立方多獲功效
今人常效前人之心觀形察色切脈論證以分表裏
虛實設有所誤非惟大闢人命抑且欺於心哉
萬氏幼科發揮

諸熱

肝熱者目中青手舉衣領及亂捻物為青丸當歸龍
膏丸主之

心熱者口中赤視其睡口中氣溫喜合面睡或仰睡
上風咬牙直目赤視其睡口中氣溫喜合面睡或仰睡
如口中熱心虛也宜錢氏安神丸主之

脾熱者口中黃滿黃散散四五分散主之

腎熱者目中混目甘精湯水過散主之
腎熱者目無精光長明骨脊重目白翳多其類即
解地黃丸主之

虛熱者多在大病後或溫熱或潮熱或渴或不渴大
小便如常安瀾之竹葉湯調元湯地骨皮散主之

實熱者面赤體燥喜乾焦喜就冷或合面臥或仰臥
露出手足掀去衣被大渴飲水大小便澀宜瀉之神
芩丸大金花丸大便不通者用順導法
或開治熱以寒治寒以熱良工不能發其蘊也今
治虛熱乃用溫藥亦有誤乎予曰說其內經實熱
邪火也可用大制可以實折故以寒治熱者逆治法
也虛熱者真火也水不能制寒不能折唯甘溫之劑
可以勝之故以溫治虛熱者從治法也逆之從之不
離乎正

發自陽舉重百問
諸熱證
小兒之病其熱證多夫熱有虛有實實則面赤澀黃
氣粗口乾鼻燥渴甚大小便難按腹裏不煩啼暴叫
虛則面色青白恍惚神疲口中清冷氣喘弱涕涕
多尿夜出虛汗其成作涼作溫病傷風上盛下虛
泄水數不分此則冷熱不調之證虛則敗毒散加木
香當歸散小兒表虛但熱而面赤黃赤黃口乾小便
赤澀大便焦黃先以四順清涼散為之疏利其熱即
去或表未解也當先用理理散少加麻黃去節以取
發其汗或用柴胡散則表熱已除又當和解其熱
自平若驚風風熱熱可服驚風散下之保赤散金
粉散以退熱熱可也

潮熱

仲陽云潮熱者時發熱過時即退來日伏時發熱
此欲發熱也發來潮熱又似瘧熱總曰潮熱蓋發作

有別其熱有三葉熱漸熱熱熱兩日一發或三日
一發並用柴胡散治之王氏云潮熱乃足血氣虛實
五臟生熱者發於外故今發熱發熱云潮熱者實
熱也當利大便大柴胡湯承氣湯等劑治之虛熱者
地骨皮散上之犀角散散甲散犀角散秦艽伏牛車
散聖濟經用地骨皮散充活解等劑

壯熱溫壯
仲陽云壯熱者一向熱而不已甚則發驚癇也溫壯
者但溫而不熱也葉氏云小兒壯熱者是熱氣盛蒸
發於外故今身體壯熱其發無漸大體與溫熱相似
少有異者熱加甚也此候宜服解熱散散光活散
皆可其則實不寒胡驚葛之劑散之溫壯者由小
兒臟腑不調內有伏熱或挾積寒皆得於胃氣故令
不和氣行逆滯故積熱名曰溫壯大便黃而臭者
內有伏熱其人便白而臭者則則挾積寒故也宜溫
之服理中四君子輩加桂治之伏熱宜五苓散升白
虎湯一藥俱效其腹中有伏熱溫壯藥散散之其
心神不安大膽散二黃犀角散王之溫壯常熱不
止牛黃散主之凡解後餘熱不退可服地骨皮散
龍湯牛黃膏亦治壯熱溫壯散手角湯治諸熱壯熱
治下後熱不退身壯熱百骨節痠疼子不湯大連
飲六物黃連湯五物人參飲對證選用之古法去伏
熱則用龍膽湯去伯湯則用紫菀丸甚效聖濟經用升
麻芍藥等劑治之

煩躁
論云煩躁不安足煩躁不安足躁躁者心經有
熱煩躁恍惚內煩不安心煩則謂白然生驚也唯者

也其潮熱發歇有時驚顛顛則恍惚夜熱夕發且止
餘熱寒邪未盡食熱壯腹先發痼熱胃氣發汗壯熱
一向不止煩熱心躁不安續熱煩赤口瘡風熱汗出
身熱盛則熱力力者熱來去不發熱寒濕飲水
寒熱發時如瘧狀血熱脈已發熱瘧熱耳鼻夫冷
脈得之各有神斷其間或有三兩證交互者宜隨其
輕重而處治之

小兒之熱有肝心脾肺腎五臟之不同虛實溫壯四
者之不一及表裏血氣陰陽浮陷與夫風濕痰食各
當詳之其熱者額上先赤心煩心痛掌中熱而喉或
壯熱飲水已午時益甚其熱者左頰先赤便難轉筋
尋衣搶物多怒多驚四肢困倦則時益甚其熱者
鼻上先赤惡寒嗜臥身熱飲水過夜益甚其熱者右
頰先赤手抬眉目嗜睡寒熱飲水日西熱甚其熱者
額下先赤兩足熱其背脊麻如蟲行熱者不能眠
夜間益甚仍當辨其虛實實則面赤氣粗口燥唇燥
作渴飲冷大小便秘或飲衣露睡煩躁叫伸體而
臥睡不露手足指熱宜用表下虛則面色青白枕
體神疲口中虛冷噫氣噯弱喜熱惡寒甚多尿尿或
生尿生溫佛驚驚惕上盛下泄夜則壯汗煩躁而臥
腫而露筋手足指冷宜用調補壯熱者肢體人熱熱
不已則發驚癇溫熱者肢體微熱不已則發驚癇
陰虛則內熱陽盛則外熱以手輕觸之則熱重按之
不熱此皮毛血脈之熱熱在表也重按之筋骨之分
則熱輕手則不熱此筋骨之熱熱在裏也不輕不重
按之而熱此肌肉之熱熱在表裏之間也以虛實分
屬表裏而論之壯熱惡風寒為元氣不充表之虛熱

也壯熱不惡風寒為外邪所客表之實熱也壯熱飲
湯為津液短少裏之虛熱也壯熱飲水為內火銷燬
裏之實熱也若夫內外皆熱則喘而渴渴而煩煩而
渴四肢熱熱風寒如氣於火能冬不能夏是皆陽盛
陰虛也脈尺寸俱遲為重實尺寸俱弱為重虛脈洪
大或熱而清或數而沉此熱盛拒陰陽形證似實
非寒也然而脈數按之不鼓此寒盛格陽形證似
熱實非熱也皆發熱惡寒大渴不止煩躁肌熱不欲
近衣其脈洪大按之無力或兼日痛鼻乾者此血虛發
熱也當補其血而不可發熱自汗者氣虛也當補
其氣仲景論內外不足發熱自汗之證藥不可發汗
如飲食勞傷發熱發熱發熱其汗則表必虛也身熱
而汗出者風也發熱身疼而身重黃者濕也增寒發
熱惡風白汗脈浮滑者聚也身熱頭痛脈數者食
也寸口脈微為陽不足陰氣上入陽中則惡寒尺脈
弱為陰不足陽氣入陰中則發熱陰陽不調其分
別寒熱也也查則名寒夜則發熱煩躁是陽氣下
陷入陰中也畫則發熱煩躁夜則安靜是重陽無陰
也當急治其陽陽微則其陰若身熱惡寒發熱而
不惡寒者難矣也發熱惡寒脈浮數者溫病也若四
肢發熱口舌咽乾是火熱上炎甚熱相合故發熱
而亂也若身熱沉重走注疼痛乃濕熱相搏風濕鬱
而不伸也

五臟熱

肝熱手尋太陽及風物渴而九主之
壯熱飲水喘渴而白散主之
肝熱者左項先赤便難轉筋多怒多驚四肢困倦黃

即時甚甚宜瀉青丸柴胡飲子
心熱觀其口舌中氣溫或面腫及上唇咬牙皆心
熱也專赤散主之
心氣熱則心胃亦熱欲言不能而有就冷之意故
合面臥也
心熱者額上先赤心煩心痛掌中熱而或壯熱飲
水已午時益甚宜瀉心湯導赤散安神丸
脾熱則目黃壯大怠惰嗜臥身熱飲水四肢不收瀉
黃散主之
脾熱者鼻上先赤其熱在肌肉過夜益甚
肺熱手抬眉目鼻面甘枯海主之咳嗽寒熱壯熱飲
水涼膈散主之若腎虛熱腎深紅舌少服白散
肺熱者右頰先赤日西熱其輕則用白散重則用
涼膈散及地骨皮散
腎熱兩足不喜衣覆地黃丸主之
腎熱者額下先赤兩足熱其背脊麻如蟲行熱者不
能起於牀夜間益甚宜用滋腎丸

實熱

實則伸體而臥腰不喜轉手足指熱等證
按實中宜分表裏表實宜汗表實宜下半表半裏宜
和解今一以利下為上非通論也治法方更於後
表裏俱內求之
小兒實熱在內者四顧欲飲之類在上者吐之
小兒熱病六一散妙藥也
實熱宜四順清涼散如柴胡
虛則喜熱惡寒生尿生溫佛驚驚惕上盛下泄風濕

醫者心則來去不定陰陽相勝則寒熱如癘前證在小兒有因乳母或妊娠七種厚味遺熱或飲食停積小兒過暖及類治熱而為患若黃印反時熱者力盛飲水者肝經實熱也則藥酌清肝散然而力怯飲湯者肝經虛熱也用六味地黃丸已午時熱心虛也實用導赤散或用犀角安神丸中西反時熱經也實用白散虛用秘傳保嬰湯多子壯時熱腎經也用地黃丸大凡壯熱飲不大便秘結實熱用二黃犀角散下之熱渴飲湯大便如常備血虛用四物湯補之若下後陰虛陽無所附而仍熱用四物參芪汗後陽虛陰無所生而仍熱用四君若歸若汗下後煩渴而赤虛發熱也當補血湯若見驚指等症肝血虛而內生風也用四物大蘇鈔藥餌極赤口乾小便赤澀大便熱黃表裏俱實熱也用清涼散子如大便已利成熱未止表邪未解也慢慢散木應加蘇黃散汗之既汗而仍熱此表裏俱虛氣不歸源歸汗於外而虛熱也六神散加搜太陽氣下陷於陰中而發熱者用補中益氣湯若乳下嬰兒當兼治其母會氏先用自解散發表大以當歸散及三解散治之

小兒潮熱盜汗胡黃連柴胡等為細末煉蜜丸次黃大每二九酒化開入少水煎小湯服
潮熱有時潮氣短者棧丸
實熱
全要方小兒每早食後發熱及則原世醫多謂虛勞或為疳熱不知此血熱證也互龍膽丸地黃膏之類

時時與服即藥
按全要方所云血熱者已午發熱遇夜則涼原東垣所經夜則發熱晝則明了不同然東垣所云血熱者指陰虛而生內熱也夜則發熱晝則明了取其晝陽夜陰也歸氏所云血熱者指小兒血盛實而言也蓋謂已午者心火用事之時也心主血血氣行至已午則陽氣益盛陽氣與正氣相搏故至期而發熱非其時者非血熱也
夜熱
毒蘊云夜熱屬陰四顧飲之類此血熱在夜也脈經云小腸有宿食當暮發熱晝日復止此宿食夜熱也
風寒發熱晝時早吃水無時此候乃寒作潮而生風熱即胃氣是火下之或氣弱者不可下宜奪命散以控下逐大風狂發散加南星白附子
積熱
積熱者久熱也指熱亦久但寒而黃吃長土鼻下爛也
小兒表裏熱後又發熱者非熱證也只用六神散入梗米煎和其胃氣則收陽歸內身體便涼熱重者用銀口散
積熱腹泄浮腫面黃足冷發熱從頭至肚食甚或間飲食之氣鬱心及腹疼嘔吐治法詳載傷寒論中按會氏所言積熱乃指腹中右積而熱久入積之積不同不妨豈存之
寒熱
寒熱者溫邪蟄狀陰陽相摩也先寒而後熱陰不足

先熱而後寒陰不足寒多而無少陰陰陽也熱多而寒少陽陽陰也寒熱相半陰陽交也寒熱偏日陰陽午離也陽盛發熱陰盛發寒也其有頭疼汗出者有嘔吐不食者有增寒而飲水者壯熱而飲湯者有臂骨疼痛者或渴或秘或內寒而外熱或內熱而外寒又有寒而腹中痛熱而腹中鳴是有食積也治法因於食積者當用白餅子下之天行補助以錢氏白木散寒多熱少者小柴胡湯加桂枝寒多熱少者白虎湯加桂枝寒熱相半者並用小柴胡湯主之
經曰陽虛則外寒陰盛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒寒熱往來此乃陰陽相摩也故寒氣升於陰則發寒陽氣升於陽則發熱口脈微為陽不足陽氣上入陽中則惡寒尺脈弱為陰不足陽氣下入陰中則發熱陽不足則寒寒後熱陰不足則寒熱後寒陰陽不歸其分則寒熱交爭也又上盛則發熱下盛則發寒陽勝則寒陰勝則寒寒陰陽相摩虛實不調故和氣更作而寒熱往來故作寒作熱也少陽者肝之府界乎太陽陽明之間半表半裏之外陰陽之氣易於相乘故寒熱多主肝膽經證以小柴胡湯加減調之若貳貳其寒熱起居如常久而不愈及大痛後元氣未復悉屬陰虛生熱陽虛生寒宜用八珍湯補之甚者十全大補湯有食積為病亦令寒熱用保和丸消之若寒嘔吐泄瀉用六君子湯寒冷飲熱入參理中丸作渴不止七味白散食積既消而寒熱尚作者肝邪乘脾所勝侮而不勝也用吳功散加柴胡山梔其證證寒熱詳見雜門

煩燥

仲景云火入於肺則煩入於腎則瘵夫心者君火也火旺則金傷木鬱火獨有故肺腎合而為臟也活人不但煩熱者虛煩也諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒不夜故知非傷寒也諸虛不聚故知非寒聚也不可發汗攻下當與竹葉湯養喘者與橘皮湯又心虛則失眠而夜夢者實發熱其脈浮緊而大是也蓋煩者心中煩擾而內熱故謂之煩者肢體躁動或身熱入井中為外熱故屬陰引熱者無煩之火也是以為虛虛散而實便配石熱者神芩丸此皆實熱之治也若煩而頭痛每氣口乾煩燥不渴者虛也四君如芩歸因藥攻伐而作渴者用竹葉湯煩而不得眠者蘇散仁湯心脾兩虛煩熱欲吐者砂安神丸而影歸內亦六脈洪大按之全無者血虛發熱用當歸補血湯若脈微沉試入井中脈沉細或浮大按之如無者此陰虛發熱也宜用參附湯有回生之功

注夏

脾為太陰位屬坤土喜燥而惡濕散凡脾胃之氣不足者遇長夏濕潤之令則不能升舉清陽健運中氣又復少陽相火之時熱傷元氣則肢體怠惰不收兩腳膝弱嗜臥者其精神不足飲食少思口中無味時吸吐之氣促目昏視眩暈小便赤數大便不調名曰注夏此皆氣陰虛不足之証治法用清暑瀉熱之藥如六一散等藥之類平治法用補中益氣湯去升麻柴胡加炒黃連之若因勞役發熱虛羸大者用當歸補血湯氣血兩虛者八珍湯肝腎陰虧者地黃丸大便作渴者人參理中湯

若乳母肝火素薄寒熱少者藥胡梔子散胃火作渴者竹葉石膏湯小兒多因乳母之氣不調而致當戒怒氣調飲食適寒溫則可以遠病又如今人夏月皆以香湯湯浸冷代茶飲之殊不知香湯利水大損元陽厚朴炮伐大瀉其氣之脾性溫而惡寒夏月陰虛於內冷感傷脾者胃氣有火濕熱為病之人因無大害其脾胃虛弱中氣不足者必為腹痛少食泄瀉美中之疾矣此大人亦當戒者况小兒乎慎之慎之

黃疸

雖知云色如黃黃乃濕病也一身盡痛名如瘧子黃者黃疸也身不痛乾黃燥也小便不利四股不沉重渴而引飲者瘧子瘧也小便不利四股沉重似渴不欲飲者瘧子瘧也

陳湯

大便自利而黃者茵陳梔子黃連三物湯往來寒熱一身盡黃者小柴胡加梔子湯湯氏云身疼骨痛大小便澀皮膚面目黃爪皆黃小便如星塵色利者易治濕者難治宜服五苓散加茵陳煎湯調又宜服湯散散加茵陳煎或身熱宜服小柴胡湯若者服承氣湯凡黃病者不可一槩而論標本不同證治亦異乃脾胃氣虛感受熱氣於脾理浮於皮膚積成黃疸發於外放有此證或脾虛弱內因微難攻之而成然附湯亦主皮黃髮變壯大青筋肌肉消瘦外無色澤身必發黃此又本於瘧而作致有是證治法若

感濕熱而得身黃如望星之目以吸理五苓散加麻黃水煎服投下之即愈或改用陳高湯調下五苓散亦可

若得於瘧者其形如黃土相類以醒脾散化腐九醒脾散胃脾虛理胃氣已和飲食倍進化腐微榮黃已影濕流膿腐五已各見於本部精準乃形於面說其黃自除

經曰中央黃已入通於脾故黃者脾之色也夫人身之神貴於藏而動用其於外則虛矣其虛者因脾氣有虧造化失職濕熱留於肌膚較而為疸疑仲陽所請身痛行腫一使濕滯通身面目爪甲皆黃是也小便澀色者難治療法宜固脾為尤如專用梔子

寬中淡泄利水之藥則難有不致危者矣若初生及百日半之聞不渴而身黃者胃熱胎黃也腹大食土為脾特兼作渴然者用茵陳散小便不利者茵陳湯病後變或肢體浮腫者用白朮散清便日調

肢冷喘嗽者當散身淡黃者調中丸及補中益氣湯加茵陳身熱腹脹面黃者黃者加減黃散解其所以若困日汗熱多笑不已大小便赤澀口中熱氣者乃能尿尿味胎毒之候也母子並服生地黃湯即忌過飽五辛熱物設不慎誤傷脾土急則變為驚風吐瀉則脫離洋腫小便不利眼目障閉多成相類矣又有脾虛黃者當於脾胃中求之

濕熱

陳治幼幼近編小兒初病潮熱或病後潮熱俱與傷寒太陽證迥異參苓白朮散有養新熱八珍湯加貝母

小兒衛生總微論方

諸身熱

小兒身熱但溫而不甚壯熱此為溫熱

此為風熱甚亦驚

小兒身熱飲水停滯手足攣動上視弄舌印內青筋

見掌中赤白物生遍此為驚熱

小兒身熱面赤久不退雖覺熱而氣急發渴胃弱

涎壅此為積熱壯熱相和但胃弱涎壅為累乃臟

腑積滯為毒二舊防痾瀉也又按頭項硬者亦二

焦腐乾掌也

已上皆其則發諸治在驚熱門中

小兒身熱熱氣促鼻寒清涕噴嚏毛立眼淚出

或出痰水此為傷寒治在傷寒門中

小兒身熱熱氣促鼻熱壯熱或夜發熱面黃腹脹

吐瀉乳食不化胃弱此為傷食治在傷食門

中

小兒夜發熱熱即如故多涎喜睡此肺盛熱也此

與食傷夜發熱相似須識之况二證餘候各皆不

同食傷者可下肺虛者不可下之則生津液發渴

引飲背熱乙治未監薄中五更夜發熱熱即如故

驚作熱以常藥之愈其候多遊喜睡又以藥下

其涎前發甚至五六月滿乙治之不可下乃取

白木散前湯三升使任意飲服朱日飲多不作瀉

否乙日無生水不能作瀉疑利亦不足怪但不可下

散一服而安是此證也錢乙方本集載之
小兒身熱形瘦多渴飲食不為肌肉此為疳熱治在疳門中
小兒血氣壯盛發渴引飲大便壅滯小便赤少四肢身熱有熱而無此為胃實熱也治宜下之
小兒身熱微驚耳熱上唇爛有白泡起如魚目珠子或汗或不汗此為變寒治在變寒門中
小兒身熱唇紫唇青唇白此為瘡疹候治在瘡疹門中此與食傷變寒相似傷寒耳尻背熱變寒唇上有白疳泡珠子為異
小兒身熱者更有內外在內者多飲水得之在外者多因風寒得之錢氏有云小兒身熱飲水者熱在內身熱不飲水者熱在外此大藥之驗也在內者宜下之在外者宜散之
聞孝忠論小兒壯熱傷風濕疫傷寒風熱瘧疾傷食率皆相似未能辨認之問但與升麻葛根湯發散小柴胡湯服之甚驗蓋此數藥通治之不致誤也惟傷食者則大便酸臭不化不食或吐宜與微下
孫真人論小兒內外氣感感時小驚或微覺傷風傷食又慮變為身熱者但以紫圓或龍膽湯為治此二藥無所不療微利動以減盛氣亦不慮小兒兒黃黃而者此藥中有伏熱也宜服龍膽湯若黃白而黃者此按寒不消也宜服紫圓但少食內消甚少少增令微稀薄者須節乳哺一兩日令胃氣平和若不節則病易復則復下傷其胃氣令腹脹滿者至再三下之則為愈矣
小兒於立夏之後有病身熱者慎勿妄為吐下但以

除熱湯治之除熱粉之赤犀膏蜜之

黃疸

小兒有身熱肌膚面目悉黃者此黃病也因為息過度飲食傷飽脾胃受熱與氣相搏蒸發於外脾胃家土其色黃脾肉故為是病也慎不可灸灸則熱轉甚矣若身熱痛背將強大小便澀腹脹滿一身盡黃及目睛爪甲皆黃小便如屋屎色者物皆黃此疸病也若發渴小便澀腹脹沉瀉為難治也黃病者稍輕疸病慘重又有自生下面身深黃者此胎疸也因母臟氣有熱薰蒸於胎故也雖言諸疸皆黃色深黃者是也若母微黃者胃熱也若但面黃腹大渴而食泥土者脾熱也

渴

小兒有渴而飲水者此渴屬熱有熱熱則渴故多體熱發渴亡津液即令作渴飲水以解之也又有指渴吐渴發渴亂發渴者各逐本項具之問孝忠云凡小兒諸渴亡津液引飲但多煎錢氏白木散與服使任意飲足飲之渴多痛好

生大黃 碎硝 甘草各半兩 桂心八兩
石膏二兩 大黃五枚

右六味咬咀以水三升煮取一升每服二合

蜀椒湯

治小兒痢熱 甘草 知母 龍骨 牡蠣各半兩

右五味咬咀以水四升煮取一升去滓一歲兒少

少服半台日再

石膏湯

治小兒腹大短氣熱有進退食不安穀為不化

大黃 黃芩 甘草 麥門冬 碎硝各半兩

石膏二兩 桂心八錢

右七味咬咀以水三升煮取一升半三服每服已

下小兒作五服

竹葉湯

治小兒夏月患腹中伏熱溫壯來往或感下痢色

或白或黃三焦不利

竹葉切 小麥各五合 柴胡 麥門冬 人參

甘草各半兩 茯苓十八錢 黃芩一兩八錢

右八味咬咀以水四升煮竹葉小麥取三升去竹

葉小麥下諸藥取一升半三服若小兒夏月

忽壯熱驚人汗稠黃瘦氣力微為脈洪數用

此方加大黃二兩再服得下即愈

又

治五六歲兒溫壯腹中急滿急不利或有微腫亦

治極風不下飲食羸弱手足逆冷

竹葉一升 小麥半升 甘草 黃芩 瓜蒌根

澤瀉 茯苓 知母 白朮 大黃各一兩
桂心二錢 生薑一兩半 人參 麥門冬

半夏各二兩 當歸十八錢

右十六味咬咀以水七升煮竹葉小麥取四升去

滓內藥煮取一升六分分四服

大黃牡蠣湯

治小兒壯熱黃連不去寒熱往來微驚悸

大黃二兩 黃芩 瓜蒌根 甘草各十八錢

滑石二兩 桂心 牡蠣煨 人參 龍骨

煑水石 白石脂 硝石各半兩

右十二味咬咀以水四升煮取一升半每服三合

一日一夜令盡連吐亦與之

一本加紫石英半兩

調中湯

治小兒春秋月歲久中暴冷令氣折其四肢熱不

得泄則壯熱冷氣入胃變下痢或赤白帶起數小

腹脹痛發壯熱氣厥洪大或急數者服之無便歇

下亦捷也但壯熱不吐下者亦主之

葛根 黃芩 茯苓 桂枝 芍藥 白朮

薤白 大黃 甘草各六錢

右九味咬咀以水三升煮取五合服如後法兒生

一日至七日取一合分三服生八日至十五日取

一合半分三服生十六日至二十日取一合分三

服生二十日至三十日取二合分三服生三十日

至四十日取五合分三服生四十五日未得更以意

斟酌的百日至二百日兒一如前葛龍膽湯加之

生地黃湯

治小兒寒熱進退喘咳腹痛

生地黃 桂心各二兩

右二味以水三升煮取一升暮歲以下服二合已

上三台

一方七味有芍藥棗水石膏當歸甘草各半兩

犀角散

治小兒心熱熱感

犀角十八錢 茯苓一兩 麥門冬一兩半

甘草半兩 白朮六錢

右五味咬咀以水九合煎取四合分服加龍齒一

兩佳

加味小柴胡湯

治乳母肝火發熱等證致兒為患子母並服

柴胡一錢 黃芩七分 人參 半夏各四分

甘草三分 山梔 丹皮各五分

右水煎

柴米麥湯

治肝火熱無通身瘰癧或起赤瘰或筋絡結核

白朮炒 人參 茯苓各一錢 柴胡 川芎

山梔 芍藥炒 甘草炒各五分 熟地黃自製

當歸各八分

右水煎服

芍藥散

治肝木旺脾土目割面青食少體倦

芍藥炒 人參 茯苓 白朮 陳皮各七分

柴胡 山梔 甘草炒各五分

右水煎服

龍膽瀉肝湯

治肝經濕熱或癰癤使毒小便澀滯

龍膽草酒炒五分 車前子炒 木通 當歸尾

澤瀉各三分 甘草 黃芩 生地 山梔各三分

右水煎服

清涼飲

治消中能食而瘦口乾自汗大便結燥小便頻數

羌活 柴胡 炙甘草 知母酒製 黃芪炒

黃芩酒製各一錢 生甘草 防己 生地酒製

防風各五分 當歸六分 紅花少許 杏仁

桃仁各五箇 升麻四分 石膏 川黃蘗

草龍膽各一錢五分

右每服一二錢水煎入酒少許服

黃連香薷飲

香薷四兩 厚朴二兩 黃連一兩

右每服一二錢水煎入酒少許服

水酒各一盞煎服

連翹飲子

治大人小兒五臟虛熱煩躁多渴昏蒙閉目赤

鼻頰結硬口舌生瘡陽明證傷寒發狂見鬼譫語

大小便閉一切風癰皆治之

山梔 甘草 赤芍藥各一兩 大黃 礞石

連翹 薄荷 乾葛各二兩

右為散每服二錢水一盞天竹葉七葉三匙同

煎至七分去滓食後服性陽明證傷寒忌下

全蠍散

治小兒驚熱

全蠍 天南星取心為末一錢 人參三錢

蛇蛻二錢

右為末蜜酒調下或薄荷加蜜酒調下

洗心散

治小兒過身壯熱頭目昏痛皆神均愈大熱衝上

口苦驚悸夜臥臥臥咽喉痛腫痛喉乾痰壅

食不進心神躁熱眼目昏痛皆神均愈大熱衝上

證聲不出百骨節痛大小便不利痘疹時行痘疫

狂語多渴及小兒天中風夜驚宜服之

大黃四兩以米泔水浸一炊間洗乾炒取麩

當歸炒 芍藥 炙草 荆芥 麻黃各四兩炒

白木一兩炒

右搗羅為細末每服二錢水一盞入薑一片薄切

二葉同煎至八分放酒和滓服了仰臥仍去枕少

時如五臟虛實前四五錢匕若要清轉則熱服

溫酒散

治小兒風熱及傷寒時氣瘧疾發熱頭痛壯熱目

澀多睡味嗜睡相與寒清涼

桔梗 細辛 人參 白木 瓜蒌根 甘草炙

白茯苓 川芎各等分

右搗羅為細末每服二錢水一盞生薑一片薄

切荳蔻同煎七分服三歲已下作四五服五歲已

上分二服凡小兒發熱不問傷風熱先與此散

散服往往愈

幼科全書加麻黃

學童百問無川芎

麻黃黃平湯

治小兒傷寒無汗煩燥熱甚

麻黃去節一兩 黃芩 赤芍各半兩 甘草炙

桂枝去皮各一分

右搗羅為細末每服二錢水一盞下日三服兼治

天行熱氣生現口燥不快益煩燥作夜臥出尚身

疼熱

升麻黃平湯

治小兒傷風有汗頭痛發熱惡寒

升麻 葛根 黃芩 芍藥各三錢 炙草一錢半

右剉如麻豆大每服二錢以水一中盞煎至六分

去滓溫服若時行瘧疾出不快煩躁不眠者加木

香一錢五分

甘葛散

治小兒胃中客熱口臭不思飲食或嘔煩不飲食

齒齦腫疼腹脹血舌口中有瘡赤眼紅腫目不欲

開瘳疹已發未發並宜服

熟地黃 生地黃 天門冬 麥門冬並去心焙

枇杷葉去毛 枳殼炒去穢 黃芩 石斛

山茵陳 甘草炙各等分

右為細末每服二錢水一盞煎至六分去滓食後

臨臥溫服

雙丸

治小兒身熱頭痛飲食不消腹脹滿或心腹疼痛

大小便不利或下重數起不差可再服小兒熱候

哺食減少氣急不快夜睡不寧是腹內不調宜

用此丸下之

甘連半兩 朱砂一錢另研 麥門冬二兩半

右為細末每服二錢水一盞煎至六分去滓食後

製桃去仁研四兩半 牡蠣二兩 炙甘草一兩
巴豆六十枚去皮心麝研新布絞去油日中曬之白
如霜者

右麥門冬甘草甘遂牡蠣四味為細末入巴豆末
砂羅仁合和搗二十杵更入少蜜搗和極熟旋丸
半歲兒服如桂子大一雙一歲兒服如半麻子大
分爲一雙服如二歲麻子大一枚分一雙三四歲
者服如麻子大二九五六歲者服如大麻子大二
九七八歲者如小豆大二九十歲者大於小豆二
九當以雞鳴時服如至日出時不下者熱飲服
數合投之即下藥丸若雙出也下利甚者濃煎冷
飲之便止

石膏麻桂湯

治小兒傷寒未發熱咳嗽頭面赤

麻黃湯泡 黃芩各一兩 炙甘草 石膏

芍藥各半兩 桂心一分 杏仁十枚去皮尖

右七味為散每服二錢水一中盞入生薑一片煎

半盞去滓服見若甚小以意增減之

連翹散

治小兒一切熱

連翹 防風 甘草 山梔子各等分

右件搗細為末每服一錢水一鍾煎七分溫服

麥門冬湯

治少小未滿百日傷寒鼻熱身熱嘔逆

麥門冬三分 石膏 寒水石 炙甘草各半兩

桂心三錢半

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎七分溫服

五物人參飲

治小兒天行壯熱咳嗽心腹脹滿

人參 甘草各半兩炙 麥門冬一兩去心

生地黃一兩半如無只用生地半兩

右剉如麻豆大每服三錢水一盞入茅根半握煎

至七分去滓溫服

八物麥門冬飲

治小兒諸熱

麥門冬三兩去心 炙甘草 人參各一分

紫苑 升麻各二兩 貝母一分半

右剉如麻豆大每服三錢水一盞入茅根半握煎

至七分去滓再入竹瀝少許重煎溫服

藥散飲

治小兒天行五日以後熱不歇者

葛根半握 麻黃半兩去根節 淡豉一合

葛白切一合

右件共童子小便一盞煎至一盞去滓分一服

涼膈散

一名連翹散治傷寒表不解半入於裏下證未

全或復未愈者或燥熱傳結於內而煩心懊憹不

得眠者及無間傷寒雜病大人小兒臟腑熱煩

躁多渴而熱頭昏昏煩咽燥舌腫喉痹目赤鼻衄

煩煩結硬口舌生瘡或實不利咳喘胸膈臥臥不

安諸語狂妄胸膈悶燥便閉結一切風熱滯滯

風眩赤毒及傷寒陽明目熱發狂下證未全者或

誤服暖藥過多為諸熱證并酒狂熱等兼小兒斑

疹痘毒已出未快者或熱極黑陷將死者

梔子仁 連翹 薄荷 黃芩 甘草各一兩半

大黃 碎硝各半兩

右為粗末每一兩水一盞竹葉七片煎至一盞去

滓入蜜少許食後服如黃連亦得

去六經熱減大黃碎硝加桔梗甘草人參防風

治肺經邪熱咳嗽有痰加半夏

涼膈散四物各半服能益血洩熱名雙和散

錢氏去連翹加蜜香石膏為瀉散

寶鑑連翹四兩兩黃各二兩餘各一兩

柴胡 乾葛 黃芩 桂枝 赤芍 人參 甘草

右竹葉七片薑棗作引煎服

調元生脈散

黃芪 人參 麥門冬 甘草 五味子

右水煎服

參蘇飲

人參 半夏 茯苓 甘草 桔梗 枳殼

乾葛 前胡 木香 陳皮 蘇葉

右薑棗引煎服

荆防敗毒散

生大黃 防風 荆芥穗 酒紅花 牛蒡子

升麻 元參 人參 桔梗 酒棗 酒棗

甘草

右水煎服

萊菔粉飲

如小兒誤服熱藥太過者以致煩躁不安或作吐

或狂或渴宜先解毒此飲主之

薑黃粉一兩 黃連炙 乾葛 生甘草各半兩

三味共末同薑黃粉各勻每服五分至一錢淡豆豉湯溫調服

豆卷散

如小兒新發多用藥性溫及藥藥治之有屬未退而別生熱證有病愈而致熱證者有反為驚者甚多當問病者數日因何得之曾以何藥調之可用解毒之藥無不效也以此散主之

大豆黃卷以水浸黑豆生卷是也曬乾 炙草黃藥 板椒根

每各一兩為末服五分至一錢水煎去渣服

王菠九 下口

治風濕化戾利精清頭目煩熱除咳嗽

寒水石火煨木炭二兩 半夏製一兩 桔梗五錢

共為末木糊丸如粟米大薑湯下

威風寒咳嗽桑白皮湯下

咳血牙低湯下

常咳茶湯下

咳而吐蠟蜜湯下

胃苓丸

分陰陽退潮熱止吐泄消浮腫黃疸調脾胃止便

濁小兒常用之藥也

蒼朮米泔水浸刮去黑皮焙乾 厚朴薑汁炒

陳皮 白朮各五錢 枳殼炙 草果各一錢

丁香 澤瀉 白茯苓三錢 官桂一錢

共為末水和丸如粟米大炒水湯下

嘔吐痰瀉湯下

調胃炒米湯下

白濁瀉湯下

瀉熱炒米煎湯下

黃連加茵陳五錢燈心湯下

煎熱水竹葉炒米湯下

浮腫長流水煎燈心五加皮湯下

疳氣回春湯下

神丹丸

治小兒上焦積熱驚風變證頭目赤腫咽喉大小

便赤澀及痰喘之證應皆治之

大黃酒蒸 黃芩各一錢 黑牽牛取頭末

滑石各四錢 黃連 川芎 薄荷葉各九錢

共為末面糊以丸如粟米大竹葉湯下

敗毒散 下口

治小兒傷寒瘟疫風濕頭目昏眩四肢痛惜寒

熱項強目睛赤尋常風眩拘攣風痰身熱項疼及

寒寒咳嗽鼻塞重車寒熱治之

柴胡漢去蘆 前胡 川芎 枳殼炒 羌活

川獨活 白茯苓 桔梗炒 人參各一兩

甘草半兩

右為粗末每服一錢生薑薄荷煎加地骨皮天麻

或剉散加蠟蛇防風

治驚熱可加芍藥枳殼黃芩

無汗加麻黃

四順清涼飲

治小兒風濕黃腫瘡毒熱煩赤多渴五心煩躁

睡臥不安四肢驚掣及因乳哺不時寒濕失度令

兒血氣不順腸胃不潔小便少大便澀或溫壯連

滯或成伏熱或壯熱不歇或發驚潮治風熱結核

頭面痛目赤咽痛疳疔毒一切發熱宜服之

赤芍藥 當歸 甘草 大黃各等分

右剉散二錢已上每服一錢水一盞煎至七分作

兩服

準繩加薄荷

治熱熱渴不止加水香大黃用漿

欲利小便用赤芍藥準繩加燈心木通

麻黃加甘草

不利瀉加黃

冒風邪加去節麻黃

中風體強服麻上說加獨活地兒大小虛實加減

微瀉利高度可加荆芥

柴胡散

治小兒傷寒無汗有氣證壯熱煩躁身痛目乾

煩渴小便赤大便閉證發驚驚風

石膏 黃芩 甘草 赤芍藥 葛根各一錢半

麻黃去節 柴胡半兩

右剉散三錢已上每服一錢水一小盞生薑少許煎

白三豆或一盞煎六分溫服

茵陳湯

治陽明病發熱汗出者此為熱越不能發也但頭

汗出身無汗齊頭而暈小便不利渴飲水漿者此

為濕熱在裏身必發黃傷寒七八日身黃如橘色

小便不利服茵陳者

茵陳散者一兩 大黃三錢半 梔子大者二枚

右劉散以水一大碗先煎四陳減半次用一二味煎八分去滓溫服日三服小便當利如見角汁數色正赤一宿身減黃從小便中去也量大小加減

梔子八枚 黃芩一兩 甘草炙半兩

治傷寒身黃發熱

右劉散每服二錢水一盞煎六分去滓溫服

犀角散

治小兒黃疸一身盡黃

犀角銼一兩 茵陳 乾葛 升麻 龍膽草

生地黃各半兩 寒水石七錢半

右劉散白水下

乾葛根汁

治小兒忽發面目黃皮肉盡黃

乾葛根汁

連翹亦小豆湯

治小兒傷寒發身熱

麻黃去節 連翹 生甘草 生薑 赤小豆

生梓白皮各二兩 杏仁四十粒 大棗十二枚

右劉散白水下

麥煎汁

小麥苗搗汁

右服之立效

茵陳五苓散

五苓散加茵陳湯十分五苓散五分

右二件并勻每服一錢溫水調下日三服

當歸散

治小兒夜啼者藏寒而腹痛也面青舌冷不吮乳是也宜用此方

甘草炙 桔梗 陳皮 當歸各一錢

右為末水煎半盞時時少與服之

又有熱痛亦啼叫不止夜發面赤唇焦小便赤與

三黃丸入參湯下

小半夏湯

治黃疸小便已不異氣自利腹滿而喘者不可除熱熱去必噤

半夏湯洗七次

右劉散每服二錢水一盞煎一片煎七分溫服

消食丸

常服寬中快氣消積食正顏色

縮砂炒 陳皮炒 三稜煨 蓬朮煨 神麴炒

麥芽炒 香附米泔浸一宿炒 枳殼 檳榔

烏梅各半兩 丁香二錢半

右為末對麴丸如菰豆大食後茶飲湯下二十九

或二十九

小麥胡湯

治小兒傷寒潮熱少陽汗出口渴溫熱身熱惡風頭痛項強四肢煩疼往來寒熱胸滿耳聾嘔噎痰

實中昂瘧疾並服之

人參 甘草炙各三錢 黃芩二錢 柴胡八錢

半夏湯泡七次焙乾一錢半

右劉散每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎去

滓溫服不拘時

王肯堂以恩按前方若肝脾經風熱肝火壅乘熱結往來日晡發熱潮熱不欲飲食或惡火口苦汗鬱膨脹或胸滿小便不利或泄瀉吐酸苦水或腹體痛動行抽搐及乳母有前證致兒為患者並宜服之

葛根黃連黃芩湯

治太陽病桂枝證反下之利遂不止脈促者邪未解也喘而汗出者

葛根二兩 黃芩 黃連各七錢五分 甘草五錢

右劉散每服三錢水一盞煎七分去滓加減服

喘甚加麥麴子

二黃丸

治小兒三焦積熱大渴引飲眼目赤腫口舌生瘡

心膈煩躁不美飲食大小便秘澀五臟實熱或下

鮮血痞滿熱瀉

黃連去蘆 黃芩 大黃梗各十兩

右為末煉蜜丸桐子大每服二十丸熱水下

如屬虛實加服丸數小兒積熱可服

竹葉湯

治小兒傷寒發渴虛羸少氣氣逆欲吐四肢煩熱

石膏二兩 半夏四錢 人參 甘草炙各一錢

麥門冬六錢去心

右劉散每服一錢水一盞青竹葉生薑各四片梔

米七粒同煎

梔加生薑竹葉

香薷飲

治夏月中暑下咽即甦