

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百

九十一



詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勛

次定百萬人言

並漢才朱

雅伊

便盡

日古音

周王朱櫛 撰

力女大慾不能以直遂

結為便毒矣夫人脚腿

迴路也或觸景而動心

陽又不能忘情息念精

普濟方

與血交滯其不為腫結也幾希便毒處所上不在腹下不在腿介乎兩間之中是也嘗怪世俗無知纔覺有便毒證狀必以為熱氣所攻每每薄衣露足遂使寒邪乘之熱氣轉不得散日復一日敗精宿血愈聚而愈結焉不思一身宗筋上絡於舌本下聚於陰器筋得寒則急急則縮甚至傴僂而不獲伸於斯時也百藥並陳亦難責効况復從事於寒涼者乎治法散寒利熱泄其腎邪活其血脈是為捷徑外此老人氣滯亦或有之

方

連翹湯 治便毒腫結

連翹 獨活 川升麻 射干 木通 桑寄生

赤茯苓 甘草 灸各七錢半 大黃 生用 木香 乳香 沉

香 各五錢

右剉細每服三錢水一盞半慢火煎服

復元通氣散 治便毒初發用此方

穿山甲 酒浸灸 天花粉 酒浸一宿焙 白芷 舶上茴香

炒白牽牛末炒延胡索擦去皮南木香 當歸 甘

草灸各一兩青木香兩半

右為細末每服二錢温酒調食前服不飲酒南木香

煎湯下

治痛毒

胡椒十二個過五分燒樺皮一兩過五分燒穿山甲一兩粉炒皂角

針一兩炒山梔子一兩炒乳香兩半沒藥兩半甘草兩半

右為細末每服二錢温酒調下食前服

雙解湯 治便毒內蘊熱氣外挾寒邪精血交滯腫結

疼痛

辣桂 川大黃 白芍藥 澤瀉 牽牛炒去末 桃

仁去皮尖乾 甘草五分

右為粗末每服三錢水一盞半薑五片食前服日兩服先小便快熱從小便出後大便利皆是調毒

治便毒

大黃 黃連 枳殼 甘草 穿山甲

右呔咀為飲子酒水各半盞煎十分濃露一宿次早
空心服上半日不可喫食便忌熱物免吐

又方

黃芩萹 大黃 芒硝 甘草節

右用水二盞煎至八分空心服調理甚妙

威靈仙散 治發背便毒

威靈仙 貝母 白芷 甘草

右呔咀每服半兩酒水煎服

治男子婦人便毒驗如神

殭蚕七個炒 去絲 大黃一兩 麝香二字 硝少許

右為細末好煮酒調和必要起五更服之如過動即可如不過再用一服已成膿者小便去之未成即散

千金托裏散 治便毒惡瘡一服取效如經三五日已

成結腫核連進二三服為妙腫則先用烏龍膏貼之

蛇床子炒 牡蠣煨 甘草節生 大黃各二兩

右咬咀每服五錢水一盞酒半盞隔宿煎露一宿次

早五更服如大便實加大黃入藥後令下去二三行

臟腑病隨藥去

治便毒絕妙

胡桃五个 芫荽一个 樺皮少許

右燒存性為末酒調空心下

治便毒腫痛

雄黃 乳香各二錢五分 黃栢一錢

右為細末分作兩服以新水調傳自平

又方 治便毒

大黃 明礬 胡桃肉各等分

右同研為末丸如彈子大空心不喇口細嚼一九好

酒送下忌煎炒熱火物

退毒飲 治便毒腫結

川山甲半兩 醋炙焦 煎法 木猪苓三錢 醋微炒 煎法

右為末每服二錢食前老酒調下次以法醋煮肥皂

研膏傳之妙

治便毒

木鱉子

一兩 去殼

甘草節

一兩

右為末好酒一椀煎之熱服

貝母丸 治便毒瘰癧有效

貝母

皂角子

各半斤

右為細末用皂角半斤剉碎搓揉濃水濾過作膏子

和藥末丸如梧桐子大每服五七十九早晨酒下凡

便毒證服二藥不効可服五香連翹湯十奇內補散

治便毒并治癰腫未有頭必效方

用牛蒡子一半炒一半生碾為末空心酒調服愈單
用牛蒡根傳之亦可

又方

用班猫七個去頭翅足為細末入海金沙半匙酒調
露一宿早空心服忌食至午飯小便中見毒方用粥
調理甚妙此方多効

治便毒

用楮桃三十二個酒煮服大病不禁二服無膿者隨氣自散

皂角膏 治便毒癰疽等

用皂角一條用尺以上者槌碎法醋煮爛研成膏傅之屢効

膠方 治便毒初發

用水膠以水溶開塗傅若便毒已大而軟則用魚鱈膠於熱湯中煮軟乘熱研爛傅之或要換藥以熱湯

洗去

治便毒 用紫背草研醋調傅之

治便毒初發

用生薑一大塊米醋一合薑蘸醋磨取千步峰泥敷

譽作處即効

千步峰即人家行步
地上有高塊者是

治瘡氣即瘕瘰

血餘

一兩燒灰研為
細末即人髮

錦紋大黃

一兩麵
炭煨過

猪牙皂角

三錢

右半為呔咀半為末先以呔咀用水一盞半煎至七分却入好酒二盞去滓調前件藥末空心服之前藥分作三服

又方

知母一兩貝母一兩去心

右各為細末紅酒調下飲醉為妙更以酒調藥塗患處

治瘰方

穿山甲 蚌粉同炒

右為末麻油輕粉調傳

石霜膏

風化石灰 百草霜等分

右為末以酒醋調鵝毛順手掃起

治瘡方 亦治便毒

用大乾芭蕉葉熨斗內燒存性為末麻油輕粉打和
傳瘡留頭以軟紗貼換易三次或散或破無痕一方