



續廣達生編

卷之四目次

產後論

產後三禁論

產後常用湯方

產後血暈症治

產後氣脫症治

附產後氣脫案

脫症宜服棧論

閉脫症辨

產後惡露不下症治

產後惡露不止症治

產後暴崩症治

產後尋勞症治

產後遍身疼痛症治

產後頭痛症治

產後心疼症治

產後腹痛症治

產後小腹痛症治

產後兒枕痛症治

產後腰痛症治

產後脇痛症治

產後血氣痛症治

產後脚氣症治

產後寒熱辨論並症治

產後發熱症治

產後乍寒乍熱症治

產後傷寒症治

產後中風症治

產後汗出不止症治

產後發瘧症治

產後譫語症治

附產後譫語案

產後顛狂症治

產後眼見黑花昏眩症治

產後不語症治

產後脹滿吐惡症治

產後霍亂吐瀉症治

產後發渴症治

產後口乾痞悶症治

產後鼻衄症治

產後咳嗽症治

產後泄瀉症治

產後痢疾症治

產後大便閉澀症治

產後小便閉症治

產後淋瀝症治

產後小便頻數及遺尿症治

產後瘡疾症治

產後浮腫症治

產後乳病症治

產後子腸不收症治

產後子宮脫出症治

擦破膀胱症治

產後癥塊症治

產後陰戶雜病症治

產後怪疾治法

附花顛症治

產後痘疹症治

續廣達生編卷之四

周登庸先生纂輯

產後章

同志諸君子重梓

○產後論

新產之後。百脉空虛。風寒易入。最宜調攝得法。所最危者。暈脫二證。其餘雜證。多屬外感。內因。外感者。感冒風寒。暑濕也。內因者。內傷飲食藥餌也。調治者。或宜古人產後以補虛爲主。俱證以未治之說。卽有外邪。全不清理。而妄投滋補者。有之。或泥產後惡露宜淨。不可驟用棧。蓄之說。卽遇虛脫。亦不培補。而妄投寒涼者。有之。又或

飲食不節。起居不時。以致積滯成病。而妄用剋伐消導者。亦有之。此皆不知臨症變通。拘泥不化者之所爲也。今將產後諸症臚列一篇。以便臨證施治。庶天下後世之產母。同登壽域矣。

有歌曰。產後總宜大補虛。寒涼攻發害非一。雜症皆爲末病看。培養元氣爲中的。

又歌曰。三日之內血宜流。熟地白芍忌酸收。生化湯與黑神散。生新化舊二方求。歸朮妙湯真保產。三方斟酌不須憂。

○產後三禁論

觀病機要云。治胎產之病。當從厥陰症論之。宜無犯胃氣。及上二焦。是爲三禁。謂不可汗。不可下。不可利小便。發其汗。則同傷寒下早之症。利大便。則脉數而傷脾利小便。則內亡津液。胃中枯燥。但使不犯三禁。則榮衛自和。而寒熱自止矣。凡用治之法。如發渴則白虎。氣弱則黃耆。血痛則當歸。腹痛則芍藥。大抵產病天行。從加減柴胡。雜症從增損四物湯。宜察脉證而用之。詳此說。雖爲產後之大法。然病變不同。倘有是症。則不得不用是。

藥所謂有病則病受之也。第此經常之法固不可不知。而應變之權亦不可執一也。

○產後常用湯方

生化湯

此方去舊生新。極平極穩。凡產後無論有病無

病。三日前能服數劑。使惡露盡去。新血速生。誠產後之

要藥也。世俗每以紅糖下瘀。反致損胃。戒之。

當歸

五錢

川芎

二錢

桃仁

十粒去皮尖

黑姜

一錢

炙草

二錢

每日一劑。

水煎熱服四五劑爲度。

黑神散

治產後惡露不盡。血氣攻心。腹痛等症。

肉桂

當歸

白芍

黑姜

生地

黑荳

炒

水煎水。

酒兌服。

右方酸收之劑。三日前不宜用。世人動云。芍藥地黃。乃產後忌藥。不知三日內爲忌藥。五日外爲要藥。且去血過多。正宜酸收。

歸朮保產湯。此方產後三五日外服之極妙。

當歸

川芎

白朮

土炒

黑姜灰

各錢半

生地

七分

白芍

酒炒七分

陳皮

香附

炒各五分

甘草

一錢

酒水

各半煎服

產後聖方

人蔘

三錢

歸身

一兩

川芎

五錢

芥穗

炒一錢

黑

益母草

二錢

附加減法。

右方爲主。倘有風。

加柴胡五分。有寒。加肉

桂一錢。血不淨。加山查十粒。血暈。加炮姜五分。鼻中衄。血加麥冬二錢。夜熱。加地骨皮一錢。食滯。加山楂五粒。穀芽一錢。有痰。加白芥子五分。餘斷不可侵入。此方純補氣血而不治表。所以爲妙。屢治產後無不神效。

產後代棧湯。產後最宜服。棧但貧者不易得。今酌定一方代之。

黃芪

蜜炙八錢

熟地

四錢

白朮

土炒歸身

酒洗各三錢

茯苓

炙草

淮牛膝

炮姜

各一錢

益母草

二錢

水煎服

錢氏生化湯。治產後諸症。乃錢氏世傳常用之妙方。

當歸

錢五

川芎

錢二

炙草

分五

黑姜

分三

桃仁

十粒

及雙仁

去皮尖

熟地

不用

三味

水二鍾

煎八分

溫服

一方無熟地

又有

去熟地

加益母草

錢二三

炒荊芥

六七分

一法也

附加減法

凡胎衣不下

或血冷氣閉

血枯氣弱等症

連服二三劑

卽下

或用此湯送

益母丸一粒

蓋益母草

行血養血

性善走而不傷人者也

一血暈虛暈加酒

炒荊芥六七分

一氣虛氣脫

倦怠無力

加人蔘炙黃

著

一陽虛厥逆

加附子肉桂

一脈虛煩渴

加麥冬

著

一陽虛厥逆

加附子肉桂

一脈虛煩渴

加麥冬

著

一陽虛厥逆

加附子肉桂

一脈虛煩渴

加麥冬

著

北五味。一氣壅有痰。加陳皮。竹瀝。一血虛血燥。便結。加麻仁。杏仁。苳蓉。一多汗不眠。加茯神。棗仁。黃芪。上體多汗。加麻黃根。下體多汗。加漢防己。一煩熱。加丹皮。地骨皮。一口噤如風。反張。瘈瘲。加荆芥。防風。各三四分。一惡露未盡。身發寒熱。頭痛。脇脹。其小腹必然脹痛。加紅花。丹皮。內桂。各三四分。元胡一錢。一內傷飲食。加山楂。陳皮。砂仁。或神麴。麥芽。一外傷寒濕。加蒼朮。或白朮。一血積食積。胃有燥糞。臍腹脹痛。加酒炒大黃二錢。一產後下血不止。或如屋漏水。沉黑。