

欽定四庫全書

子部

外臺秘要方卷三十



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

外臺秘要方卷三十

惡疾大風方一十首

唐 王燾 撰

千金論曰惡疾大風有各種不同初得雖遍體無異而
眉鬚已落有遍體已壞而眉鬚儼然有諸處不異好人
而四肢腹背皆有頑處重者手足十指已有墮落有患
四體大寒而重裘不暖者有尋常患熱不能暫涼者有

身體枯槁者有津汗常不止者有身體乾痒徹骨搔之
白皮如麤卒不作瘡者有瘡痂荼毒重疊而生晝夜痛
不已者有直置頑鈍不知痛痒者其色亦有多種有青
黃赤白黑光明枯闇此疾雖種種狀貌不同而難療易
療皆屬在病人不繇醫者何則此病一著無問賢愚皆
難與語口順心違不受醫教直希望藥力不欲求已故
難療易療屬在病人不關醫藥臣嘗手療六百餘人差
者十分有一莫不一一親自撫養所以深細諳委知其

情性若覺難共語不受人教即不須與療縱與療終有觸藥力病既不差乃勞而無功也仁者易共語故可療也

又論曰神仙傳有數十人皆因惡疾而致仙道者何皆繇割棄心累懷潁陽之風所以非止差病乃至因禍而取福也故臣所覩病者其中頗有士大夫乃至有異種名人乃遇斯患皆戀愛妻孥繫著心髓不能割捨直望藥力未肯近求諸身若能絕其嗜慾斷其所好非但愈

疾因茲亦可自致神仙嘗問諸病士人皆云自作不仁之行久久並為極猥之業於中仍欲更作云為雖有悔言而無悔意但能自新受師教命食進藥餌何有不除臣以正觀中嘗將一病士入山教服松脂欲至百日鬚眉皆生由此觀之唯須求之於已不可一仰醫藥者也然有人數年患身體頑痺羞見妻子不告之令知其後病成狀候分明乃云卒患此皆自誤然斯疾也雖大治之於微亦可即差此疾一得多者不過十年皆死近者

五六歲而亡然病者皆自謂百年不死深可悲悼

又論曰一遇斯疾即須斷鹽常進服松脂一切公私物
務釋然皆棄猶如脫屣凡百口味特須斷除漸漸斷穀
不交俗事絕乎慶弔幽隱巖谷周年乃差差後終身慎
房室犯之還發茲疾有吉凶二義修善則吉若還同俗
類必是凶矣今略述其繇致以示後之學者可覽而思
焉

又菴豆療惡疾方

細粒烏豆擇取摩治之去有皮不落者三月四月
取天雄烏頭苗及根淨去土勿洗擣絞取汁漬豆
一宿豆如熟豆大漉出暴乾如此七度始堪服每
服三枚漸加至六七枚日一忌房室猪魚雞雉肉
畢三十日毛髮即生犯藥即不差

又岐伯神散療萬病癰疽疥癩風痿骨肉疽敗百節疼
眉毛髮落身體淫淫躍躍痛痒目痛爛眥耳聾齟齬痔
瘻等方

天雄炮去皮

附子炮去皮

細辛

烏頭炮去皮

茵芋炙各一兩

乾薑二兩

石南

菖蒲

防風各二兩

白朮

獨活各三兩

躑躅一兩

椒汗二兩

防葵二兩

枳實二兩

右十五味搗散以酒服方寸匕日三勿加

又療惡疾狼毒散方

狼毒炙 秦艽

右二味等分為散酒服方寸匕日二服五十日愈切

須忌慎

又方

松脂鍊投冷水中二十遍杵末蜜丸服二兩饑即服之日三鼻柱斷離者二百日差斷鹽及雜食房

室

又石灰酒主生髮毛長鬚眉去大風方

松脂

成鍊者
十斤

黍米

一石

石灰

一石拌和濕
蒸令氣足

上麴

一石二
升

右四味先於大鑪中炒石灰以木著灰中火出為度
枸杞根剉五斗以水一石五斗煮取九斗半去滓以
淋石灰三遍澄清以石灰汁和釀漬麴用汁多少一
如釀法訖封四七日開飲一二升常令酒氣相及為
度百無所忌不得觸風其米泔水及飯糟不得使六
畜犬鼠食之皆須令深埋却此方九月作至二月止
恐隔上熱服後進三五口冷飯壓之婦人不能食飲
黃瘦積年及褥風不過一石即差

又療風身體如蟲行方

鹽一斗水一石煎減半澄清溫洗浴三四遍亦療

一切風

又方

以淳灰汁洗面不過一月愈

又方

以大豆漬飯漿中旦溫洗面頭中痒加少麴沐頭

勿以水濯之十洗必差

又方

成鍊雄黃松脂等分蜜和丸以飲服十九丸如桐
子大日二百日差慎酒肉鹽豉生冷生血物等神
秘不傳 出第二十四卷中

近効婆羅門僧療大風疾並壓丹石熱毒熱風手脚不
隨方

硝石 一大兩

生烏麻油 二大升

右二味內鐺中以上鑿蓋口以紙泥固勿令氣出細

細進火煎之其藥未熟氣腥候香氣發即熟更以生
烏麻油二大升和之更微火煎之以意斟酌量得所訖
內不津器中服法患大風者用火為使在室中重作
小紙屋子屋子外然火令病人在紙屋中發汗日服
一大合病人力壯日二服服之三七日頭面庖瘡皆
滅若服諸藥丹石熱發不得食熱物著厚衣卧厚牀
牀風者即兩人共服一劑服法同前不用火為使忌
風二七日或但取一匙內口待消咽汁熱除忌如藥

法呂員外處得

諸癩方九首

病源凡癩病皆是惡風及犯觸忌害得之初覺皮膚不
仁或淫淫苦痒如蟲行或目前見物如垂絲或癰癬輒
赤黑此皆為疾之始起便急療之斷米穀者鮭專食胡
麻松朮輩最善也夫病之生多從風起當時微發不將
為害初入皮膚之裏不能自覺或流通四肢潛於經脉
或於五藏乍寒乍熱縱橫脾腎蔽諸毛腠理壅塞難通

因茲氣血精髓乖離久而不療令人頑痺或汗不流泄
手足酸疼針灸不痛或在面目習習奕奕或在胃頸狀
如蟲行或身體偏痒搔之生瘡或身面腫痛徹骨髓或
頑如錢大狀如蚝毒或如梳或如手錐刺不痛或青黃
赤黑猶如腐木之形或痛無常處流移非一或如酸棗
或若懸鈴或似繩縛拘急難以俛仰手足不能搖動眼
目流腫內外生瘡小便赤黃尿有餘瀝面無顏色恍惚
多忘其間變狀多端毒蟲若食人肝眉睫墮落若食人

肺鼻柱崩倒或鼻生息肉塞孔氣不得通若食人脾即
語聲變散若食人腎耳鳴啾啾或如雷鼓之音若食人
筋脉支節墮落若食人皮肉頑痺不覺痒痛或如針錐
所刺名曰刺風若蟲乘風走於皮肉猶若外有蟲行復
有食人皮肉徹外從於頭面即起為皰肉如桃核小棗
從頭面起者名曰順風從兩脚起者名曰逆風令人多
瘡猶如癬疥或如魚鱗或痒或痛黃水流出初起之時
或如榆莢或如錢孔或青或白或黑或黃變易無定或