

女科準繩 五之二

產後門

痞悶	往來寒熱	虛煩	顛狂	癰瘕
腹脹	瘡	渴	下見鬼神	拘攣
水腫	尊勞	自汗	驚悸	不語
積聚	虛羸	黃疸	恍惚	狂言譫語

瘕瘕

薛瘕者筋脉拘急也瘕者筋脉弛縱也經云肝主筋而藏血蓋肝氣爲陽爲火肝血爲陰爲水前證因產後陰血去多陽火熾盛筋無所養而然耳故癰疽膿水過多金瘡出血過甚則陽隨陰散亦多致此治法當用八珍加丹皮釣藤以生陰血則陽火自退諸證自愈如不應當用四君芎歸丹皮釣藤以補脾土蓋血生於至陰至陰者脾土也故小兒吐瀉之後脾胃虧損亦多患之乃虛象也無風可逐無痰可消若屬陽氣脫陷者用補中益氣加薑桂陽氣虛敗者用十

全大補加桂附亦有復生者此等證候若肢體惡寒  
脉微細者此爲真狀若脉浮大發熱煩渴此爲假象  
惟當固本爲善若無力抽搐戴眼反折汗出如珠流  
者皆不治 一產婦因勞兩臂不能屈服蘇合香丸  
肢體痿軟汗出如水余謂前藥辛香耗散真氣腠理  
虛而津液妄泄也先用十全大補湯加五味子補實  
腠理收斂真氣汗頓止又佐以四君子調補元氣漸  
愈用逍遙散大補湯調理而痊 一產婦先胸脇乳  
內脹痛後因怒口噤吐痰臂不能伸小便自遺左三  
部脉弦余謂此肝經血虛而風火所致不能養筋先

用加味道遙散治之臂能屈伸又以補肝散六味丸  
諸證悉愈 一婦人發瘕遺尿自汗面赤或時面青  
飲食如故肝脉弦緊余曰此肝經血燥風熱名瘕也  
肝主小便其色青入心則赤法當滋陰血清肝火遂  
用加味道遙散不數劑諸證悉退而安 一婦人產  
後血風患此以小續命湯數服而安

產後因虛傷風瘕癰同傷寒表證未傳入裏宜服防  
風湯

防風湯 治風虛發熱項背拘攣關節不隨恍惚狂  
言來去無時不自覺悟亦治脚氣緩弱甚効此藥

溫和不虛人

秦艽

去苗土

獨活

去蘆

麻黃

去節

半夏

湯洗柒次切片

防風

去蘆各貳兩

升麻

防已

白朮

石膏

煨

芍藥

白者

黃芩

甘草

當歸

去蘆

遠志

去骨

人參

去蘆各壹兩

右爲粗末入半夏片令勻每服肆錢水貳中盞生

薑柒捌片煎至壹盞去滓取清汁陸分入麝香末

少許食後臨卧帶熱服

海藏愈風湯

卽華佗愈風散

交加散

卽當歸散並見產後中風

增損柴胡湯 治產後感異證手足牽搐涎潮昏悶

柴胡 叁錢

黃芩 壹錢 貳分

人參

甘草 炙

半夏 各壹錢半

知母 壹錢

石膏 貳錢

黃芪 貳錢半

右咬咀分二服水貳盞薑叁片棗貳枚煎捌分不

拘時服

秦艽湯 前證已去次服此藥去其風邪

秦艽

芍藥

柴胡 各壹錢 柴分

甘草 炙壹錢 叁分

黃芩

防風 各壹錢 貳分

人參

半夏 各壹錢

右爲咬咀分二貼每貼水貳盞薑叁片煎捌分食  
遠服

拘攣

大產後中風筋脉四肢攣急者是氣血不足臟腑俱虛月內未滿起早勞役動傷臟腑虛損未復爲風所乘風邪冷氣初客於皮膚經絡則令人頑痺不仁羸乏少氣風氣入於筋脉挾寒則攣急也

薛肝屬木

而主筋前證若肝經風熱血燥用加味道遙散如不應當用六味地黃丸以補腎水經云風客淫氣精乃亡邪傷肝也仍參前雜證諸風血方論治之 一產婦筋攣臂軟肌肉掣動此氣血俱虛而自熱也用十全大補湯而安 一產婦手麻服愈風丹遍身皆麻

神思倦怠余謂氣血虛弱用十全大補加炮薑數劑  
漸愈去薑又數劑及逍遙散而痊

芎藭散 治產後中風四肢筋脉攣急疼痛背項強

急

芎藭

羌活

當歸

各去蘆

酸棗仁

炒

羚羊角屑

各柒錢半

防風

去蘆

牛蒡子

各壹兩炒

桂心

赤芍藥

各半兩

右爲咬咀每服捌錢水壹大盞半煎至壹大盞去

相溫服不拘時

薛前方如未應當用八珍湯更不應用十全大補

湯

防已膏 治產後中風四肢筋脉攣急身體麻痺並  
宜用之

漢防已

去皮半斤

茵芋

伍兩

右爲改咀用酒五升浸藥壹宿取豬肪脂壹斤文  
武火熬三上三下成膏攤在紙花上貼病人患處  
以熱手不住摩膏上

此處為正文內容，因文字極其模糊，無法辨識。

不語

大人心有七孔三毛產後虛弱多致停積敗血閉於  
心竅神志不能明了又心氣通於舌心氣閉塞則舌  
亦強矣故令不語但服七珍散 薛經云大腸之脉  
散舌下又云脾之脉是動則病舌本強不能言又云  
腎之別脉上入于心繫舌本虛則不能言竊謂前證  
若心腎氣虛用七珍散腎虛風熱地黃飲大腸風熱  
加味逍遙散加防風白芷脾經風熱秦艽升麻湯肝  
經風熱柴胡清肝散加防風白芷脾氣鬱結加味歸  
脾湯加升麻肝木太過小柴胡加釣藤鈎脾受土侮

六君加升麻白芷鈞藤鈞肝脾血虛用佛手散脾氣  
虛用四君子氣血俱虛八珍湯如不應用獨參湯更  
不應急加附子補其氣而生其血若竟用血藥則誤  
矣 一產婦不語用七珍散而愈後復不語內熱晡  
熱肢體倦怠飲食不進用加味歸脾湯爲主佐以七  
珍散而愈後因怒不語口噤腰背反張手足發搐或  
小便見血面赤或青或黃或時兼赤余曰面青肝之  
本色也黃者脾氣虛也赤者心血虛也用八珍湯加  
鈞藤鈞茯苓遠志漸愈又用加味歸脾湯而痊

七珍散

人參

石菖蒲

生地黃

川芎

各壹兩

細辛

壹錢

防風

辰砂

別研各半兩

右爲極細末每服壹錢薄荷湯調下無時

胡氏孤鳳散 治產後閉目不語用生白礬末每服

壹錢熱水調下

治產後不語

人參

石蓮肉

不去心

石菖蒲

各等分

右每服伍錢水煎

逐血補心湯 治產後失音不語

紅花

赤芍藥

生地黃

桔梗

蘇葉

前胡

茯苓

防風

牛膽南星

黃連

粉葛

各貳錢

當歸

叁錢

薄荷

人參

升麻

各壹錢伍分

半夏

貳錢伍分

甘草

壹錢

右剉爲散分作二服每服水壹鍾半薑叁片煎至柒分空心服滓再煎服

狂言譫語

〔大〕夫產後語言顛倒或狂言譫語如見鬼神者其源不一須子細辨證用藥治療產後驚風言語亂道如見鬼神精神不定者研好朱砂酒調下龍虎丹

方見局方

三九作一服兼琥珀地黃丸服之一則因產後心

虛敗血停積上干於心而狂言獨語者當在乍見鬼神條求之 二則產後臟虛心神驚悸志意不安言語錯亂不自覺知神思不安者當在驚悸條求之

三則宿有風毒因產心虛氣弱腰背強直或歌哭嗔笑言語亂道當作風瘳治療當在心驚中風條求之

四則產後心虛中風心神恍惚言語錯亂當在中  
風恍惚條求之 五則產後多因敗血迷亂心經而  
顛狂言語錯亂無常或暈悶者當於本卷血暈類中  
求之 六則因產後感冒風寒惡露斬然不行增寒  
發熱如瘧晝日明了暮則譫語如見鬼狀當作熱入  
血室治之宜琥珀地黄丸及四物湯只用生乾地黄  
加北柴胡等分煎服如不退者以小柴胡湯加生乾  
地黄如黃芩分兩煎服愈雖然已上諸證大抵胎前  
產後自有專門一定之法毫髮不同如產後首當逐  
散生新然後子細詳辨疾證不可妄立名色自生新