

卷之四

瘋狗咬

瘍醫大全卷三十七

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

急救部

自刑杖湯火起至自刎縊溺魔魅等證皆彙於此部中以便檢閱參治

三木門主論

世多情不由已事出不虞受害一身重刑難免遭此極刑何求不得每致冤抑難伸足脛多成痼疾特立此門救諸慘痛惟鐵布衫一方功效非輕新增

三木門主方

秘方 生牛肉剝爛作餅四個每個納胡椒十四粒貼夾傷處新綿裹緊一夜即能步履矣

鐵布衫丸 臨審預服受刑不痛亦且保命 自然銅煅紅醋蘇木 無名異洗去浮土當歸酒洗沒藥去油地龍去土乳香去油木鱉子煅用肉各等分研細煉蜜丸如芡實大每服三丸預用白湯化服縱受非刑辱拷可保無虞

又方 狗油 飛麩兩各川烏 草烏錢五草麻仁錢五皂角刺麝香錢五肥皂去二十個煮爛二烏皂刺和飛麩

研細入上藥共搗爛作四餅先一日貼受刑處忌鐵器冷水 或加猴腦或猴頭同搗更妙

預服免痛 自然銅煅紅醋上次蛇蛻和乳香去油香木鱉沒藥無名異各等研細煉蜜為丸每重二錢臨時下酒

受刑後 獨核肥兒斤稅米斤全煮成飯去飯用肥兒搗敷 又方 黃牛肉一觔剉碎入紅銅末四兩搗勻敷

又方 生獨核肥兒 砂糖 真麝香 搗如泥蒸熟作餅貼夾傷上棉花包

夾棍傷 一出衙門即用熱童便一盆將足浸之如使冷燒紅磚兩塊淨之即熱直浸至童便面上浮起白沫其傷

盡出矣不疾不瘡 再用肥兒搗如泥入雞蛋清和勻卷傷處用草紙包裹脚縛緊三日不可動即致 內服末

藥方人中白一兩木耳一塊乳香錢五沒藥錢五懷牛膝錢三自然銅錢五共研細末再用牛膝酒煎調服三

五錢 如無末藥即用當歸尾川芎乳香獨活羌活胡麻骨碎補紅花五加皮錢一生白酒一壺煎數沸縱量飲

避風寒厚蓋出洋立愈如骨傷加土鱉蟲一枚

骨傷七和藥湯和同校

夾棍傷神驗膏 月龍仙 大黃 白蠟 各四 敗龜板 當歸 各三 松香 乳香 各二 骨碎補 沒藥 各一 川續斷 各一

傷處第二日即可行走 以上各為細末猪板油三兩將白蠟松香置在銅鍋內同猪油化開將前藥末入油調勻為膏貼於夾

夾棍軟骨神方 江仍皮 川烏 炒 存 猪牙皂 炒 存 草麻子 各一兩 飛麩 各六 狗油 半斤 共搗勻作四餅每餅

中間包真麝香二分五釐貼用刑處先用威靈仙四兩煎湯足脛浴透然後以藥餅貼上 修合時忌犯鐵器

如不用刑以半夏生姜飛麩各等分做四餅貼上即解

夾棍神方 肥皂子 水浸透去外黑皮 搗如泥如明日用刑今晚用此藥上至脚廉腿一節下至脚底板心併指甲

內處處敷勻不可有一毫空隙以油紙包好外用裹足經定其藥與皮肉一樣顏色不變用刑時一些不碍毫無

傷損用刑後以豆漿溫洗之 其豆漿須預先一日將

玉紅夾紙膏 專治杖瘡及夾棍大刑並跌打損傷如神 乳香 油去 紅血竭 沒藥 油去 白兒茶 湖腦 各一 銀珠 各一

銅絲 嫩松香 研細末 草麻仁 肥大者去皮膜四十粒 和上藥再乳或膏如杖瘡用夾連油紙一張

用木尺裁九寸五分長一尺一寸寬折過來一面用針戳孔一面攤膏於上合蓋夾膏於內以有孔者者肉貼之

外用桑皮紙包好再用裹脚繩緊為妙貼一伏時揭下用後開洗為洗拭乾淨再將膏拭淨仍用原膏貼之至重

者不過三次全愈 如受大刑亦用夾連油紙雙折四方塊亦如前法碎刺孔眼一面攤膏貼上用新棉花包裹

再用裹脚纏好或五六日一換此膏從攤旋貼膏用蓋碗收貯勿令洩氣如乾難攤以滾水滾開攤忌鐵器忌火

洗刑杖法 白木 藏靈仙 秦艽 五加皮 當歸 漢防己 紅花 川牛膝 羌活 甘草 劉寄奴 宣

木瓜 獨活 廣三七 白芷 防風 各二 煎湯洗後再貼玉紅夾紙膏

夾棍方 如真遇冤枉者可送此藥救之功德無量 生肥皂 各六 真猴骨 一兩 活鯽魚 大者二個 沒藥 油去 乳香 油去

生半夏 各五 老生姜 各五 麝香 各三 生慈苳 共研勻做成四餅貼於兩足拆揭上一夜天明即去如不受刑用甘草

四兩煎濃水趁熱洗一二次即解

杖瘡門主論

東醫寶鑑云杖傷大槩通滯血皆以酒引蓋血滯則氣壅於氣壅於則經絡滿急經絡滿急故腫且痛凡打撲著肌肉必腫痛者以經絡傷氣血不行故如此

申斗垣曰叫號傷氣忌痛傷血亦有血奔心而死者亦宜用熱尿灌之

從去

種杏曰凡杖畢必用童便好酒各一鍾合而溫服免血攻心甚妙仍用葱白搗爛炒熱酒枝處冷則易止痛散血神

馮魯瞻曰宜用紫荆皮乳香沒藥生地大黃黃柏之類

編案

朱丹溪曰黃柏生地紫荆皮皆敷杖瘡之要藥也若血熱作痛宜涼血去瘀血為先加血竭紅花更佳

心法

八門云凡杖瘡急乾黑陷毒氣攻心恍惚煩悶嘔吐者死

陳實功曰杖瘡已破肉者以清涼膏敷之瘀腫即消未破瘀血內攻者用針放出內蓄瘀血再用大成湯下之便通

自愈如傷處瘀腐已作疼痛者玉紅膏搽之自然腐化生新而愈至於辱刑重刑難受之時宜預服鐵布衫丸方得保全身家命也

正宗

陳遠公曰腿受官刑皮肉腐爛免血未散疼痛呼號是宜用膏藥末藥外治為佳受刑深重不急內消專恃外治則

道遙膜外安能衛心使惡血不相犯乎故內治宜速也世人外治之方多有神奇而內治之方絕無應驗往往多一

時心亂而死者雖犯法遭刑其中情真罪當者固多而受冤遭陷者更復不少冤氣在心則肝葉開張肝氣填急尤

善引血入心使無辜之人一旦輕免固非醫人之罪而治之無法是誰之愆歟予得一異方凡受官刑即時煎服

後用膏藥末藥內外兼治瘡口易愈必無性命之憂矣衛心仙丹大黃紅花丹皮木耳各三錢白芥子二錢當歸生

地各一兩桃仁三十粒水煎一服惡血散矣不必二劑再用膏貼之名護心仙丹大黃白蠟敗龜板當歸一兩三七

根乳香沒藥各三錢骨碎補松香各五錢麝香五分為末先用猪油一兩同白蠟松香入銅鍋化開再下各藥拌為

膏貼傷處外用油紙包裹以布扎住輕者一張重者兩張足矣如夾棍重傷不須四張即可行步二方至神至奇同

方便惡血盡散外方便免肉速生合而用之何至損命嘆醫治之無術耳

永鑑

杖瘡門主方

杖瘡珍珠散 兼治一切刀傷斧砍敷上立即止血飲口腫毒久不收口者掃上立即生肌收口 珍珠入生肌內

起等藥時乳香油海螵蛸琥珀象皮炒龍骨沒藥蛤兒茶輕粉各一八兒竭研細磁瓶密貯舉世

製油紙法桃枝一寸長四十九段麻油四兩熬至枝枯撈起黃蠟四兩鎔化乘熱即裁厚綿紙長闊四五寸或厚

皮紙把油取起出火氣聽用凡枝後用刷桿挑數前製末藥於枝處將油紙貼上再用尋常油紙蓋之外用新

布裹定一日一換藥紙每次只用藥五六分不過數日設若枝瘡已經見水過須倍費時日也用此藥必須製油

紙否則收口過速恐留餘毒也

散腫止痛膏嫩松香順化流樟麻仁順化湖腦一礞珠飛銅綠水先將松香用重湯煨化再入四味調勻

用陳油紙過攤貼枝瘡不可見水貼上孔緊又方生大黃末紅糖調敷候乾溫湯洗去又敷數次大

有散血止痛之功又方凡枝後即用童便和好酒一盃飲之以免血氣攻心外用熱荳腐鋪在枝傷處氣熱

如蒸腐色發紫後易之候紫血散盡轉淡紅色為愈又方韭菜搗爛敷之又方陳石灰為末水調敷額

掃上又方鳳仙花連梗葉搗敷又方荳腐煮透拌黃柏細末搗敷又方細磁片搗極細末麻油調敷立時

止癢又方劉寄奴錢馬鞭草錢研細蜜調搽潰者乾捺

棒瘡皮破辟瘡草葉搗爛敷上紫住即愈

散瘡止痛膏凡枝後皮肉損破紅紫青斑癰腫疼痛墜重者用如意金黃散一兩加樟冰三錢研勻用白石

灰一升水水二碗和勻候一時許用灰上清水傾入碗內加麻油一半和勻用竹筍百轉自成稠膏調膏為稀稠

得所聽用枝後帶血不用湯洗將藥通敷之紙蓋布紫夏月一日冬月兩日方用慈湯淋洗乾淨仍再敷之痛

止腫消青紫即退傷重者另搽玉紅膏完口又方臘猪油七黃蠟每湖腦二白蠟輕鉛粉鉛五

沒藥去冰片分乳香去先將猪油二蠟化開再入各末調勻貼油紙用甘草湯煮熱揉軟熱湯燉化攤

貼凡棒瘡破爛至重疼痛者一日換一張三日全愈一方猪油二兩湖腦一兩白蠟黃蠟各七錢五分輕粉一

錢瘡膏冰片各三分無乳香沒藥鉛粉

杖瘡爛下肉至重者都門內官傳木耳水泡搗爛敷在爛處即止痛生肌

鬼代丹受杖不痛故名無名異木驚子油自然銅次地龍去乳香去沒藥去草烏各等分地上燒

此藥在內入學為末蜜丸彈子大每服一丸溫酒化下 凡用此丸可先用出過蟻的蠶繭子燒灰二錢為末酒調下再服此丸如服過此丸不曾遇責可用牛膝甘草煎湯服之即解

乳香散 枝磨神效 全當歸 自然銅各五錢 茴香錢四 滴乳香油去真沒藥三錢 研細每服五錢溫酒調下

寄枝散 未打之先取白蠟一兩細切入碗內滾酒泡服則雖打着不痛

杖傷 秘方 久爛中有四五分深潭不能收口者 血竭錢硃砂 輕粉各二錢 白蠟錢五 共為細末搽上一日夜其肉

杖後 四圍生起兩日即可平 又方杖後腫痛 雄黃兩蜜陀僧錢五 研細調敷極妙

仙傳膏 杖後重傷免血鬱結逆不食並夾傷內爛貼之可以起死回生 輕粉 血竭錢三 樟腦錢二 冰片錢三 麝

香分沒藥 乳香錢五 各一 共研極細用豬板油一兩二錢黃蠟一兩同化調約成膏攤貼患處晝夜流水即

時甦醒 又方滑石大黃赤石脂各等分研細蜜調敷 又方梧桐樹根晒燥炒黃研細重者一錢輕者五分好

酒冲服

湯發火傷門主論

湯發火傷



湯發火傷門主論

申斗垣曰火之為用性最猛烈萬物頃刻成灰何況人之皮肉經此灼燬皮焦肉捲苦痛難熬輕則成瘡重則致死百計千方難免其苦特選奇方以救湯火中傷之苦竅 又曰滾湯沸油熱粥失誤常遭其害

今人皮膚肉爛 又曰每見貧人烤火禦寒感令火氣入肉成瘡作痛出汁宜製柏散加蘇荷末搽入 陳實功曰但凡水火之氣當分其勢而利導之切不可驟用冷汁淋漓涼藥塗敷熱毒得冷更深入骨難痊設令寒涼一通火毒歸心殺人更速証 又曰此患原無內症皆從外來也有湯火熱極逼毒內攻又有外傷寒涼激毒入內外皮損爛者用清涼膏等約塗之如毒氣入內煩燥口渴二便秘澀者下之胞破珍珠散搽之紅 錢青輪曰湯火傷飲冷水者必死浸凉水必爛至骨研 澄曰凡被火傷悶絕者急用輪迴酒或重便灌之或溫水和蜜灌之甚則用酒盪

熱入浴缸內令被傷人浸酒中極重不死 若發熱作渴小便赤澀用四物湯加連翹梔子甘草滋陰養血以消其毒 若傷處死肉而不作痛者用四君子湯加當歸川芎黃芪健脾養胃生肌其毒 若傷處死肉不潰用八珍湯加白芷補氣排膿如不應加肉桂如不做用四君子湯加當歸川芎黃芪健脾養胃生肌不應加炮姜 若小兒被傷目眩頭痛用四君子湯加山梔當歸川芎健脾清肝火 若食後被傷腹脹作痛用四君子湯加山梔神麴山查壯脾胃以消之此乃準繩不可更張至要也

醫鑑曰凡被四樣煙薰死者白蘿蔔搗汁灌之即甦醒是其平能散氣也

澄曰凡被火傷之人宜用羌活一兩煎服俾火毒得汗外泄庶免內攻

湯治火傷門五方

雷真君逐火丹 治無意之中忽為湯火所傷遍身潰爛與鬼為隣服之可以變死而生 當歸白茯苓黃

芪 三 大黃 生甘草 五 荆芥穗 黃芩 防風 三 水煎服一劑痛減半兩劑痛全減三劑瘡口全愈此

至聖至神之方也 又方蛤蚧火蝦研細麻油調如稀糊用鷄翎掃上如冰至重者二三遍全愈疤痕全無忌

酒如吃酒必作痒抓破有痕 又方用雞蛋黃炒出油調竹蛭虫屑搽之

火瘡疼不可忍 生大黃 黃連 黃柏 黃芩 白芨 等 研細末麻油調搽 又方先用好酒洗之再用鹽

敷則肉不壞如皮塌者用酒熬牛皮膠敷之如遍體傷者用好酒滿浸濕則易之可保火燒不死 又方菜油

一碗浸一刻即不痛兩三日便褪皮如不便浸頻塗之 又方先用糯米漿雞翎掃上後用劉寄奴研末搽上

不痛且無疤痕 又方陳年白螺螄殼煨研入輕粉和研濕則乾搽不破清油調搽 又方白芝麻殼燒存性研

細敷之若患處乾燥則用麻油調搽 又方丹參半斤羊油二斤煎三五沸濾清塗之 又方菜豆粉 榆皮麩

輕粉 等 研細麻油調搽濕則乾搽 又方先用蠟酒冷洗以拔其毒再用煮熟雞蛋十餘枚去白取黃炒焦

黑取油一盞調生大黃細末二兩搽之 又方當歸 生大黃 等 研細麻油或蠟燭油搽之 又方 白蠟

三 臘黃 一 兩 用瓷碗一個生薑擦過黃土和泥塗之碗不能碎放火上將蠟溶化臘黃提如豆大同熬如炭形

為度將臘黃抹去蠟熬如飛黃色然後加麻油三觔煎勻收貯調搽之

麻黃膏 雄豬油四兩斑貓膽三錢蘇子一兩研細麻黃一兩大楓子一兩先將猪油化開下斑貓煎數沸隨去斑貓

再下麻黃煎枯濾去渣將大楓子蘇子和勻攪搽 又方大黃 朴硝各等 菜油調搽取肉得鹹則堅寔且

解熱毒也

湯火傷已發泡者解熱毒為主 蛤蜊殼煅蚌殼煅生石膏 大黃各等研細香油調搽取其熱勝寒也

湯火傷並治挂口燒傷敷上須臾水出流水則吉反此為凶 榆樹根白皮研細一兩飛丹二錢和勻并華水調

敷或冷水敷之 又方細茶 小麥各等 共研炒黑色存性研細末濕則乾搽乾則用麻油調搽 又方風化

石灰用水調勻澄清加麻油約油三灰水大為率調勻用雞翎掃上

黃柏散 黃柏一大塊用生猪膽塗炙酥為末麻油調搽

火燒闊絕並治狼烟煤炭毒 輕則白蘿蔔汁灌之重則用熱尿灌之 火傷並火藥傷 煤炭燒紅搗末醋調塗

湯火傷未起泡者 醬敷 又方 麪糊塗良 又方 鹽汁浸

湯火傷已破者當收濕解毒生肌為主 榆樹皮根研細麻油調敷 又方石膏研細桐油調敷痛即止熱即退

又方熟石膏東丹研勻搽之 又銀杏研末搽之 又方西瓜皮入瓷罈內埋土內化水搽之 又方冷燒酒淋

洗止痛 又方線香嚼碎敷之 又方秋葵花浸麻油塗 又方地榆研細麻油調搽或榆白皮末猪油調搽

又方酸菜葉貼之或鹹菜酒浸之 又方石膏生桐油調搽 又方鹽酒浸之 又方生大黃末雞蛋清或砂糖

桐油蜜醋俱可調敷 又方風化石灰雪水調搽 又方白頸蚯蚓糞存性麻油調搽 又方搗猪毛煅灰香

油調搽 又方扁柏葉焙研麻油調搽 又方猪板油加乾麪搗搽 又方泥漿加鹽醋塗之 又方柏子樹皮

研末麻油調搽 又方用鹽搽之 又方生大黃研細調麻油搽立刻止痛不起泡 又方絲瓜葉搗爛敷上一

日即好 又方糯米粉炒黑酒調敷熱酒煤傷神效或菜油調 又方陳麪敷滾油滾傷神效 又方大麥炒

黑研細用粥沫調搽即刻止痛麻油調亦可 又方麪皮炒黑研末敷 又方臘月猪胆汁塗黃柏炙乾為末敷

之 又方螻蛄殼燒灰麻油調搽 又方取雄雞宰熱血淋上隨淋隨效 又方生大黃切片浸麻油搽愈陳

愈效 又方用扁柏葉同冷茶搗爛敷

保生救苦丹 治大燒熱油燄及一切狗咬損傷 生寒水石不拘 研細油調塗之其疼痛立止

滾粥燄傷 錫箔過貼神效如受重傷者可吃溫香油一鍾

湯火傷 槐花炒研末油調搽立時痛止 又方爛茶葉敷

湯火傷爛見骨者丹方 百花霜錢輕粉五分 乳香麻油調搽

玄妙散 川黃連 天花粉 玄參各二錢 桔梗 陳皮 焦山梔各一錢 淡竹葉二十片水煎服 如藥不便只好

用酒溫洗拔其熱毒內服重便以護其心使火毒不內攻隨取大黃末桐油調敷即愈危者皆保無恙

秘方 劉寄奴研為細末桐油或菜油調敷其泡立消其痛即止頃刻結蓋其驗如神

又方 元眼微燒灰為末真桐油調敷數次即愈 又方生蘿藦搗爛敷之甚效

火燒爛神方 月鵲仙 狗骨煨成灰為細末麻油調敷其神效無比

燒爛神方 鉄銹花磨水塗之神效 又方 大黃二貫仲 黃柏各一兩 共研細末用熟雞蛋黃數個入鍋內炒

出油調敷三五日全好無疤

湯火傷 老松皮去外皮及生大黃各等 研細末生桐調如稀糊搽上即出熱氣隨手其泡自消

湯火傷 狗油熬老敷患上隨乾隨敷 又方燕脂濕寒水貼患處貼後水乾即用涼水滴臙脂上立即止痛不起

大燒 人糞瓦上焙枯黑為末香油調搽

大燒滾湯起泡 陳蔞麥麴打糊樣上立止疼痛結靨

火燒湯滾粥盪油盪奇方在懷書 平日泡過茶的茶葉剩下的茶脚不拘甚的粗細的茶葉用瓦罇一個放朝北

地上日透張在罇內聚之已滿用大磚一塊蓋好須得一年用之方妙愈陳愈好凡遇上症不問已潰未潰搽上

即定痛結疤第一驗方也

湯火所灼 暖灰水和敷並用灰汁洗 又方 黍米炒六麴 研末雞蛋白和塗 又方 柳樹白皮切

細同猪油熬塗 又方柏樹白皮切細全全猪油熬塗 又方小便清洗 又方苦酒和雄黃塗

湯火灼已成瘡 白蜜塗上取竹膜貼之 又方鷄蛋白塗 又方豈醬汁塗 又方柳樹皮燒灰敷 又方猪油

和米粉敷

又方狗毛碎剪煨皮膠和之遍封傷結痂自落

又方新熟牛糞塗

又方石膏細末搽之

又方

白薇末搽

又方陳石灰水和敷乾則換敷

又方生芝麻搗如泥厚敷

又方地榆末同鷄蛋清調搽

又方

滾湯煎膏所傷潰爛

丹參切細羊油熬膏敷

又方生芝麻搗如泥厚敷

又方地榆末同鷄蛋清調搽

又方

新牛糞和鷄蛋清塗止痛不爛

湯火傷

生梨搗碎敷

又方猪油大黃頭髮全熬清冷塗

又方絲瓜葉陰乾為末麻油調搽

湯火燙

治不從後得此方始愈以厚劑始提此奇方

平時收老黃瓜不拘多少厚寔瓷瓶收貯藏暗濕處自爛為

水塗傷處立止痛不起泡

又方狗血塗

又方油餛子燒存性研末入真香油在乳鉢內研糊塗

爆竹炸傷

急取鮮柏枝搗和香油調敷

湯火傷

王御臣

傷時人皆倉皇無主切不可用冷水澆洗如一時製藥不便先飲童便一碗或生蘿蔔汁一碗用

後鷄蛋數個每打打一孔滙取蛋清入碗內用筋調成清水用鷄毛蘸掃傷處每次掃六回每日掃六次止痛消

腫退熱生肌無痕

又方陳石灰

亦可

不拘多少泡水中候灰澄清取水和小磨麻油調勻如蛋清一樣用鷄

翎掃患處外用兔毛貼上若乾後沾實則不必揭動如不沾再掃貼

又方熟鷄蛋黃置石銀器中熬油調糊粉

搽

又方楊梅樹皮及根燒存性香油調敷

又方冬月收頭一次雪水至夏月拾西瓜皮泡雪水內封貯臨用

頻洗傷處其神效驗甚速

又方梨肉切片貼止痛不爛

火燒

驚甲燒灰香油調搽

又方西瓜皮煨為末雞蛋清調搽

共為末用蜜調勻塗患處立刻止痛好後無痕

神仙一把抓

治湯火傷並杜瘡

黃丹兩潮腦鈹

共為末用蜜調勻塗患處立刻止痛好後無痕

金瘡門主論

陳寔功曰大凡金瘡血出不止若素怯弱者當補氣若素有熱者當補血若因怒當平肝若煩渴昏潰當補脾氣若筋攣搐搦當養肝血若投藥不應當用地黃湯以滋腎水忌見風及止血服傷筋等味其人若渴務要急者宜進乾燥並肥膩等物以止渴切不可食鹹過飲漿水稀粥凡犯之則血動溢出殺人如喜怒哀憂愁大言狂笑思慮房勞暴躁勞碌酸鹹糟油熱羹一槩禁忌雖愈仍忌可服黃芪六一散八味地黃丸可保無虞

正宗

程山齡曰刀或銳鋒割損淺者皮破血流而已深者筋斷血飛不住皮破者福緣散接之止血定痛筋斷者天下第一金瘡藥敷之筋骨俱斷其人面色必黃外避風寒內忌冷物如失血過多者獨參湯補之此外別無他方針脈經云金瘡血出太多其脈虛細者生寔數大者死金瘡出血脈沉小者生浮大者死 研瘡出血兩石脈來大者二十日死 研刺血出不止者其脈止脈來大者七日死滑細者生如脈病不相應故死 病源云金瘡腸斷者視病淺深各有生死賜若一頭見之者不可連之也若腹痛而其氣短不得於飲食者大腸一日半而免小腸三日而免其腸若兩頭見者可速連續之先用針線如法連續之斷腸便急取雞冠血塗但其際勿令氣泄即時推納之然其腸出而不斷者作大麥粥取汁洗腸以清納之且作粥清稍飲之二十餘日乃吃糜粥待百日之後乃可將粥進之耳

靈惠云金瘡失血其人當苦渴然須忍之常令乾食可與肥脂之物以止其渴又不得令飲粥則血溢出殺人又忌嗔怒及大言笑動作勞力及食鹹酸熱酒熱羹之輩皆能使瘡痛衝發甚者即死 聖惠云凡金瘡傷天窗眉角腦後臂裡跳脈脾內陰股兩乳上下心鳩尾小腸及五臟六腑俞皆死處又破腦出髓而不能言語戴眼直視喉中沸聲口中唾出及其左右兩手妄舉者俱不可治之 得效云金瘡出血虛細則宜寔大則傾 又云傷雖淺命脈虛促可慮傷至重命脈和緩永無虞也血出甚者脉不要洪大只要平正重寔 又云壯破腸出在外若腸金斷難治不斷者可治腸及肚皮破者麻纒為線或桑白皮柴茸為線用花蕊石散敷線上從裡縫之腸子則用清油搽活放入肚內乃縫肚皮不可縫外重皮留皮開用藥糝待生肉 又云傷破肚皮腸與脂膏俱出先用湯藥加活血散佛手散與服用手摩去膏此是開肉放心去之後推腸入內用線縫之仍用通利藥勿令二便秘澀 正傳云凡金瘡其折傷墜墮內損者必有瘀血停積先宜遠去瘀血若其亡血過多則宜調養氣血為主用花蕊石散膏命散鷄鳴散導滯散破血消痛湯復元活血湯皆可選而用之

金瘡門主方

天下第一金瘡藥

治山

治刀斧傷損並跌撲打碎敷上立時止血定痛更不作膿勝於他藥多矣

雄猪油一兩

黃臘各六

乳香各六

血竭

免茶各一

銀粉各一

樟冰各一

冰片

麝香各六

沒藥各六

以上各研

去油

以上各研

去油

以上各研

去油

以上各研

去油

以上各研

去油

以上各研

去油

以上各研

去油

以上各研

極細先將猪油松香黃蠟三味熬化濾去渣待後冷用餘藥末調勻磁器收貯不可泄氣 又方松香不拘多少將淡河水滿鍋滾透煮之撈起扯拔浸冷換水又煮又扯如此九遍煮去苦水復用銅鍋溶化傾入冷水中不必扯拔待冷又化如此三次揀淨松香十兩加去淨油乳香沒藥各一兩研細和勻敷傷處絹帛縛紫龍止血止痛續筋生肌不膿不潰跌打損破亦效忌酒魚豆腐糟菜 又方用魚膠洗淨用麻布包裹煮爛絞出乘熱加乳香沒藥去淨其油各二錢又用銀粉六分共搗勻和取青布一幅用針釘在新板上將竹刀刮藥攤在青布上候藥布俱乾用瓷器收貯量傷處大小將藥布入滾水泡軟移攤於青絹之上貼上傷處能止血止痛如將愈之際有一眼仍用前藥泡軟納瘡眼中即斂收瘡口矣

金瘡並陽症腫痛

用大粉草入青竹管中油灰塞竹管孔立冬日放糞缸內立春先一日取起豎立陰乾破竹取

甘草研細金瘡乾者水調敷濕則乾搽熟毒瘡毒內服均妙 又方白松香研細將傷口用手擠合厚

敷之布緊緊不怕風不怕水旬日即痊 又方鉛粉乳香化風化石灰 沒藥 枯礬 研細

方元眼核剝去外黑皮陰陽瓦焙研細末乾搽奇驗 又方蘇木煎湯重便沖服 又方萬草根煎湯重便沖服

又方澤蘭葉煎湯重便沖服 又方紅花煎汁重便沖服 又方真白龍骨研細搽之血即止 又方海螵蛸研

細搽血立止 又方金毛狗脊毛是傷上 又方不拘新舊蠶絲綫網以及舊袍帽俱可燒灰搽之 又方晚蠶

砂為末搽之外用絹條束緊止血生肌 又方陳年戴油舊毡帽邊煨灰搽或搽亦可 又方白芍藥一兩炒黃

研細末酒調服二錢止痛 又方白蠟末填滿傷處布帛裹定三日即愈 又方用寒水石研為細末敷之傷處

其止痛最速 又方用桑樹皮中的白汁塗之於傷患止血 又方盧子嚼爛敷上血立止且無他患跌撲更效

又方生五倍子為末乾搽血出不止者神效 又方半夏鬱金風化石灰各等分研末搽血立止 又方用陳石

灰同韭菜搗爛陰乾研末搽之 又方用桑葉陰乾研為細末敷如急用焙乾亦可 又方用陳舊毡帽煨灰為

末同香灰攪勻搽 又方用初生小老鼠同石灰一處搗勻陰乾搽之 又方輕用血竭研為細末搽之血立止

生肌 又方用劉寄奴研為末者搽之於傷處並治箭傷 又方用黃丹白礬共為極細末搽之血立止 又方

乾蓮蓬煨末搽 又方聖惠堂蠶蛾炒研末敷 又方烏木槌研末搽 又方花蕊石硃末搽 又方天南星研

末搽

未搽 又方獨鼓大栗研乾末搽 又方百草霜研細搽 又方古礦石灰末搽 又方紅絨殿灰搽之 又方

青石研為細末搽之 又方半夏研末搽之 又方小麥磨麩乾搽 又方驢屎煨存性研末搽之血立止如不

及煨即用潮的亦妙 又方柞香節 五梧子五廣三七研極細搽之止血定痛箭傷亦妙 又方臘月

牛胆入風化石灰懸挂風頭避陰處候乾去胆皮將石灰研細敷 又方 五梧子柞香節研勻

搽於傷處用布扎定

刀傷斷指臂者俱可接整 柞香柞香荔枝核荔枝核 先將傷斷處接端正取極細末香油調敷數日後骨肉自生

金瘡並磕損折傷血出痛痛不止者 蔥白砂糖等研勻封之其痛立止更無疤無痕

刀傷折傷蔥熨法 先飲童便酒後用蔥炒搗爛乘熱包縛傷上冷則易之

金瘡毒刺疼不可忍 葱一大把水三升煮數沸清洗傷上其痛即止

金瘡久不收口者 出過鷄的蛋殼內嫩皮連血用陰陽瓦焙黃研末麻油調搽濕則乾搽

金瘡跌打瘀血內攻腹脹 劉寄奴 延胡索 骨碎補三毛 水煎加童便沖服

刀斧砍斷筋 金錢花葉根莖去土淨搗自然汁滴瘡口中將渣敷上不過半月斷筋自連

刀斧所傷以及跌破頭顱者 霜降後三日取鷄冠花葉洗淨入滾水內投過撈起青布包裹過一夜次日早晨用

線穿挂無烟薰日炙之處陰乾刷去灰塵研末加水片少許密貯乾搽

五金所傷並竹木刺誤犯人神所在之處血流不止者 上身被傷血流不止急用銀一錠燒紅塔傷處如其下身

被傷血流不止者急用鐵一塊燒紅塔傷處其血立刻即止此乃急救之良方也

刀斧傷甚 真柞香真柞香鋒刮下研極細末搽上次日結膿如鐵 又方 膝黃五研白蠟五研入麻油化膏冷定搽之

又方多年陳石灰一觔生大黃一兩炒黃色除去大黃只用石灰研細搽傷上布紮自效 又方 真廣三七

煎湯洗之其血立止 又方 白膠香 白芷 老松皮 血竭 研細末敷之 又方 黃丹 滑石

研末數月薄荷葉貼一日一夜用藥水湯洗自效

金瘡傷至重者得效 海味中鹹白鯨皮片鋪在傷處用帛扎定其血立止

下盤室磨不合入門

取所割勢大瑕為末酒調服之昔有一人自割其勢磨入不合用此方不數日而愈

金瘡及諸重傷痛悶欲死入門

取牛一隻剖腹納其所傷之人於牛腹中浸熱血中可以甦醒如傷腹用血竭末

醋湯調飲出血而愈或戰陣砲矢所傷血流滿體氣貫胸膈悶絕者亦可甦醒耳

重傷昏絕不省人事丹心

用熱尿多灌其雖昏絕亦當即為甦醒然重尿尤妙

活血散入門

治刀鎗傷腹裂腸出者當歸川芎黃芪白芷續斷赤芍鹿茸細辛黃芩

附子各等

研末每三錢酒調服每日服三次立時效驗如神

花蕊石散

治一切金刀砍傷及打撲損傷牛馬咬傷或至死者急於傷處搽其血即化為黃水若再服藥便活

更不疼痛如臟腑有瘀血內損煩悶欲死服此藥則化為黃水或吐或下泄出花蕊石而硫黃而為末入瓦

罐內鹽泥固濟晒乾安四方磚上用炭火從巳午時煎至經宿候冷取出研為細末每服一匙童便入酒煎熱服

奪命散得效

治金刀所傷及從高墮落木石壓損瘀血瘀積心腹疼痛二便不通水蛭在尿少大黃黑牽牛

二兩各

右為末每取二錢熱酒調下過數時無效再用一服下惡血

導滯湯聖

治金刀跌撲大便不通壅滯欲死大黃兩當歸五錢麝香少為末每三錢酒調服

金傷散

治一切金瘡重午日早朝使四人各出四方採草木莖葉各半把至午時入石灰一觔全搗極爛

大桑木三兩株作孔納藥實藥用桑皮及蔽之油調石灰密塗之勿令泄氣更以桑皮填固至九月九日午時取出

陰乾百日搗羅為末如遇傷用此藥搽之神效

刀傷

銅匠剗下黃銅細末再入乳鉢內乳細搽之立合

金瘡出血

龍骨錢二乳香油法沒藥油法白礬半生無名異各一五倍子半生共為細末乾搽不作

膿不怕風立時止血住痛生肌

金瘡神方

松香油法松香入在新時雨晚大內坑生半夏等研為極細末搽之有力

者宜預服濟世神驗無比

又方真降香切片上荔枝核血竭等為細末敷患處即刻止痛作痒不

三日金愈雖斷指亦能續也神驗

又方荔枝核燒灰存性為細末填傷口一夜即平復又方抹淨刺下黑髮

數酌洗淨油膩乾將鮮竹筒取一段打空一節將髮裝入極緊用木塞口黃泥封攻於微火灰內煨一夜存性打開髮成粉矣收貯瓷瓶之內如遇刀傷敷之神驗之極 又方端午午時採取葦葉陰乾揉成絨裹上即定痛止血

刀斫斧傷肉落 人指甲陰陽瓦焙研細末密貯凡遇所傷將來搽之以肉合上急用扇子急力扇之即合 若傷

口深大又不宜扇風恐成破傷風些小刀瘡此方頗驗

刀傷 琥珀末搽之 又方一人因臂裂爪甲指拇索金瘡藥裹之其痛不止即取葱白入糠火煨熟剝皮切開其

中有涎如涕取搽損處仍多煨取接續易搽凡三易之血止痛消並潰良方也

刀傷湯火跌打斷筋損骨 蘇油熟冬月用油上兩錢白蠟一兩膠黃五錢不住手調成餅塗搽

刀傷 熊胆和水調搽傷處立刻止血定痛不作膿

刀破手 錫蓋屑刮下搽

刀傷 圖書店滑石末搽之 又方生大黃炒黑研細搽 又方堅實細炭 老松香等 研細用韭菜汁拌陰

乾再研細搽之如急用則不用韭菜汁拌亦效

夾剪斷指 蟾蜍窩纏指上包煖即好

刀斧傷並跌打流血不止 何首烏研細搽搽上使血歸經

金瘡跌打血止定痛 乾荷葉研末搽即能生肌

刀瘡雖作膿亦效 老松香 川大黃錢一共研細末乾搽

弓箭烏槍傷門主方

弓傷全時突出並治打傷眼珠腫痛 急用手揉入勿見風取精豬肉切薄片微在熱鉢上候肉熱

箭頭入肉 蟋蟀十個去殼土狗雌婦人髮同研如泥厚塗之用兩手搓之則其箭頭自出

箭傷 三七根三錢好酒煎靈一宿服之即愈

中毒箭 急飲麻油數碗其毒自解 又方藍汁一升飲之並淋傷上若無藍汁用青布清水絞汁飲並淋傷上

針刀箭鏃折在肉裏 杏仁嚼細敷之 又方象牙屑和水敷之 又方瓜蒌根搗爛敷每日三易

箭頭入肉 推糞蛇蟻一個搗如泥煎湯頻洗傷處自出 又方 陳臘肉去皮骨搗爛 人指甲 象牙銼三 研細入臘

肉搗勻敷於四圍即出

鉛子入肉 水銀灌傷處鉛即化傷處從水銀流出

箭傷 劉寄奴研為細末搽之 又方 婦人月經或月經布塗於傷處亦可

箭鏃及金刃中骨脈不出
白蘞 半夏各等 右為末用淡姜湯調服一錢日三次二十日即出 又方聖惠

蜈蚣取汁塗上自出 又方 鼠腦塗上自出 又方 好瓦石著上自出 又方 搗鼠肝或鼠腦塗之即出

毒箭 煮糖汁飲 又方 搗生葛根汁飲 又方 雄黃研敷

鉛子入肉 吳天序
用麩和作團團受傷處用白芨菜搗爛納團內不過三四次其鉛子立即自出或用蜂蜜沖好

酒服儘量飲醉亦出

箭穿耳並割耳 用熱馬糞敷之於上其亦可以止痛針入肉門主方

驗方 搗推屎蛭螭蟬殼之自出 又方螭蛄腦子全硫黃研細調敷用綿紙貼定如覺痒時其針自出內服棗仁末

三錢白湯調下 又方象牙磨水調敷即出 又方煮臘肉熟皮貼上針即出

針誤入肉無眼者不動有眼者隨氣血游走若走向心窩胸膈者險急用烏鴉翎數根炙焦黃色研細末酒調服

一二錢俱可

如聖膏 治針入肉 車脂葷油不拘多少研如膏調磁石末攤紙上如錢許貼之每日換兩次

醫家用針將針折在病人肉內 急用鼠腦研如膏塗之即出

竹木刺門主方

竹木刺入肉 收晚蠶蛾入竹管內塞之凡遇竹木刺戳入肉內即取蠶蛾研細和津唾調塗即出 又方 刮指

甲末同紅棗肉搗爛塗之 又方象牙末磨濃汁滴之良久自出 又方蜈蚣搗爛塗之自出如刺已出肉痛其

者亦致
又方白茅根搗敷立出
又方嚼牛膝根敷之自出
又方烏羊糞搗爛水調厚敷其刺自出
又方

抓人頭垢敷之即出

花蕊石散 治刺入肉日久血瘀腫脹 花蕊石和硫黃研之極勻細末用瓦罐貯盛之封口鹽泥固濟晒乾安風爐內上下著火煉兩炷香為度候冷打開研細收貯此乃散瘀血之神藥也

凡竹木刺咽喉中 舊象牙梳取屑研為極細末用水調服亦可

蘆葦刺入肉 生栗子細嚼爛敷之 又方鹿骨煨存性水調敷雖日久不過兩次即出 又方羊糞燥者燒灰和

脂塗之刺若未出再敷之 又方搗烏梅水和塗刺上立出 又方莧菜搗敷患處外以布裹定即化 又方牛

膝根莖合搗以敷之即出縱瘡合口其刺猶出 又方煮瞿麥汁飲日三次立出 又方溫小便漬之 又方醋

棗核燒研服之瘥 又方白茅根燒為末以膏和塗之亦主諸瘡因風發腫

狐刺瘡門主方論

申斗垣曰狐刺瘡是竹木刺發傷皮肉或手足而感痛不可忍有雌雄兩種當治分之雄者只生一個雌者生有五

七個瘡內皆有亂絲瘡外必然有刺者是也

大成書名狐狸刺蓋蛭蛭又名野狐鼻涕故名 外臺雜錄二書名狐尿刺

心法曰狐尿刺由蛭蛭感暑交媾精汁染於竹木諸物乾久有毒人手足誤觸之則成此患初起紅紫斑點肌膚乾

燥悶腫痛不眠旬日後腐開瘡口自寬宜服黃連解毒湯外用蒲公英連根濃煎溫洗之

狐刺瘡門主方

驗方 蘇紫灰 輕粉等 共處研勻乾罨於傷患之上後用米醋洗之頻頻更換之立愈

鐵棘竹木諸刺刺在肉內而不出並蛇骨刺人毒痛者 急用死老鼠股研為細末傷處敷之可也

傷水瘡門主方

凡竹木刺破皮膚或魚刺傷損後誤犯生水疼痛潰爛名傷水瘡 五倍子蛤粉黃丹等 全炒變色研乾搽

救自刎門主論

斷食額者可治斷氣額者難治 全要知覺早急急將頭扶住乘其氣未絕額未冷用絲線縫合力口將活雄雞一