

欽定四庫全書

子部

小兒衛生總微論方卷十



北京中医药大学图书馆版权所有

小兒衛生總微論方卷十

方

治自生

初生時拭掠口中穢

木香末 檳榔末 各一字

服一二九甘草水下無

時服

塌氣丸治啼哭未定便令食乳氣逆停滯心胃滿悶氣

急吐逆

巴豆

三個去皮
分為十片

胡椒

十個丁香

青橘

十個湯浸一
宿不去穢每

個入巴豆一片胡椒一個丁
香一個以麻縷纏之餘並同

右用醖米醋一碗煮藥至醋盡為度取出細切焙乾

同為細末粟米糊和丸粟米大每一二歲兒三二丸

三四歲兒四五丸飲下日三服此藥利胃焉然後復

進觀音散一二服補氣食前

和胃膏治啼哭飲乳氣逆噎塞及胃虛氣不升降胃

痞滿吐逆不時

人參

去蘆

藿香葉

去土

水銀

枇杷葉

先炙去毛

生薑

汁塗炙令香熟

白伏苓

各一兩

甘草

炙皆各半兩

肉豆蔻

麵裹煨熟

硫黃

研細入鐵銚同水銀一處拌勻於火上炒不住手研攤放冷各半兩

右同為末次將硫黃水銀砂子入之再研勻細煉蜜

和膏每一歲兒桐子許生薑棗湯化下量大小加減

亦治人翻胃服一皂子許

白附子丸治傷風冷吐逆及治糞青下瀉

白附子

一分末

蝎梢

一分研

舶上硫黃

半兩研細

右先將半夏半兩湯洗淨生為末生姜自然汁和劑
捻作餅子小錢大沸湯內煮至熟取出研成膏入三
味藥末和之如乾添少湯丸蘿蔔子大每服二三十
丸米湯或乳汁送下無時

羌活膏治傷風吐逆亦能截痢定瀉

羌活去蘆獨活去蘆人參去蘆白茯苓去蘆并防風去蘆并

肉桂去麋皮全蝎炒各一分硫黃三錢

水銀一錢與硫黃同研青色至不見水銀星子為度

右同為細末煉蜜和膏每用量大小旋為丸嬰孩大

豆許三二歲鷄頭大五七歲兒龍眼大並薄荷水化

下

托養丸治傷食吐逆心胃滿悶陰陽痞手足厥冷煩熱

躁悶

硫黃

水銀

各半兩同研
細不見星

附子

半兩炮
去皮臍

木香

半兩

當歸

去蘆洗淨
半兩切焙

大黃

一兩濕紙
裏煨熟

右為細末煉蜜和丸櫻桃大每服一粒生姜湯化下

無時

朱砂丸治驚吐不止

朱砂

乳香

各一錢

半夏

二十一個洗淨七次
薑汁浸一宿切焙

右同為細末姜汁糊丸黃米大每服五七丸乳香湯

下無時

紫霜丸治如前

朱砂

半錢

杏仁

三十個去皮尖炒黃

右同研細糊丸麻子大每服五七丸桃心湯下乳食

前

三香丹治挾驚吐逆不止

藿香葉

去土

丁香

各半兩

麝香

當門子半錢研

膩粉

半分研

半夏

一錢湯浸七次焙乾

龍腦

半錢研

右為末拌勻生姜自然汁糊和丸黍米大每服十粒

人參薄荷湯送下無時

四季散治驚吐及番胃諸藥不效者服之立驗

右以好硫黃半兩研細入水銀一分同再研至無星
如墨煤色每用一錢或半錢以生姜自然汁同酒各
半同煎用少許調藥空心服之服畢覆卧當自汗出
乃愈

集香散治脾胃不和氣虛吐逆不食漸成羸瘦

丁香 沉香 木香 白朮 藿香葉

去土

製厚朴各半 白茯苓 白豆蔻各一分

右為細末入麝香少許拌勻以水半升蜜四兩大棗十五個生姜十五片於銀器內慢火熬成膏去姜棗不用以膏和藥丸如皂子大於當風處窰乾每服一丸米飲化下量兒大小加減乳食前

人參白朮散治胃氣不和吐逆不思乳食亦治霍亂吐逆

厚朴去麤皮生 人參去蘆 白朮 半夏湯洗七次

陳皮

去白各一兩

右為細末每服一錢水一小盞生姜二片煎至六分

去滓溫服

人參藿香散治脾胃不和吐逆不定

人參

去蘆一兩塗姜汁微炙

藿香葉

去土半兩

白朮

剉炒

丁香

良姜

枇杷葉

去毛姜汁塗炙令香熟

甘草

各一分炙

右為細末每服一錢水一小盞入木瓜一片煎至五

分溫服無時去滓通口服

藿香散治脾胃氣不和吐逆心腹脹滿

藿香葉

去土

半夏麴

甘草

炙各一兩

陳皮

去白

厚朴

去皮生薑製各二兩

人參

去蘆

白朮

各半兩

右為細末每服半錢或一錢水一小盞生薑三片煎

至六分去滓溫服無時

萬安丹治胃虛傷冷吐逆

半夏

一分湯洗七次焙乾

白朮

一分附子

一個炮製去皮臍

硫黃

一分研

朱砂

半兩研飛

右三味先為末入研藥拌勻生薑汁和九黍米大
每服十粒米飲下乳食前

聖石散治如前經驗

礞石四兩炭火燒一伏時 不灰石二兩炭火燒一伏時 母丁香一兩

木香一人參去蘆 白茯苓半兩湯洗七次焙乾

真陽起石半兩先同上為末 阿魏湯化去砂石以麴和成餅焙乾一錢

巴豆 杏仁各十四個並連皮燈上燒作炭畧存性

右同勻細湯泡蒸餅和丸荔枝子大每服一粒水一

盞入姜皂子大擘破同煎至五分放溫時時服之煎藥須用銀石器

厚朴散治胃冷氣逆吐不思食

白茯苓

一兩半

肉豆蔻

麴裏煨半兩

厚朴

去皮生姜製一兩

枇杷葉

炙去毛盡

右為細末每服一錢水一小盞生姜二片煎至六分去滓空心溫服無時

人參膏治脾胃虛冷乳食不化吐逆連併不喜乳食

人參

去蘆

滑石

藿香葉

去土半兩

丁香

一分

甘草

二錢炙

朱砂

一錢半研水飛

右為末煉蜜和膏每用皂子大米飲化下無時

枳皮湯治胃冷吐逆正氣

右以枳木皮煎湯汁服之

溫脾散治寒濕吐逆

厚朴

去皮塗姜汁炙令香熟一兩

丁香

白朮

乾姜

各半兩焙

肉桂

一分

右為細末每服一錢煎人參湯調下無時

香參湯治寒痰吐逆

丁香 藿香葉去土 丁皮 人參去蘆 白茯苓各一兩

青皮去穢 木香 甘草炙各半兩

右為末每服一錢水一小盞生姜二片煎至五分去

滓溫服無時

三黃散治傷熱吐逆

五靈脂 大黃 雄黃各等分研水飛

右為細末每服一字磨刀水調下無時治熱吐尤佳

槐花散治熱吐不止

皂角

去皮燒
炆盡

白礬

枯

槐花

炒

甘草

炙各
等分

右為細末每服一錢白湯調服無時

丁香益胃湯治胃虛挾熱吐逆不止

丁香 人參

去蘆各
一兩

桂

去
皮

大黃

炮黑
黃色

訶黎勒皮

一分

右為細末每服一錢水一小盞生姜二片煎至五分

去滓溫服無時