

597

3-33

中医中药治疗 丝虫病参考资料

(内部资料 注意保存)

第一辑



58.36
15

山东省丝虫病防治所编印


1959年4月

樣本庫

B39
88

說 明

本輯共匯总了一百四十个方法，分別在各种体征的治疗中。由于時間的倉促，編写得不夠細致及全面，对于部分驗方我們作了初步試驗，但試用的病例不多，追踪時間較短，当然疗效的优劣不能肯定，只能提出近期結果，至于远期疗效及更多的病例有待今后再行补充。为了消灭危害人类健康最严重的絲虫病，使其早日恢复健康，更好的从事社会主义建設事业，謹編此集，供作参考。



目 录



第一篇	治疗絲虫病諸方	1
第二篇	治疗癩症水疔諸方	6
第三篇	治疗膏淋諸方	8
第四篇	治疗湿热脚腫、脚气、流火、腿等諸方	14
第五篇	針灸治疗絲虫病及晚期体征	20

第一篇

治疗絲虫病諸方

(以微絲蚴为主)

- 1、紅花、紫草根、小茴香、山甲片各二两
- 2、紅花三錢、苏木三錢、郁金五錢、姜黃二錢、西根草三錢
- 3、干漆六錢、血余炭六錢、血竭四錢、生沒藥六錢、生乳香六錢、全蝎四錢、大蜈蚣六条、炙山甲八錢、梅片四錢、大黃六錢、田三七四錢
共为細末每服八分每日三次，服三天后加至每次一錢
来源（省中医院）
- 4、蒼术丸：（济宁專区第一人民医院中医科）
成分：蒼术一斤、苦参一斤、常山半斤、柴胡一斤半、草果仁四两、檳榔一斤、广皮半斤、川朴半斤、丹参四两
制法：共研細末用絲瓜絡一个煮水泛丸
用法：每日三次每次三錢，三周为一疗程
- 5、漆龙丸：此方載自“江苏中医”1958年第二期。
处方：干漆10两（炒至烟尽为度），地龙一斤 蒼术一斤（土炒），共为細末，水泛为丸，綠豆大，每日早晚各服一錢五分，十日为一疗程。
此方据“江苏中医”报道共治疗絲虫病15例，微絲蚴消失率为56——84.35%。
【按】：本所用此方治疗絲虫病14例，并定期作血液計数观察，疗毕檢查血中微絲蚴較疗前增多，疗毕一个月复查，血中微絲蚴計数較疗前多一倍，无一例消失者。无結节出現，未能見到近期疗效。
- 6、“蒼龙漆雄丸”治疗絲虫病（江宁县防疫站）
藥物組成：蒼术一斤（土炒）地龙一斤（焙）干漆十两（炒令烟尽）雄黃六两（水飞）
制法：共研細末水泛为丸如茶豆大
服法：成人每服一錢五分 早晚各服一次 小兒減半（或服三分之一）开水送
疗程：一般三天即轉阴性
禁忌：蟹、虾、魚腥及生發动物等食物
适应症：血檢阳性，鼠蹊淋巴結肥大，精索粗大。
加味法：阴囊水腫配服再功散，乳糜尿配服八正散；象皮腿配服三妙丸
禁忌症：身体衰弱貧血慢性潰瘍急性發熱等症（服藥期發生寒热反应的例外）
反应：早期患者及身体强者一般无反应，仅体弱者有輕微头昏体感不适恶心食欲不香等現象，晚

期患者服藥后，間或發生寒熱淋巴腫大疼痛等反應，早期反應休息后可消失，晚期反應給服清疏散結，如薄荷、牛蒡子、姜蚕、元參、大貝、橘絡等味，外敷太乙紫金錠
藥物功用：蒼朮燥濕，健胃；地龍軟堅、消痰，通經活絡；干漆杀虫破積，雄黃為有力杀虫劑，并有解毒作用。

效果：治療31例，服藥三天后，轉陰25例，消失率80%，反應小，價賤（每人三角）。

7、鷄鳴散（准繩方）

主治絲虫病（陽性微絲蚴兼淋巴管炎）

成分：蘇叶一錢 吳茱萸一錢 桔梗二錢 木瓜三錢 陳皮三錢 檳榔三錢 生薑二錢

制法：提煉藥每日早晚各服一劑

治驗：治療患者七例療程十天，血檢微絲蚴消失者二例較原來減少90%者二例，減少50%以上者三例。

來源：江西黎川縣茶亭醫院、楊吉亞

8、四物湯加味：

成分：當歸三錢 地黃六錢 炒白芍三錢 川芎錢半 木瓜三錢 檳榔三錢

制法和用法：提煉藥每日早晚各服一劑

治驗：治療病者六例療程十天，微絲蚴完全消失者一例，減少90%者一例，減少50%者三例，增加者一例。

來源：江西省中醫驗方秘方集第三集。

9、桂芍知母湯：（兼治象皮腫）

成分：炒芍藥三錢 知母五錢 防風一錢 漂白朮二錢 桂枝二錢 附子二錢 麻黃二錢 炙甘草二錢 生薑二錢

制法和用法：提煉藥每日早晚各服一劑

來源：黎川縣茶亭醫院楊吉亞。

10、檳榔合劑：

組成：檳榔七錢 法夏五錢 花椒五錢 石菖蒲五錢 木瓜五錢 百部五錢 茵陳八錢五分

制法：上述各藥以水500毫升文火熬至100毫升

服法：第一次服100毫升，第二、三天各服400毫升，第四、五天各服600毫升，每日均分三次服用。
小兒酌量遞減。

療程：五天為一療程

療效觀察：江西省資興縣鯉魚江人民公社用此法共治血微絲蚴陽性病46人，服藥后第五天血檢陰轉率97.5%

一般無不適反應，服藥過多可出現腹瀉。

11、八味檳榔丸：

參兒檳榔15斤 煉雄黃1斤 榧子肉半斤 生牡蠣3斤 茜根草3斤 吳茱萸3斤 蘇叶3斤 木瓜半斤

制法：共研細末水泛為丸如胡椒大

服法：上午四時下午十時各服一次溫開水送下

劑量：每次10克總劑量300—400克

療程：十五至二十天

12、化虫丸加減

組成：皂角，檳榔三兩 雄黃 硃石各二兩 輕粉一錢 干漆二兩 桃仁二兩

制法和服法：共研細末煉蜜為丸成人每服三錢日二次飯前半小时開水送下三天為一療程。

13、滅蠱成

方劑成分：明雄黃一兩二錢，化吉紅一兩五錢，清半夏一兩五錢，浙貝一兩五錢，真川連一兩二錢，貫眾一兩五錢，土茯苓一兩五錢，真常山一兩五錢，大營香一兩五錢，元胡一兩五錢，川烏一兩二錢，生白朮二兩，白何首烏二兩五錢，漢防己一兩五錢，黃藥子一兩二錢，力枝核一兩二錢，真青黛一兩二錢，全蟲（去刺）一兩五錢，紫叩仁一兩五錢，橘核一兩五錢，川山甲（炙）一兩五錢，蜈蚣（隔紙炙）十四條共為極細末用。銀柴胡四兩，黃柏四兩，炒杏仁八兩，防風五兩，苦參四兩，雙花四兩，夏枯草十兩，紫背浮萍五兩，南薄荷四兩，竹筴六兩。

煉制法：以上搗成粗末以文武火熬兩遍過濾，再熬成流浸液浸入藥粉中拌勻干燥，再研細粉，每一兩藥粉加精制砒霜四分，再研極細勻，打成0.1的小片子，裝瓶中。

服用方法：體重每十公斤服半片，一天兩次服，中午飯後二十分鐘服一次，晚上八點服一次，服一星期休藥一天再服，服七天算一療程，為治成蟲之法。服兩星期後再酌加藥量。

（附注）凡服砒劑多了有頭暈、惡心現象，請酌情予以增減以資試用。

精制砒霜法：用砒霜四兩用青防風一斤加水煮一天，取出干了研細用。

方劑來源：劉惠民副廳長，山東省中醫院1958年11月14日抄。

14、滅蠱幼

方劑成分：廣皮一兩五錢，清半夏一兩五錢，真常山二兩，真川貝一兩五錢，廣玉金一兩二錢，遠志一兩二錢，銀柴胡一兩二錢，川山甲（炙）一兩二錢，黃柏一兩二錢，蜈蚣十二條，胡黃連一兩二錢，山豆根一兩，白何首烏三兩，蕪荑一兩二錢，生于朮二兩，帶叩仁一兩二錢，西紅花一兩二錢，當歸身一兩二錢，沙參一兩二錢，南薄荷一兩二錢，日女止一兩，真青黛一兩共為極細末用。

官眾五兩，香佩蘭四兩，廣合香四兩，生兔絲子八兩，紫草根四兩，雙花四兩，竹筴六兩。

煉制法：以上共搗粗末，以水浸泡一天，以文武火熬兩遍，過濾，以文火熬成流液，浸入藥粉。干燥再研細粉，每兩藥粉加吐酒石八分，再研細勻，打成0.1的小片子，裝瓶中。

服用法：每體重十公斤服半片，一天三次，服一星期休藥一天再服。六天算一療程。服兩星期後，每次服片半到二片或三片，需看身體情況為宜，此為治蠱蟲之法。

（附注）藥房同志請注意掌握，酌情增減之，凡錫劑服多了頭暈、惡心，嘔吐有中毒現象希好好掌握。

方劑來源：劉惠民副廳長

山東省中醫院于1958年11月14日抄

15 主治：足大，肌瘦，腹脹。

處方：豬肚一個，大蒜七個。

用法：清水炒吃，連服七次即愈。

16 主治：絲虫病。

處方：綿茵陳，雷丸，廣皮，榧子肉，烏枚肉，川目，熟干漆，百部，花檳榔，使君子，苡仁米，紫草茸，全當歸，郁李仁，土茯苓，皂矾，針砂，炒白朮，畢登茄，粉甘草，淮紅花，加土蜜，紅棗。

制法：（1）先將榧子去殼，取肉，大棗放鍋內，加水濃煮爛去核，然後用鋼絲篩擦勻。皂矾，針砂，干漆都要放鍋中，文火煨，存性，留備用。

(2) 將以上各藥，共同拌勻，入其它藥內，在日光下晒干，研為細末備用。

(3) 先將少許藥粉，用清水以選篇泛丸，如菜子大小，作為母丸，等晒干後，再用蜜將母丸藥擦勻，加上少許藥面子，做到邊擦邊加，最後成丸，如綠豆大。

17 主治：腳氣濕癢極痒有虫。

處方：烏血根。

用法：上藥為末，敷之，少時有涎出良。

18 適應：腎臟濕氣，攻注下部癢痒。

處方：甘遂半兩，木鱉子仁四個（為末），豬腰一個（去皮膜切片）。

制法：用藥四錢參在內濕紙包煨熟，空心食之，米飲下，服後便伸兩足，大便行後，吃白粥二、三日為妙。

19 主治：血絲虫病。

處方：麻黃，生川烏各一兩。

用法：共研末，和糯米粉作餅貼患處。

20 主治：血絲虫病疼痛。

處方：藕蕒草五錢，淮牛夕，海風藤，秦艽，木瓜，檳榔，苡仁各三錢，防己二錢。

用法：水煎服。

21 主治：血絲虫病。

處方：清明花紫兜四錢，算盤子紫兜六錢，檀香一錢五分，海馬一錢，麝香三分，豬肉八兩（用湯不用肉），鮮茅根一兩。

用法：先用文武火熬清，清明花紫兜和算盤子紫兜，再下檀香，馬海、麝香，豬肉湯，微煎，以水酒白糖沖服。

說明：有外感者勿服。

22 主治：絲虫病兼小便悶疼，氣喘面累欲絕者。

處方：桂心八分，木瓜，小茴香各七分，朴硝五分。

用法：水煎服。

23 主治：血絲虫病有癩疹大便閉結者。

處方：羌活，玉活，歸尾，防己，枳實，西莊等分。

用法：水煎服。

24 主治：血絲虫病。

處方：紫胡，赤芍，查肉，江半，蒼朮各二錢，川朴，木瓜，檳榔各三錢，黃芩，葛根，黃柏各一錢半，甘草八分。

用法：水煎服，如大便不通，可繼服小承氣湯。

25 又方：

主治：脾積黃胖。

處方：絳凡四兩，當歸四兩，酒浸七日焙，百草雙三兩。

用法：研末陳酒煮面糊丸，芡實大，每服七丸，一月後黃去病痊。

26 又方：

主治：黃胖王痘。

處方：絳凡四兩，麥芽炒二兩，川椒，炒蒼朮，茵陳各七錢。

用法：研末，棗半斤煮爛杵為泥為丸。

芡實大，每服十丸，日二、三次。

27、(31) 主治：腹內一切諸虫。屢試屢驗，其效如神。

處方：黑丑，白丑，頭末各五錢，尖兵郎一兩

用法：共研末，先飲砂糖水一盞，再用藥三錢，砂糖水調服，連服三次，其虫尽，兒減半，孕婦勿服。

驗方來源：江西省中醫藥研究所絲虫病驗方匯編

28、鑽地楓治療絲虫病：

主治：絲虫病微絲蚴陽性患者。

處方：鑽地楓蜜丸。

制法及用法：將鑽地楓研成極細粉末，每斤藥粉加蜜糖八兩，加水煎熬後拌搗，用手搓成如梧桐子大，陰干後即可備用。每夜睡前服蜜丸四錢，連服五夜為一療程，總劑量為二兩。

近期療效：其治療2人療畢一月復查陰轉率達100%。

【按】：我所復試曾用二種不同服法：（1）每次5錢，每日二次，四日為一治程，療畢查血10例，五例增多，五例減少，總條數仍屬稍高，每個患者平均條數微見增加。（2）每晚一兩，四日為一治程，療畢查血五例，4例增多，1例減少，前後條數並無變化。

29、硝磺散治療絲虫病：

主治：絲虫病微絲蚴陽性病人：

處方：硝磺五兩、火硝一斤、杉木炭四兩

服法：成人50克，臨睡前以溫黃酒沖服，小兒以每公斤0.1克計算，如要提高療效，尚可再服第二次。

療效：共治療156例，療畢1——2周復查，陰轉率為69%強，三周後復查64例，陰轉率87%強。

【按】：我所曾以此方試驗106人，療畢于第一、二、三周分別復查結果，微絲蚴條數升高的有70人，降低者31人，無變化者3人，轉為陰性者僅2人，患者平均微絲蚴條數仍有升高。

30、中藥貫眾治療絲虫病：

主治：絲虫病微絲蚴陽性病人：

處方：貫眾。其型劑有：

（1）液劑：貫眾一斤，加適量水，煎至濃液1500毫升，加適量紅糖。

（2）粉劑：將貫眾焙干，研成細末，加等量紅糖。

（3）丸劑：將貫眾粉劑用土法搓成丸子。

劑量及服法：

（1）液劑：每人（不分年齡）30毫升，在中飯或晚飯後用等量老酒沖服（小兒及不會飲酒者可用開水沖服）。

（2）粉劑及丸劑：每人（不分年齡）三錢（純貫眾量）在中飯或晚飯後吞服。

（王黃山公社曾用每公斤體重3.0克干燥貫眾煎成液劑，一日三次，二天服完的大劑量治療16人）

療效：共治療105人，療畢二周後復查56人轉陰性療效達53.3%。又一月後復查陽性病人10人轉陰性者10人，療效達83.3%。

【按】：我所曾以此方復試（採取粉劑，加等量紅糖合服後改用貫眾丸試服）。每次三錢，每日二次，二日為一療程，共治療11例，療畢查血7例微絲蚴條數增加，4例減少，總條數也增高。

（28、29、30三方系浙江省愛衛會供給）



第 二 篇

治 疗 癰 疔 水 疔 諸 方

(鞘膜积液或阴囊象皮腫)

阴囊癰之治則：此証由肝腎湿熱，下注而成，生于腎囊，紅腫焮痛，身發寒熱，口干飲冷治法如下：

- (1) 初起宜荊防敗毒散，外用葱鹽熬湯燙之。
- (2) 寒熱已退，宜清肝滲濕湯消解之。不應，此膿勢將成也。急服滋陰內托散，若氣怯食少者宜內服托里透膿湯，外用二味拔毒散，圍敷腫根。
- (3) 膿脹痛者用臥鍼針之，出稠膿者順，出腥水者險，宜內服托里排膿湯，外用琥珀膏貼之，俟腫消膿少，痛減時用生肌散，生肌紅玉膏等以生肌斂口。
- (4) 生肌斂口時，宜朝服六味地黃湯，暮服人參養榮湯滋補之。
- (5) 內服之劑：

(甲) 瓜蒌、甘草節、金銀花各五錢 連翹 青皮 柴胡各二錢，水煎服。

(乙) 皮硬厚出水者，用蒼朮 吳茱萸（炒） 川芎 當歸身各一錢、白朮 天花粉 皂桂 木通各八分 青木香一錢五分 生黃耆二錢 龍胆草五分 蛇盤果二錢（如無以草代） 白酒一碗煎、空腹時服。

(丙) 發熱口苦咽干，紅腫疼痛者用杜仲鹽水拌，炒斷絲，磨為細末，以篩揉去絲，取淨末一兩，用生酒一斤煎至一半服之。如未愈再服一劑，即消。再用生南星、蘇木、柴蘇葉、各五錢陳香橐一個，共為細末，取未落水之健豬尿胞一個，以酒煮爛化，同藥末搗勻，作餅晒干烘脆，再磨為細末，蒸餅打糊為丸，空腹時燒鹽湯送下八九或十丸。服一料后永遠除根。

(6) 外治之劑：

(甲) 囊破潰后深露舉丸者，用杉木燒灰，研細摻上外用紫蘇葉厚包之，或用紫蘇莖葉為末，濕則干摻，干則香油調敷，外用青荷葉厚包之。未潰者用干荷葉（焙）紫蘇葉（焙）各等分，研極細酒調敷赤肉上，外用油紙包之。

(乙) 蚌壳（煨） 黃連 青黛各等分研細摻之。

(丙) 海螵蛸 蛤粉 兒茶各等分研細摻之。（以上选自中国医学大辞典Ⅲ，2814—2817頁）

1、梔核丸 濟生方 功治癰疔，卵核腫脹，偏有大小，或堅硬如石。

梔核（炒）海藻（鹽酒炒）昆布（鹽酒炒）桃仁（麸炒）海帶（鹽水洗）川楝子肉（炒）各一兩 厚朴（制） 木通 枳實（麸炒） 延胡索（酒炒） 桂心 木香 各五錢，共研細末酒糊為丸，如梧桐子大，空腹對鹽酒或溫酒鹽湯送下，每服六七十九丸。

（中国医学大辞典Ⅳ，4103頁）

2、茴香丸：又名回春丸，治疝氣神效。

茯苓 白朮 山查子各一兩 枳實八錢 八角茴香（炒）一兩 吳茱萸一兩 梔核三兩 荔枝核一兩。為末煉蜜丸，每丸重一錢五分。

空心細嚼，姜湯下

3、亭蓼木香散：治疝氣外腎腫痛。

亭蓼 赤苓 猪苓 白朮各二錢半 木香五分 澤瀉 木通 甘草各五分 桂二錢半 滑石三兩，共為末，每服三錢白湯調服。

4、治諸疝及疝氣偏墜疼痛。

乳香一兩 肉桂三錢 大茴一兩 小茴 廣木香 川楝肉各一兩 沈香四錢 青石三錢 先將青石煨，酒淬三次，就將淬青石酒加葱白調藥末一錢八分，空心服。

（以上三方選自仁術便覽）

5、加減柴苓湯：証治准繩方。順氣、和肝腎，治諸疝因濕熱腫痛出水，（筋疝尤宜）。

柴胡 澤瀉各一錢 赤苓 猪苓 甘草 半夏 白朮 山查 山梔子（炒） 荔枝核各七分。咬咀，清水二盅加生姜三片，煎至八分，空腹服（中國醫學大辭典 I、693頁）

6、川楝丸：六科准繩方，治小兒癰疝。

川楝子 木香 檳榔 三稜 蓬莪茂（炮） 青皮 陳皮（均去白） 芫花（米醋浸炒）各五錢 辣桂 牽牛子各五錢 巴豆（不取油）一錢 研為細末，飛面糊和丸如麻子大，每服三丸，空腹時生薑湯送下。

7、木香楝子散：易簡方，治小腸疝氣，膀胱偏墜，屬濕熱者。

川楝子30個（巴豆20粒同炒黃赤色，去巴豆不用） 草薢五錢 石菖蒲一兩 青木香一兩（炒） 荔枝核20粒（炒）。共研為細末，每服二錢或二錢五分，入麝香少許，空腹時用茴香（炒取淨末）鹽沖熱酒調下。

8、茱萸內消丸：秘傳方，治腎虛邪襲，奔豚疝瘕，寒疝陰疽，偏大引痛，或生瘡瘍出黃水。吳茱萸

（半酒半醋浸一宿，焙干） 山茱萸（蒸去核） 馬蘭花（醋浸焙） 黑牽牛（炒取頭末） 延胡索（微炒） 川楝子（蒸去皮核） 舶上茴香（鹽炒） 海藻（洗去鹹焙） 梔皮、青皮（去白） 官桂各一兩，桃仁（炒去皮） 白蒺藜（炒杵去刺） 木香各五錢（一方有山藥二兩，無黑牽牛、延胡索、海藻、桃仁、白蒺藜） 研為細末，酒煮米糊和丸如梧桐子大，每服40—50丸，食前溫酒或鹽湯送下。

9、茱萸內消丸：証治准繩方，治小兒陰癰偏大，上攻臍腹疔痛，腹囊腫脹，或生瘡瘍，出黃水。

吳茱萸 食茱萸各五錢 山茱萸（去核） 桔梗、青皮各一兩，川楝子（炒）一兩五錢，大腹皮，五味子，海藻（洗） 玄胡索各一兩二錢五分，木香七錢五分，茴香（炒） 桂心，川烏頭（炮去皮臍） 桃仁（麸炒，另研）各五錢，共研細末晒糊為丸，如麻子大，每服30丸，空腹時溫酒送下。

10、三層茴香丸：六科准繩方，功用：溫導陽氣，漸退寒邪，補虛消疝，暖養腎經，治腎與膀胱俱虛，寒疝不散，臍腹疼痛，陰核偏大，或冷硬如石，膚囊腫脹，或搔痒不止，時流出黃水，浸成瘡瘍，或長怪肉。明李中梓：醫宗必讀云：治一切疝如神，癰疝尤為要藥。

第一料：大茴香（拌鹽五錢炒和鹽秤） 川楝子（炮，去核） 北沙參（洗剉） 廣木香各一兩，研為末，水煮米糊和丸，如梧桐子大，每服二錢，空心鹽湯下，日三次，小病可一料安，如不愈再服二料。

第二料：照前方量再加華撥一兩，檳榔五錢，與前藥共五兩半，依法為丸，服法如前，再不愈服第三料。

第三料：照前一二料中藥味及量再加白茯苓四兩（緊實者去黑皮） 黑附子（炮、去皮臍）五錢，共前八味，重十兩，糊丸，服法同前，但每服三錢，湯使如前，雖小腸氣頻發及三十年者，寒疝氣如枵棧大者，皆可消散。（一方無黑附子）。

11、消腫疔藥水

方剂成分：貫众二兩，广皮一兩，清半夏一兩，黃藥子一兩半，夏枯草一兩二錢，广霍香梗八錢，当归身八錢；西紅花一兩，海藻一兩，小茴香一兩，橘核一兩，苏薄荷一兩，醋香附一兩，广玉金一兩，浙貝一兩，紫背浮萍一兩，土茯苓一兩，紫苏叶八錢，蛇床子一兩，黃耆一兩，党参一兩，三稜一兩，老广木香一兩二錢，生于术一兩二錢，黃柏一兩，蜈蚣十條，生汉防已一兩五錢，远志一兩。

制法：共为粗末用山东白干七斤浸泡十四天照煮过滤兌蒸餾水五磅，再于蒸發器中，蒸發去酒，留水即成，加碘化鉀三十克溶化即成。

服用方：每次服五西西至六西西，一天三次于早午二时飯后十五分鐘各服一次，晚上八点服一次，服一星期休藥一天再服。服两星期后每次服六西西，也是一天三次，每次兌开水十西西服之。

此藥治絲虫病晚期法

方剂来源：刘惠民副厅长 山东省中医院

1958年11月14日抄

12、治偏墜方：河北省徐水县衛生科

荔枝核 小茴香各二兩，瓦上焙干，研細末，每服三錢，白水送下，奇方。

13、加減利疔湯：

川棟子 枳核 枳椇 元胡 烏藥各二錢 小茴香一錢 广木香二錢五分 炙甘草 泡姜各五分 黃酒为引。

用水煮服，每一剂早晚各半，服三付后停藥看結果，有效还可再如法服。

14、治癰疔疼痛，敗精惡而結在阴囊所致。

阿魏二兩醋和蕎麥面作餅裹之，煨熟，大檳榔二枚鑽孔溶乳香填滿，亦以蕎麥面裹之，煨熟，入硃砂末一錢，赤芍藥末一兩，糊丸如梧桐子大，每食前酒下30丸（危氏得效方）。

15、治癰疔偏墜，气脹不能动者。

牡丹皮 防風等分为末，酒服二錢，甚效

（千金方）

16、治疔气偏腫（儒門事親方）：甘遂，茴香等分为末，酒服二錢。

17、治疔气癰腫：荔枝核炒黑色，大茴香（炒）等分为末每服一錢溫酒下。

18、治腎腫如斗：荔枝核，青梔皮、茴香等分各炒研，酒服二錢，日三次。

第 三 篇

治 疗 膏 淋 諸 方

（乳 糜 尿）

膏淋之治則：阻塞尿道，小便不能出而痛，宜用秋石、茯苓、沈香、海金砂、澤泻、滑石之屬，如不甚痛，須固澀其精，慎勿誤用通利。宜用鹿角霜、肉苁蓉、菟絲子、連鬚、芡实、山藥之屬。或用桑螵蛸、菟絲子各等分，澤泻減半蜜丸服。后以六味丸合聚精丸調补之，余如鹿角霜丸，大沈香丸，沈香散，沈香丸，海金砂散，菟絲子丸，磁石丸、秋石丸之屬均可酌用，熱盛者用八正散加蒼朮。

1、鹿角霜丸：三因極一病証方 功治膏淋。

鹿角霜 白茯苓 秋石 各等分 共研細末，米糊为丸，如梧桐子大，每服50丸，米飲送下。

(中国医学大辞典Ⅲ，1844頁)

2、沈香散：治膏淋，臍下妨悶，不得快利。

沈香 陈皮(湯浸，去白、焙) 黃耆各七錢五分 瞿麥三兩 榆白皮 韭子(炒) 滑石各一两
黃芩 甘草(炙)各五錢 研为細末，每服二錢 食前清粥飲調下(中国医学大辞典Ⅱ，
1298頁)

3、海金砂散：証治准繩方，治諸淋澀痛。

海金砂 肉桂 甘草(炙)各二錢 赤苓 猪苓 白朮 芍藥各三錢 澤泻五錢 滑石七錢 石韋
一錢(去毛) 研为細末，每服三錢 清水一盞加灯心30莖，煎至七分，去滓，空服时溫服。

(中国医学大辞典 Ⅱ 2146頁)

【按】：本所以此方治疗一例，結果尿蛋白由0.8克%降至0.28克%。

4、磁石丸：治膏淋。

磁石(火煨、醋淬三七次) 澤泻 肉蓯蓉(酒浸、切焙) 滑石 各一两，共研細末 煉蜜为丸
如梧桐子大，每服30丸，溫酒送下。

(中国医学大辞典 Ⅳ，3994頁)

5、水陆二仙丸：治腎水不足，相火內动、男子遺精、白濁、妇人赤白帶下。

巴戟天 肉桂 沒藥 葫蘆巴 琥珀 茴香 川杜仲 川草薢 黑丑 补骨脂各一两，共为細末，
酒糊为丸，每服三錢，溫酒送下。

6、八正散：衛生寶鑑方，治膀胱結热，热淋血淋。

瞿麥 篇蓄 車前子(炒) 滑石(煨) 甘草(炙) 山梔子仁(炒) 木通 大黃(酒炒) 各一
斤共为散，每服2—3錢，清水一盞加灯心煎至七分去渣，食前溫服。

7、五淋散：太平惠民和劑局方，功治五淋。

赤苓一錢五分 赤芍(去蘆)一錢 山梔仁一錢，当归(去蘆) 甘草各一錢二分，共为末，灯心
为引。

8、二神散：六科准繩方，功治諸淋急痛。

海金砂七錢 滑石五錢。研为細末，每服二錢五分，用灯心，木通，麥門冬新汲水煎入蜜少許，
食前調下。

9、血淋散：无糖子二錢 白砂糖一錢 上二味對，水煎服。或海金砂一味砂糖湯送下亦佳。

10、治淋疾大奇方：胡桃肉二錢 大麥六分 茯苓 甘草 灯心各三分 水煎服，頻驗。

11、疗諸淋方：葫蘆二錢 甘草二分 水煎服。

12、又方：合欢木二錢五分 大黃七分，水煎服。

13、治淋疾諸藥不能治者方：茶毗所灰一味，白湯下。

14、疗淋疾痛甚者方：松脂 砂糖各等分 共为末白湯送下，日二錢

(以上六方系选自名家方选71——72頁)

15、治諸淋：

白朮 茯苓 澤泻 猪苓各二錢 滑石二錢 甘草稍五分 灯草30莖 山梔一錢半 車前一錢。
空心水煎服。

16、清水蓮子飲：治上盛下虛，心火炎上、口苦咽燥，微热，小便赤澀，或欲成淋，并主之。

石蓮肉 赤苓 人參 黃芪 甘草 麥冬 地骨皮 黃芩 車前子 地膚子(加倍) 空心水煎服

17、郁金黃連丸：治……腎水不升……膀胱小腸积热……或白濁如淋或膏淋如膿……。

郁金 黃連各一兩，黃芩 琥珀（研） 大黃（酒浸）各二兩 滑石四兩 牽牛（炒頭末）三兩 白茯苓四兩，共為末水丸梧桐子大，每服五十丸，空心滾湯送下。

（以上三方选自仁術便覽）

18、四精丸：証治准繩方。治白濁煩渴。

鹿茸 肉蓯蓉 山藥。茯苓（去皮）各等分，研為末，水煮米糊和丸，如梧桐子大，每服30丸，空腹時大棗湯送下。

（中西醫學大辭典IV，補遺92頁）

19、沈香琥珀散：澄治准繩方，功治諸淋。

沈香 琥珀各三錢 通草 忘憂根 篇蓄 小茴香（炒） 木通 麒麟竭 滑石 海金砂 木香 各五錢，剉散，每服一兩。清水二盞半加灯心一把，竹叶十片，連根葱白三莖，同煎至七分，去渣，空服食前溫服。便硬加大黃五錢，水道澀痛加山梔五錢，淋血加生地黃一兩。瀑流水煎極驗。

20、消濁固本丸：治胃中濕熱，滲入膀胱下濁不止。

連翹 益智仁 茯苓 川連（炒） 縮砂仁 猪苓 黃蘗 半夏（制） 甘草（炙） 各一兩。共研細末，神曲煮糊或煉蜜為丸，如梧桐子大，每服三錢空服時淡鹽湯送下。

21、分清丸：治濁用。

芡實粉 茯苓粉 黃蜡 蜜和丸梧桐子大，每服百丸，鹽湯下。（摘玄方）

22、直指秋石丸：治濁氣干清精散而成膏淋黃白赤黯，如肥腎蜜油之狀。

秋石 鹿角膠（炒） 桑螵蛸（炙）各半兩，白茯苓一兩為末，糕糊丸，梧子大，每服50丸，人參湯下。（直指方）

23、茯苓丸：治夢遺滑精，赤白便濁，及強中消渴（局方）茯苓 石連子各三兩，菟絲子十兩（酒浸）五味子八兩，共研末，以山藥六兩酒煮糊丸，漏精鹽湯下，赤濁灯心湯下，白濁茯苓湯下，消渴米飲下。

24、分清五淋丸：主治小便渾濁，淋漓作痛，癃閉不通，或如豆汁，膿血……。

益智仁 萆薢 赤苓 烏藥 澤瀉各九兩 車前 猪苓 木通各十八兩。共為細末，水泛丸如綠豆大，每服三錢，滾水送下，每日飯前各服一次。禁燒酒，麩朮、母雞、魚蝦刺戟之物。

【按】：本所以上藥治療乳糜尿患者25例，48%治愈（小便化驗無蛋白，外觀正常），36%進步（小便外觀正常，化驗時有微量蛋白。）總計有效率為84%。服藥長者1月以上，短者10天以內，對乳糜血尿之效療較乳糜色者為佳。但服後常有食思不振，嘈雜感，可暫停藥或不停藥與蘇打等同服亦佳。

25、二妙茯苓丸

組成：原蒼朮一斤（米泔水漂四小時），生黃柏一斤，澤瀉一斤，茯苓一斤，烏賊骨二斤，晚蚕砂半斤

制法：共研細末，水泛為丸如胡椒大。

劑量：成年每次十克。

服法：每日二次，早中飯前溫開水吞下。

適應症：絲虫病乳糜尿。

26、中藥治療乳糜尿的報導（南京第一醫學院附屬醫院，59年第二期江蘇中醫）

藥物，阿膠八錢，茯苓四錢，澤瀉四錢，滑石四錢，猪苓四錢

療效：二帖之後血尿及乳糜尿均行停止，後繼續服藥共20帖乳糜尿并未再見，貧血情況改善，共治12例其中10例已痊愈出院，3個月訪問未再復發。

疗程：一般疗程仅需2—3星期

27、治乳糜尿（1）苓朮二錢，澤瀉二錢，赤苓二錢，阿膠二錢，連翹二錢，牡蠣二錢，芡實二錢，白朮二錢，枸杞二錢，杭芍二錢，粉草八分

28、治乳糜尿（2）

龍骨八分，牡蠣三錢，芡實三錢，澤瀉三錢，赤苓二錢，阿膠三錢，云苓二錢，厚朴二錢，地榆一錢，杭芍三錢，連翹二錢，粉草八分水煎服。

29、治乳糜尿（3）

龍骨一錢，菟絲子一錢，澤瀉三錢，赤苓三錢，芡實二錢，茯苓二錢，地榆一錢，阿膠二錢，枸杞二錢，白朮三錢，棉芪二錢，粉草八分，牡蠣二錢

30、治乳糜尿（4）

龍骨二錢，牡蠣三錢五分，芡實三錢，澤瀉三錢，赤苓三錢，連翹二錢，阿膠四錢，杭白芍三錢，茯苓二錢，川芎一錢，歸身一錢五分，黃芪一錢五分，地榆二錢分，粉草八分

不用引

【按：以上四方系得自濟寧市中醫耿暮時大夫處，服後利尿作用很強，可支持10小時，將上藥分三次服亦有與一次服同樣效果，小便混濁及凝塊少，本所以上述四個處方治療乳糜尿五例，一例全愈其餘皆很效，其中以第二及第四方據病人服後感到輕快。】

31、白龍骨三錢，桑螵蛸二錢，益智仁二錢，烏藥三錢，石菖蒲二錢，草薢四錢，甘草稍一錢，煎二次兌勻日二次或三次（分三次時可加50%）

加減方：若小便不利或困難者去龍骨加滑石三錢車前子二錢，茯苓三錢。

若惡心腹瀉腹脹食欲不佳者可以：原方加陳皮二錢，山查二錢，砂仁一錢，竹茹一錢。

若小便中（或乳糜中）帶血亦很多者原方加芩蔚三錢，側柏葉三錢，海螵蛸二錢。

若大便秘結者原方加肉蓯蓉三錢并去龍骨。

一般應用飯前一小時服，若有胃病者，可改在飯後，一小時或減量或改多次服，總之以飯前為佳。

（此方來源系本所王彥光同志得自山東省中醫院。）

【按】本所以此方之原方治療一例，服藥12付，尿蛋白由0.8克%減至0.4克%，但未痊愈。

32、膏淋散：

治膏淋如油，海金砂，滑石各一兩，甘草稍二錢五分為末，每服二錢，麥門冬湯煎服，日二次（仁存方）

【按】本所以此方治療一例，治前尿混如乳，蛋白含量0.8克%，治療後0.3克%，不甚理想。錄自中國藥學大辭典下冊991頁人民衛生出版社。

33、治乳糜尿

益智仁 炒小茴香 萆薢子 蛇床子 車前子 猪苓 云苓 炙甘草 復盆子 野薺菜干
抄自1959年第二號大眾醫學著者叶達智

34、山甲煎劑：此方來自零陵縣中醫研究所（摘自中醫中藥治療鉤蟲、蛔蟲、絲蟲病、瘧疾方選，第②集，中共湖南省委除五害滅疾病領導小組辦公室編印。）

適應症：本病尿如乳糜，陰囊腫大，淋巴曲張結腫，腳或如象皮腿者。

藥物：山甲 歸尾 茵陳各三錢 銀花藤一兩 地龍一錢 黑丑一錢二分 雄黃八分

服法：水煎服，如改做丸服可加重分量為十倍，以明礬五錢溶水為丸，每次服丸二錢。

作用：疏導淋巴、杀虫解毒、活血破瘀。

藥解：山甲宣通經路，銀花疏導淋巴腺，兼有解毒作用，黑丑解毒利水，歸尾活血破瘀，地龍茵

陈泻热利水。

【按：本所用此方治疗象皮腫两例，乳糜尿四例，两例象皮腫皆获得一定疗效，皆为Ⅱ期象皮腫、服藥在15付至17付。一例收效尤显著。所治之四例乳糜尿患者中三例尿中已不能查到蛋白，外观正常，其中两例系曾服过其他藥品疗效不明显而改服此藥者，一例无效。总之，此藥对乳糜尿有一定效果，唯所試病例还少，長期观察如何，有待再多的病例証实。】

35、补中益气湯：李东垣方、功治气虛、气少、气高、气喘、劳倦、内伤、阴虛、發热、头痛、口渴、表热、自汗……劳淋，遺泄……。

处方：黃耆一錢（蜜炙，一作一錢五分，一作八分。一作酒炒一錢，热甚者倍用。）人参三分（有嗽去之，气虛者可加至一錢）甘草五分（炙。可加至一錢）当归身（酒制，一作土炒，一作酒拌一錢，一作五分）橘皮（一作五分，一作七分）升麻，柴胡各二分（可加至三分）白术三分（土炒，可加至五分，若肋下痛者有瘀血，須生用）

用法：加生姜三片、大枣二枚，清水煎去渣，空腹食远稍热服。

【按：本所以此方加减治疗乳糜尿患者四例，其中加龟板，阿胶、長者服藥48付，只有一例痊愈出院，其余三例，症状稍減輕，即濁度稍减，但仍混濁。在此四例中認為对乳糜尿之疗效不甚显著。】

36、白向日葵莖之瓢煎水白糖为引

【按：本院乳糜尿病人薛××（住院号75）連服14日，刘××、楊××連服7日无效。】

37、治乳糜尿

白茯苓煎水喝，紅白糖为引

献方人：滋阳乳糜尿病者

【按：薛××連服7—8日无效】

38、治乳糜尿

紅白鷄冠花、仙人掌泡茶喝。

介紹概况：張东家亲見治愈一例。

39、治乳糜尿

烏鷄白鳳丸。每日1丸服12丸（中藥鋪可买）

以胡盐为引

介紹概况：李宣坡二哥治愈

40、夏枯草水煮为茶加紅白糖

济宁李堂治愈一人

41、野向日葵（鮮的）加紅白糖煮水为茶

济宁后鋪滿春田介紹治愈二人

【按：楊××（住院号115）曾服一周无效。】

42、健毗蘿花加黑白棕煮水，紅白糖为引

治乳糜尿

43、霜打高粱芽，白扁豆花熬水，經露水露过，溫热后加白糖。

44、柳树紅白鬚焙成粉泡黃酒喝

45、車前子毛根草紅白糖

46、原紅枣 黑矾（一攝）煮当飯吃

病人王發賢介紹吃好三个

47、尿碱烤干爐粉泡黃酒，溫热喝

介紹概况：臨城城關宋大夫介紹并治愈一例。

48、猪膀胱結石烤干研細粉使黃酒为引

介紹者：曲阜齊又琴

49、妇女頭髮 燒成灰，糖作引

朱耀祖介紹治愈1例

50、頭髮，最好用胎髮，爐为灰泡入酒中，治大小便阻塞

藥性賦雷氏泡制藥解介紹

51、治乳糜尿驗方：

糯米稻草根四兩加水1500毫升煎至500毫升，少加紅糖服，每日二次連續20天为一疗程，輕者一程重者三程可愈

来源：此方系本所呂書記听人民医院王書記談河北省有一病人当时很重，重危以后治愈。

52、三白湯：

白風仙花，白椿樹花，白向日葵花

白糖 煮水作茶（常喝）

53、白矾半生半熟（熟二錢五分生五分）

大黃一錢五分 海金沙五分 肉蓯蓉五分蛋清一个装入蛋內燒熟，研为細末。

紅花一錢加白糖为引 每日两个

（按：濟宁县中医蘆乐云老先生献方，曾治愈一例，十几年未犯，本所追試一例无效。）

54、治血淋身：（徐水衛生科）

牛夕八分，猪心一个，乳香八分，硃砂五分，先将牛夕乳香水煮去渣，再将猪心切开将硃砂装入其內，用綫扎好放入藥水內煮沸連湯帶肉同服。

55、治五淋（徐水）

紫叩7分 海金沙1分 姜汁1分

用煮熟的蛋黃蒸油加入上藥燒成灰黃酒送下

56、治乳糜尿：大黃三分鷄子1个 倒出蛋清蛋黃混入大黃装入蛋壳內，又燒燒熟白水送下

（按：本所試驗一例曾連服三天，小便未見改变。）

57、治乳糜尿：芹菜根9根（最好用独根的）

主治：血絲虫病，蛋白尿。

用法：用冷水一大碗，在火上煮开5——6分鐘，加上适量的白糖服用，每日早晚各服一次，每次都要使用新的芹菜根，10天为一疗程。

方剂来源：北京中医研究院

第四篇

治疗湿热脚腫、脚气、流火、腿等諸方

(四肢及阴囊象皮腫)

阴囊腫的治則：此症因久坐阴湿之地，寒氣內凝，亦有因怒叫氣閉，結聚于下而成者，治法如下：

- ①尋常腫痛者俱宜服桃仁丸。
- ②寒氣客于厥少二阴，致阴囊腫痛，掣引少腹，冷汗頻瀉，引縮二子入腹，至痛止方出者，謂之內吊。宜烏梅散，勻氣散或用布裹川椒，厚半寸，炒熱置阴囊下，熱氣大通，日再易。
- ③阴莖全縮不見，或不縮而阴囊腫大光亮，不燥不痛者，肝腎氣虛也，宜橘核煎湯調服勻氣散。
- ④囊及四肢俱腫，二便不利者，膀胱蘊熱，風熱相乘也，宜白牽牛散。
- ⑤青黑紫色腫者：用定痛膏加赤芍、草烏、良姜、肉桂各少許，調和，用蕤葉或葱葉搗爛同貼，仍兼服利小便之藥。
- ⑥杜心土研碎，炒熱鋪橙上，再以川椒、小茴香研末，撒在上面，將阴囊熏燙，冷則再炒，三次即愈。
- ⑦橄欖核七個，燒枯研末，土茯苓少許，研末加冰片和勻，以紗布袋盛之，先用土茯苓銀花煎水洗過，再用前藥裝入布袋扑之，隨扑隨愈。
- ⑧棉花子煎湯洗之。
- ⑨蟬蛻五錢，水煎洗腫處，二、三次即愈。
- ⑩真硼砂煎水熏洗，數次即愈。
- ⑪明雄黃研末，頂好燒酒調敷。
- ⑫老鴨子口中涎水塗，數次即愈（或用鴨血亦可）。
- ⑬雄黃，枯礬、茶調敷。

（以上选自中国医学大辞典Ⅱ.2814頁，所附之处方請照該書）

1、清濕散：統旨方，功清濕。

黃蘗（鹽水拌、炒）蒼朮（米泔浸、炒）各一錢五分，澤瀉、杜仲、白芍（煨）、牛膝（酒浸）、木瓜、威靈仙、陳皮各一錢，甘草三分。清水二盅加生薑三片煎至八分，食前服，痛甚者加乳香沒藥末各五分，臨服調入。

2、清熱瀉濕湯：沈氏尊生書方。清熱解毒。

黃蘗（鹽酒炒）、蒼朮各一錢，紫蘇葉、赤芍、木瓜、澤瀉、木通、防己、檳榔、枳殼、香附、羌活、甘草各七分。清水煎服，痛加木香，腫加大腹皮，熱加黃連大黃。

3、當歸拈痛湯：李東垣方。治脾厥，濕熱走淫，遍身骨節煩痛，肩背沉重，胸膈不利，足脛赤腫重痛，腿游風腫痛，及一切風濕熱毒，侵淫疮癤，膿水不絕，或痒或痛，脈沉實數動滑者。當歸身二錢，羌活、甘草（炙）、黃芩（酒炒）、茵陳蒿（酒炒）各五錢，人參、苦參、升麻（多汗易黃者）、葛根、蒼朮（米泔水浸、炒）、白汗、易桂枝各二錢，白朮（土炒）、澤瀉、豬苓、防風（下腫易防己）、知母（酒洗）各三錢。清水煮、不拘時（或食前）熱服。【注】此方為足太陽、陽明二