


肝下面圖




右腎前面圖




心外衣積水圖



用寒暑針查內傷熱高度低圖



總脈管生血囊各圖



西醫內科全書肝膽各部例言

一凡所稱心房門戶各名目皆照全體圖微譯定者用之

一凡所用放膿或放水針管與射水或射摩啡之水節各器皆

於西藥房可購

如屈臣氏

一是書所謂生血囊卽西醫五種所謂跳血囊惟跳必於生之後生乃在跳之前故用生字較安

一凡所謂溺管或微溺管非祇陽莖一管兼內腎發溺之微絲溺管由腎至膀胱之溺管左右各一條長約八寸

一凡所謂變生牛乳餅之質乃指該處變患形質如牛乳餅非真牛乳餅也其狀類似豆腐乳

一是所用之身體臟腑及筋脈各名目皆照全體圖微譯定者
用之

一是書所稱腦筋卽五種所謂腦氣筋緣筋內無氣故刪之

一是書所謂叩按拍聽各部等法乃言西醫聽察內腑之聲狀
法以左手按某部以右手數指叩之

一是書所稱溺內所含質體或形色改變或輕重多寡皆經化
學覈定平人之溺如此遇某病卽如彼

一卷中每多互相發明之處閱者須統觀全書並參及西醫五
種全體圖微西藥畧釋等書自可了然倘隨取一卷大畧觀
之誠恐語多未明

西醫內科全書肝膽各症目錄

鐵嶺孔慶高繼良氏筆譯

美國嘉醫氏約翰氏校正

卷上

肝內積血

肝體發炎縮實

肝生膿瘡症

肝變黃症

肝生毒瘤症

肝內水泡蟲症

膽管內皮發炎

膽淋症

脾生大症

脾離本位症

血生白珠症

卽黃瘰

血薄症

女子初行經血薄症

血積結團症

卷中

心外衣發炎

心外衣積水

心外衣積水與氣

心本體發炎

心肌肉變壞成膏

心體潰爛

心體生大症

心房內皮發炎

心房門戶各症

心血積結成團

心跳症

脈管發炎

總脈管生血囊

腹總脈生血囊

卷下

內腎積血

內腎生膿瘡

腎穴發炎

腎肥網發炎

內腎壞

內腎壞舊症

微絲溺管內皮發炎

微絲溺管連網發炎

內腎變膏

總論內腎壞各症

砂淋症

膀胱發炎

西醫內科全書肝部各症卷上

肝內積血 此症分兩等一由肝本體患病積血一因別部臟腑患病致阻碍肝之血行皆可令起此症

病原 凡人肝內之四合迴管與肝脈於飲食後積聚血多者則屬無病而常常飲食過度以至於積血太多者則屬有病而物之能令其血脈不安者則莫如濃酒辛辣之味有鉛質光藥所製之物皆可使其肝積血者也○而在有霉毒氣之地則肝積血症又常因感受此氣而起遇此而有發冷發熱者則更可無疑故凡瘧症其脾大其肝多積血者皆此之故也○凡心房戶有所阻碍則肺內之迴管積血必多故累及肝之迴管亦多

積血○其腦部受病而累成此症者，則如忿怒太甚，或傷半月結，與割斷臟腑大腦筋，或有毒物入血內等事，皆可令肝積血，察臟腑之壞，肝積血症割驗之，內多含血水，全體皆紫黑色，其肝內出明汁之管亦被壓，故無膽汁流出，而迴管亦停聚，日久則肝體必積脹甚大，膽汁不出，發膽汁之管，因積溢必畧發炎，更因肝積血，而胃與小腸上迴亦腫脹，內皮畧炎，且日久肝體變壞，或堅實，或成肥膏。

病狀，起病則混身不安，四肢腰骨皆酸痛，下午身熱，舌胎黃，頭痛，胃弱，不思飲食，終日作悶，常覺右肋牽扯重墜，悶鬱不舒，向左睡下，則肝體懸空，無以托靠，故牽掛不安，卽木帶窄緊亦

不能受、每睡則向右、藉右脇骨承托其肝、則覺稍舒、亦有不能輕減者、須另設安法、乃可就寐、用扣按察聽其肝部之聲、便可分明、查凡人之肝、常與右脇骨第六條相齊、呼氣時上至第五條、吸氣則下至第七條、而肝邊與各脇骨相連、或出脇骨之邊、約一指寬、故無病者、其實聲祇在肝之四圍、不遠、若有積血、則

其聲直至胃部、與左脇部亦皆實而不響、且醫者應知肝邊較薄、聲不實暗、所扣實聲處、係在肝邊之上、可知聲外、尙餘肝邊許多、則其肝大之狀、亦可概見、○而遇大腸上迴積氣、致肝體被壓者、扣之、其聲又變爲響焉、○更有實暗之聲、不同、當細察其故、或爲別臟牽壓、或爲瘤瘡所擠、或肺胞膜有水、皆可逼壓肝、離本位、夫在外扣按、雖已知其肝大之據、其內狀仍須察明、

於肋骨之下，摩其肝體，或滑或粗澀，或硬或軟，自可分別。○用
量度之法，亦可知肝有生大之患。其右脇方停之高厚，必與左
脇不同。○更有一法，以觀其外狀者，皮色畧黃，卽無此。其眼白
壳必黃，面色或黃如土，或白黃，或深黃不等。○倘因寒暑不時，
或受霉毒氣，或飲食過度，而致常令胃與小腸上迴發炎，或胆
囊管發炎，更或阻其胆汁不能流出，以致積脹者，凡此則其小
便函有粉紅之質，或淡紅如酒，且尿底甚多。症重者，胃部亦受
患，而嘔吐見胆汁，卽大便亦有胆汁瀉下。其大便始則如常，繼
則半青黃，或淡黃之水，終則瀉黃水，皆胆內所積之汁。時見大
瀉，將積滯與難化之物瀉盡，隨卽清爽舒暢，脇腹皆消，無復鬱

脹頭亦止痛及一切發冷發熱亦皆退之者凡因心肺有患以致此者其病狀現之甚遲其右脇每牽動不安肝體漸腫大而扣按之亦覺增潤面亦漸黃此則必令其胃與小腸上迴發炎而胃不消化與作悶作嘔及泄瀉等事亦皆相繼而起矣○其因心有憂驚過度而起是症者則形現黃瘰肝雖不大而內畧積血膽汁既留血內肝縱無壅重不安而面漸黃無精神心脈遲緩小便濁身皮皆甲錯而無潤澤之色焉

起止病期 此症於未成之先病勢遲速不同如因心體或肺阻壓其起病甚遲緩而行病與病期亦無定限倘心肺之患未除此症斷不能先愈迨將其四合迴管阻住肝體漸壞若更將

各路血脈阻碍，則漸成水臌症。○其天時不定，或感受霉毒氣而起者，則轉機甚速，不久自愈。重者，約七日至十日，亦可痊。若再受霉毒，復發日久，遂成舊症，故貴能治起病之原，始能收全瘳之效也。○其因心憂驚過度而起者，起時面甚黃，不過數時之久，病勢盛極，隨即漸退，約四五日自可將愈。凡因心肺先有患而起者，則屬重症，餘皆屬輕症而已。

辨症 本症自起者，與膽管發炎症病狀同，而病期迥異。膽管

發炎症，則未起之前，胃與小腸先發炎症。若

本症則症起後，胃與小腸乃發炎也。其

因心體或肺阻碍而起者，醫生應察其心肺之患，自可辨之。

治法

肝積血，因心肺阻碍而致者，則宜按心部或肺部而分。