

欽定古今圖書集成博物彙編醫部全錄

第二百五十七卷目錄

醫部全錄 二百二十七

火門

陳士鏞有室秘錄火門論治 命門之火宜通

方又述云 命門之火宜通 命門之火宜通

命門之火宜通 命門之火宜通 命門之火宜通

命門之火宜通 命門之火宜通 命門之火宜通

命門之火宜通 命門之火宜通 命門之火宜通

命門之火宜通 命門之火宜通 命門之火宜通

命門之火宜通 命門之火宜通 命門之火宜通

命門之火宜通 命門之火宜通 命門之火宜通

命門之火宜通 命門之火宜通 命門之火宜通

命門之火宜通 命門之火宜通 命門之火宜通

命門之火宜通 命門之火宜通 命門之火宜通

命門之火宜通 命門之火宜通 命門之火宜通

命門之火宜通 命門之火宜通 命門之火宜通

命門之火宜通 命門之火宜通 命門之火宜通

命門之火宜通 命門之火宜通 命門之火宜通

命門之火宜通 命門之火宜通 命門之火宜通

命門之火宜通 命門之火宜通 命門之火宜通

命門之火宜通 命門之火宜通 命門之火宜通

命門之火宜通 命門之火宜通 命門之火宜通

命門之火宜通 命門之火宜通 命門之火宜通

命門之火宜通 命門之火宜通 命門之火宜通

命門之火宜通 命門之火宜通 命門之火宜通

命門之火宜通 命門之火宜通 命門之火宜通

命門之火宜通 命門之火宜通 命門之火宜通

命門之火宜通 命門之火宜通 命門之火宜通

蔡伯典第二百五十七卷
醫部全錄 二百二十七
火門
石室秘錄 命門論治
火證治法
燒人多人火盡如之然而火之有餘水之不足也不
補水以鎮陽光又安能去火以清其煩煩哉方用元
象八兩生地四兩熟地大冬麥冬丹皮沙參各三兩
地骨皮白芍各五兩陳皮五錢各為末蜜為丸加姜

藥六兩亦為末同搗為丸每九日白滾水送下五錢妙

在元參去毒逐之火而又能調停五臟之陽各得其

之養陰多於陽則陰氣勝於陽氣自然陰勝陽清又何

必右腎知母之補陰哉蓋石參知母原是大火神劑

不可偏廢然而用之於火盛熱極之初可以救陰水

之耗乾不可用之於火微熱退之後誠恐陽光之耗

此瘦人之治法如此

瘦人多火定一煎方用元參一兩麥冬冬冬生地

熟地白芍各三錢山藥黃白朮各二錢丹皮二錢

甘草北五味各五分水煎服此方皆滋陰之藥而

不覺滯於胃中瘦人常服必無火證之便矣

引治者病在下而上引之病在上而引之也如人

虛火沸騰於咽喉口齒間開寒涼之藥入口稍快少

頃又甚又用寒涼腹腹肚痛而上熱益熾微用熱藥

寒疾而病人不信不肯輕治乃用外治之法引之而

愈方用附子一箇為末醋調成膏貼在湧泉穴

上少頃火氣衰又少頃而熱退變成冰涼世界然後

六味地黃丸湯大劑與之則火不再沸騰矣蓋此火

乃虛火也見水則愈熾烈也不見雷聲之震熾陰大

雨之時愈加震動驚大轟地更作威勢一見太陽當

空則雨歇聲消寂然不聞矣又不見冬令之天地耶

嚴寒霜雪冰凍郊原而雪霽除陰風慘厲此天氣下

行而地氣反上蓋下無則上自聚也又不見夏日之

天地于烈日炎暑降火熱降木榮林煥湯沸水天

氣上升地氣下降此上熱而下寒也人身處火亦當

是也今既火騰於上則下身冰冷今以附子大熱之

藥於湧泉引之者蓋湧泉是足水穴之中實有火

氣存焉火性炎上而穴中正寒惡然得大則水自溫

水溫則火自降因氣相求必歸於靜宅之中矣火既

歸靜宅又何至沸騰於上哉此咽喉口齒之虛火忽

然治之病在上則用藥宜從微從後之也術在上者

者頭目上之病也用上清丸之類上清丸方世多不

要吾謂之更定之凡治上焦之火俱可服此藥不

各二兩白芷散劑于各五錢倍慢參冬門冬各二

兩半夏陳皮薄荷甘草藥胡各一兩各為末水打

丸每服三錢飽食後服此方妙在清火而不傷中氣

強弱人感中風邪上焦有風火者服之俱妙

抑治者抑之使不旺也或渴其肺中之火或通其心

中之焰或通其胃中之氣或平其肝木之盛是也此

四經最多火而最難治肺經之火散之則火愈升抑

之反勝於散之矣蓋助金之氣則成而金頭金并

火不熾然而肺乃肺經終不可以燥法治之故用抑

之花粉二錢水煎服此方專抑肺金之氣而又不傷

氣則肺金有養自然安寧倘全以寒涼之藥降之則

又不可蓋肺乃嬌臟可輕治而不可重施以輕清下

降之味少抑其火則肺氣不月心火少微肺金收降

必成虛器又何必明大散之藥哉

心中之焰非重連不可遏徒用清連而不附湯水之

品則火雖暫瀉而心方用清連藥則清連心夏

一錢白芍二錢安之此方用清連藥則清連心夏

竅則子自閉必鬱之理或不用清連之藥而誤用清

心之黃連則黃連性燥助心火此所以心煩必煩

同治也

胃中之氣有餘必且變為熱人以爲我能食令乃氣之有餘也我能消食乃脾之健旺也我能不畏天寒此胃之有餘也吾謂氣之有餘本之腎水之不足一遇風寒寒之夏暑犯之非變爲消渴之證必成爲癆瘵之人必須平日用大劑六味地黃丸吞服自然氣舒而火息胃平而熱除也無如世人不信自說曰強不肯多服又托言我不能吞丸藥下咽則吐不聽仁人之語固循不服及至大病則口快與我用竹葉石膏湯現矣今立一湯方用熟地五錢麥冬元參山茱萸山藥各三錢丹皮北五味各一錢天花粉八分水煎服此方乃胃火之聖藥妙在補腎補脾肝全不繞去平胃中州安泰豈有阻滯抑鬱之理自然輕轉有路機通無礙上不凌肺脾全下不侵肝脾土旁不關害肝木一方之中衆美備臻又何患胃火之上勝哉至於胃火既旺或九乘原有煩躁等症世人不知予升發明之蓋人之胃雖是胃土主事其實必得腎水上滋則水道有路糧食搬運而無阻隔之虞今胃火既盛水僅可自救於腎宮又安能上升於咽喉口舌之間况九乘又是硬物原非易得下咽此所以不明驗無腎水之人無食以下喉猶然吐出蓋腎中無腎水以潤故耳彼無腎水者尚不能入於腎中况又有胃火之虐無腎水之潤者無怪乎利口難堪也

肝木之盛抑之之法必須和緩熱和解之中而不用品之之法則火愈甚矣方用白芍五錢炒梔

子三錢當歸一錢白芍柴胡甘草制茯苓澤瀉各一錢

水煎服此方用藥劑以散肝木之氣更妙用白芍梔子以清肝木之火去而木衰此善於抑之者也腎中之水有火則安無火則泛個人過於人房則水去而火亦去久之水虛而火亦虛水無可藏之地則必上泛而爲癆瘵治之法欲抑水之下降必先使火足之下溫法當仍以補水之中而用大熱之藥使水足以制火而火足以生木則水火有相得之美也方用熟地三兩山茱萸茯苓各一兩北五味子一錢牛膝肉桂各三錢水煎服一劑而後下二行一劑而痰消無跡矣蓋肉桂乃補腎中火之聖藥倘止用之以溫命門水亦可以下降熱而不補其腎宮之火則腎宮既乏水虛而房舍空虛難以存活仍熱上泛故必用補水以補火也方中熟地山茱萸純足補水之藥而牛膝又是引下之聖品水有火之謂又有水之義又有引導之使然而無泛上之理也

火治者治火之有餘也火愈甚愈惟陽明一經最難治知治陽明之法則上臟之火各隨之天無難專治矣陽明胃土也如何有火此火乃生於心包心包之火乃相火也君火失位則心包厭之以自逐其後斯火勢是以辛涼大寒之品大劑投之悉其快飲斷火得而少息然陰涼而略停然必滲入健胃之藥始可奏功蓋胃火之沸騰終由於脾火之不足去胃火必須補脾土然而徒補脾土而不去水濕之痰亦不得也方用石膏一兩知母各二錢麥冬五錢甘草一錢糯米一合竹葉白片水煎服方則人參竹葉

石膏湯也胃火之盛非此湯不能平蓋問其人必大渴飲水見共有汗如雨者始可放膽用之否則不可

用蓋無汗而渴亦有似此證者不可不辯也此方純是降胃火之藥所以愈救先天之腎水也此證一日不治即蒸乾腎水而致不救故不得已用此煎道之藥也倘無汗而渴是胃火有餘而腎水不足是烏可復用石膏湯以重傷其腎水乎然則又當何方以治之用熟地三兩山茱萸茯苓各一兩北五味子三錢元參一兩此方乃治似白虎證而非胃火之熱者人更宜知也之其妙心火用黃連肝火用梔子脾火用黃芩冬前言悉之矣茲不再贅陽明之火難息於心包實成於肝木之耗也肝木旺則木中有火不特木來起土而轉來助益肝木之火乎是當火一發則震地轟天陽明得心包之火而沸騰又借肝木龍雷之火以震動如何可以止哉故輕則大渴重則發狂也予治此證往往白芍加至數兩先用石膏湯以去火熾加白芍以生木平水而火無以助始自然胃火孤立無援又加麥冬以平脾金之氣則金有水潤不必取於於胃土而胃土可以自救見又有石膏知母之降火故此征之所以定而熱之所以除也方用石膏麥冬各一兩知母每半夏各三錢甘草一錢竹葉白片糯米一合先煎湯四碗又加白芍二兩同煎此方之妙不在石膏知母之降胃火妙在白芍之平肝木使木氣有養不能起土升不使木鬱生火以助胃火也又妙在麥冬以清肺金使金中有水木火熾矣且去則肝火自平

一方治俗察之火梗子丹皮元參各三錢白芍五錢

片本六兩 吳茱萸湯洗三次一兩

右爲末第凡如桐子大每服三五十九白木陳皮煎湯下

四順清涼散飲子

一名清涼散治前證

大黃 甘草 當歸酒洗 芍藥各等分

右咬咀每服五錢用水一盞半薄荷十葉同煎至七分去滓溫服

桔梗 連翹 山梔子 薄荷 黃芩 甘草各等分

右爲粗末竹葉白水煎溫服汗之無服春倍加防風羌活夏倍加黃芩知母李夏淫雨倍加羌活秋加桂五錢冬加桂一兩亦可以意消息隨證加減而用之

人參湯治肺癆咳嗽氣喘胸膈脹滿痰多大便澀人參 梔子仁 枳殼炒 薄荷 甘草

連翹 杏仁去皮尖 桑皮 大黃 桔梗各等分爲末每服七錢水一盞煎八分食後溫服

龍腦散治下痢

龍腦散治下痢

龍腦散治下痢

龍腦散治下痢

龍腦散治下痢

龍腦散治下痢

龍腦散治下痢

龍腦散治下痢

龍腦散治下痢

龍腦散治下痢

龍腦散治下痢

龍腦散治下痢

龍腦散治下痢

龍腦散治下痢

龍腦散治下痢

龍腦散治下痢

龍腦散治下痢

龍腦散治下痢

治上焦熱陰煩解勞去肺熱咳吐血熱驚悸解胃熱口乾吐血肝肺熱熱出口苦腎熱神志不定上而酒毒熱熱消渴下而血滯五淋血崩等疾

薄荷一斤 麥門冬去心二兩 甘草一兩半

生地六兩另末 黃連一兩 黃芩 新羅黃炒

阿膠炒人參各二兩 木通 銀柴胡各二兩到

同木通湯浸一日夜較服計

右爲細末好蜜一斤先煎一兩湯然後下生地黃末不住手攪時如木通柴胡汁慢火熬膏勿令火

急膏成然後加前藥末和丸如豌豆大每服二十丸白湯下一方無遺

虛勞虛煩梔子湯下

肺熱黃芩湯下

心熱浮動恍惚人參湯下

肝熱防風湯下

腎熱黃蘗湯下並食後服臥服

洗心散

治肺熱風寒上攻頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼口苦唇焦喉痛痰涎壅滯涕唾稠粘小便赤澀大便乾澀

白木一兩半 麻黃 當歸 刺茶穗 芍藥

甘草 大黃各六兩

右爲細末每服一錢水一盞入生薑薄有少許同煎至七分溫服

治心火

治心火

治心火

治心火

治心火

治心火

治心火

治心火

治心火

治心火

治心火

治心火

右爲極細末每服一字至半錢一錢臨臥溫水調下海蘗云見老單方湯心湯出於此此乃實邪也實則湯其子

升陽散火湯

治男子婦人四肢發熱肌熱骨蒸熱汗臨中熱發困熱如瘧之婦手此病多因血虛而得之或胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土久鬱則發之

生甘草一錢 防風一錢五分 炙甘草三錢 獨活 白芍 羌活 人參各五錢 柴胡八錢

右咬咀每服半兩水三盞煎至一盞去根精熱服忌寒涼之物及冷水月餘

地骨皮散

治渾身壯熱脈長而滑陽毒火熾發滿

地骨皮 茯苓各半兩 柴胡 黃芩 生地

知母各一兩 石膏二兩 羌活 麻黃各七錢半

右咬咀每服一兩入薑煎有汗去羌活麻黃

天門冬散

治肺痿癰熱鼻乾大便澀

天門冬去心 桑皮 升麻 大黃 枳殼炒

甘草各八分 荆芥一錢

水二盞煎八分食後溫服

牛夏湯

治熱熱神不守熱澀

牛夏湯 黃芩 軍薑炮 連志去心 茯苓

生地黃 酸棗仁微炒研各八分 黍米一合

長流水二盞煎八分食後溫服

利濕散

利濕散

利濕散

利濕散

利濕散

利濕散

利濕散

利濕散

利濕散

治脾肝火熱虛煩上喘咽喉生瘡

鵝蘆葉 藜蘆穗 防風 桂梗 甘草 人參
牛蒡子各一兩

右爲末每服二錢不拘時沸湯點服咽痛口瘡甚
加薄荷一兩

地黃煎

治痰熱

地黃汁四升三合 茯苓 知母 葛根各四兩

苦葶根 生薑汁 鮮地骨皮 生麥門冬汁
白蜜各一升 石膏八兩 竹瀝三合

右咬咀以水一斗煮一升先煮葶根取汁三升去
渣下竹瀝地黃麥冬汁緩火煎四五沸下蜜葶汁

數火煎至出六升初服四合日三服夜一服加至
五七合四五日作散服之

三黃丸

治大婦人三焦發熱上焦有熱攻衝眼目赤癰
頭項腫痛口舌生瘡中焦有熱心煩煩躁飲食不
美下焦有熱小便赤澀大便結結五臟俱熱即生
癰瘡瘰癧

黃連 黃芩 大黃各十兩

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服二十丸食後熱
水吞下腹脹煩滿加減小兒瘡熱亦宜服一方

用羅爲衣丸如豆大夜間嚥化一二丸亦好

白虎湯

知母六兩 石膏一斤 甘草二兩 粳米六合
右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日
三服

大黃散

治上焦熱而煩不能睡眠

山梔仁 大黃 礬石各半兩 甘草二錢半

右爲末每服五錢水煎溫服微利即已

柴胡升麻湯

生甘草 炙甘草各二錢 柴胡 升麻 葛根
羌活 獨活 人參 白芍各半兩 防風二錢半

右咬咀每服半兩水三大盞煎至一盞去滓稍熱
服忌冷物冰水月飲

火鬱湯

升麻 葛根 白芍 柴胡根各一兩 炙甘草
防風各五錢

右咬咀每服三四錢水一大盞入連翹葱白三寸
煎去滓稍熱服

本事方

治大人小兒五臟積熱煩躁多渴聲啞喉閉目赤
鼻衄結硬口舌生瘡

山梔仁 甘草 赤芍藥各一兩 大黃 砂礬
連翹 薄荷葉 乾葛各二兩

右爲散每服二錢水一盞半竹葉七片蜜三匙同
煎至七分去滓食後服

紫雪膏

瘧時氣毒遍內外煩熱不寐口中生瘡狂易叫走
瘧疫毒瘡卒近溫熱五尸五疰心腹諸疾疔刺切
痛及解諸熱藥毒熱熱卒黃等并解惡毒鬼魅野
毒熱毒又治小兒驚風百病

黃金一百兩 石膏 礬石 磁石 滑石

已上四味各二斤搗碎水一斛煮至四斗去滓入
下項

犀角屑 羚羊角屑 青木香搗碎 沉香搗碎各
五兩 元參洗乾搗碎 升麻各一斤 甘草剉炒

八兩 丁香一兩搗碎

已上八味入煎藥汁中再煮取一斗五升去滓入
下項

硝石四升如鹽七兩亦得每升重七兩七錢半
朴硝精者十斤

已上二味入煎藥汁中微火上煎藥水不乾不在
手候有七升投在水盆中半日欲凝下項

麝香當門子一兩一錢半研 硃砂飛研二兩

已上二味入煎藥汁中攪調令勻藥之二日石件藥
成霜雪紫色每服一錢或二錢用冷水調下大人
小兒以意加減食後服

神弓丸

一名顯仁丸治一切火熱

大黃 黃芩各二兩 赤牛 滑石各四兩

右爲細末水爲丸如小豆大溫水十九每服
加十九丸以利爲度日三服冷水下亦得或煉蜜丸
愈佳

富師龍腦湯

治暑水陰虛風熱濕積時疫驚悸傷風傷濕神志
不寧寒熱霍亂頭目昏眩肌肉刺痛惡寒瘧瘧
強不勝弱胃燥瀉小使瀉胃腸肌肉消瘦肢體羸弱
暗風惡病

當歸焙 龍腦草 大梔子 黃連 黃蘗

黃芩各一兩 大黃 蘆薈 青蘘各半兩
木香一分 麝香半錢別研

右爲末煉蜜和丸如小豆大小兒如麻子大生薑湯下每服一丸忌食熱物兼服防風通聖散

瀉心湯

治風熱壅盛

大黃 當歸 白芍藥 枳實 麻黃去節

甘草各一錢半 白朮三錢半

右作一服水一鍾生薑三片薄荷少許煎至一鍾去滓不拘時服

八正散

治火熱壅盛小便澀塞

大黃 瞿麥 篇蓄 車前子

生甘草各一錢 滑石二錢

右作一服水一鍾燈心二十莖煎至一鍾不拘時服

溫服加木香一錢尤佳

芍藥散皮丸

治火盛

芍藥 丹皮各一兩 當歸 黃連各半兩

右爲末滴水爲丸如梧櫚子大每服三十九丸熱水下食

大金花丸

治火熱壅盛

黃連 黃芩 大黃各等分

下加梔子減大黃名梔子金花丸

又方

治心經蓄熱夏至則其黃連一兩 木通一兩半

右爲末用生薑汁煮糊爲丸如梧櫚子大每服三十九食後用煎心湯下日三服

普濟散

治一切煩熱咽喉口舌生瘡心中煩躁致咽閉壅塞及天行時熱發聲昏憤

芒硝 硝石 硝石 馬牙硝 青黛 石膏

寒水石水研飛 甘草各等分

右將甘草煎湯一升去滓即入諸藥再煎用柳木棍不住手攪令消藥得所却入青黛和勻傾入砂

盆內候冷結成錠研爲細末每用少許噴化津

嚥不拘時候如覺喉閉塞不能吞物者即以小便

竹筒吹藥入喉中即愈

妙功藏用丸

治熱甚嘔噦不食痿弱難連血虛血洩瀉大小便

閉不通或泄利三焦變滯傷化失常通宜服之

大黃 黃芩 黃連各半兩 川芎 黑牽牛各一

兩 官桂去皮三分 防風一分 滑石 木香各

二分

右爲末滴水爲丸如小豆大每服二十九或三十

丸生薑湯下日三服溫水亦可

左歸飲

此壯水之劑也凡命門之陰衰陽勝者宜此方加

減主之

熟地三錢或至一二兩 炙甘草一錢 山藥

枸杞各二錢 茯苓錢半 山梔一二錢

水一鍾煎七分食遠服

如肺熱而煩者加麥冬二錢

心熱而躁者加元參二錢

脾熱而嘔者加芍藥二錢

腎熱骨蒸多汗者加地骨皮一錢

血熱妄動者加生地二錢

陰虛不寧者加女貞子二錢上黃下虛者加牛膝

二錢以導之

右歸散

此益火之劑也凡命門之陽衰陰勝者宜此方加

減以主之治陰勝格陽真寒假熱等證宜加薄芩

一錢煎成用滾水浸冷服之尤妙

熟地八兩 山藥炒 山藥各一錢 枸杞

杜仲黃蘗各二錢 炙甘草 肉桂各二錢

製附子一二錢

水二鍾煎七分食遠服

左歸丸

治真陰腎水不足眼花耳聾口燥咽乾津液枯涸

等證

熟地八兩 山藥炒 枸杞 山藥 菟絲子製

鹿角膠碎炒珠 龜板膠碎炒珠各四兩

牛膝酒洗蒸熟三兩 右先將熟地蒸爛將膏加煉蜜丸梧子大每食前

用滾湯或淡鹽湯送下百餘丸

如真陰失守虛火上炎者宜用純陰至靜之劑於

本方去枸杞鹿膠加女貞子麥冬各三兩

如火鍊肺金乾枯多嗽者加百合三兩

如夜熱骨蒸加地骨皮三兩

一陰煎

此治水虧火盛之劑故曰一陰凡腎水真陰虛損而脈證多屬火發熱及陰虛動血等證

甘草一錢 熟地三五錢 生地 芍藥 麥冬

丹參各二錢 牛膝一錢半

水二鍾煎七分食遠溫服

如火發煩躁者入真龜膠二三錢化服

如汗多煩躁者加五味子十粒

如見微火者加女貞子一錢

如虛火上冒或吐血或衄血不止者加澤瀉二錢

錢舊根二錢或加川續斷以還之亦妙

加減一陰煎

治證如前而火之甚者宜用此方

生地 芍藥 麥冬各二錢 熟地三五錢

炙甘草五七分 知母 地骨皮各一錢

水二鍾煎服

如煩躁熱甚便結者加石膏二三錢

如小水熱澀者加梔子二錢

如火浮於上者加澤瀉二錢或黃芩一錢

抽薪飲

治證凡火熾盛而不可補者

黃芩 石膏 木通 梔子炒 黃蘗各二錢

枳殼 澤瀉各錢半 細甘草三分

水一鍾半煎七分食遠溫服內熱甚者冷服更佳

如熱在經絡肌腠者加連翹天花粉以解之

熱在血分大小腸者加槐花黃連以清之

熱在陽明頭面或煩躁便實者加生石膏以降之

熱在下焦小水痛澀者加草龍驪車前以利之

熱在陰分津液不足者加門冬生地芍藥之類以滋之

熱在陽胃便結者加大黃芒硝以通之

從薪飲

治三焦火一切內熱漸覺而未甚者先宜清以此劑其甚者宜抽薪飲

陳皮八分 黃芩二錢 麥冬 芍藥 黃蘗

茯苓 丹皮各一錢半

水一鍾半煎七分食遠溫服

清膈煎

治痰因火動氣壅喘滿內熱煩渴等證

陳皮錢半 貝母散破二三錢 薤白二錢

海石 木通各二錢 白芥子五七分

水一鍾半煎七分溫服

如火盛痰不降者加重便一小錢

如熱及下焦小水不利者加梔子一錢半

如熱在上焦頭面紅赤煩渴甚者加生石膏二三錢

如痰火上壅而小便不利者加澤瀉一二錢

如痰火閉結大便不通而氣脹滿者加大黃數錢

或研硝一二錢酌量用之

玉女煎

治水動火盛六脈浮滑大少陰不足陽明有餘

煩熱乾渴頭暈牙疼失血等證如神若大便溏泄者乃非所宜

生石膏三五錢 熟地三五錢或二兩 知母

牛膝各錢半 麥冬一錢

水一鍾半煎七分食冷服

如火之極盛者加梔子地骨皮之屬亦可

安胃飲

治胃火上衝嘔逆不止

陳皮 山梔 麥芽 木通 澤瀉 黃芩 石膏

水一鍾半煎七分食遠服服清實者加石膏

太清飲

治胃火煩熱發熱嘔吐等證可與白虎湯出入酌用

知母 石膏 木通各錢半 生石膏五七錢

水一鍾半煎七分溫服或冷服或加薑門冬

葉豆飲

凡暑得勞熱諸火極熱不能退者用此最妙

甚豆不拘多寡煎湯煮糜服

右入單少許或重亦可待水冷或厚或稀或煮任

意飲食之口既三四次不拘此物性非苦寒不傷

脾胃且善於解暑除煩大制小水乃淺易中之最

佳最捷者也若火熾口乾不宜厚味但略煮生熟

清湯令飲之尤善除煩清火

玉泉煎

一名六六散治陽明內熱煩渴痛二便澀

結渴及斑黃及熱痰喘嗽等證功倍金元散

生石膏六兩 粉甘草一兩

右為極細末每服二三錢新滾水或熱湯或人參湯調下加陳砂三錢亦妙

雪製藥

解煩熱除陰火此生津止渴之妙劑也

雪梨用清香甘美而大者削去皮

別用大碗盛清冷甘梨將梨薄切浸於水中少頃

水必甘美但須飲其水不食其食退陰火極速也

滋陰八味丸

治陰虛火盛下焦濕熱等證若變丸為湯即名滋

陰八味煎

熟地八兩桑螵 山藥 山萸肉各四兩 丹皮

茯苓 黃蘗鹽水炒 知母鹽水炒 澤瀉各三兩

右如煉蜜湯丸梧桐子大或空心或午前用滾白

水或淡鹽湯送下百餘丸

化肝煎

治怒氣傷肝因而氣逆動火致為煩熱脅痛脹滿

動血等證

土貝母三錢 青皮 陳皮 芍藥各二錢

丹皮 梔子炒 澤瀉各錢半

水鍾半煎八分食遠溫服火盛加黃芩一二錢

清化飲

治血熱妄行陰虧諸火不清等證

芍藥 麥冬各二錢 丹皮 茯苓 黃芩

生地各三錢 石斛一錢

水一鍾半煎七分食遠溫服

如骨痛蒸多汗者加地骨皮一錢半

熱甚而渴或頭痛者加石膏一二三錢

下熱便溏者加水通一二錢或黃蘗梔子皆可隨

單方

虛熱作渴桃膠如彈丸大含之佳

大熱心悶桃膠末酒服方寸匕

煩躁熱渴久不止葛根半兩水煎服

老人風熱內熱目赤頭痛視不見物石膏三兩竹葉

五十片沙糖一兩梗米三合水二大盞煎石膏竹葉

去查取二盞飲入糖食

風熱攻手拍赤腫麻木其則攻肩背兩膝遇暑熱則

大便祕牛膝子三兩新豆豉炒羌活各一兩為末每

服一錢白湯下

兩上煩熱多渴宜利九鞭滑石二兩搗末三三盞煎

二盞去渣入粳米煮粥食

乳石發動煩熱渴滑石粉半兩水一盞緩白汁煎

服

三焦微熱元參黃連大黃各一兩為末煉蜜丸梧子

大母服三四十九白湯下小兒九藥米大

鍼灸

素問曰肝熱病者小便先黃腹滿多臥身熱熱爭則

狂言及驚前滿痛手足雖不得安臥庚辛甚甲乙大

汗氣逆則寒手足則死刺足厥陰少陽其逆則頭痛員

脈引而頭也

心熱病者先不寐數日乃熱熱爭則卒心痛煩悶者

鳴頭痛面赤無汗手足其西丁大汗氣逆則主寒死

刺手少陰太陽

脾熱病者先頭重煩煩煩心煩背欲嘔身熱熱爭則

腰痛不可用仰仰腹滿脇痛甲乙甚戊己大汗

氣逆則甲乙死刺足太陽陽明

肺熱病者先漸熱乾起毫毛惡風舌上黃身熱熱

爭則喘欬滿走胃脘胃不得大息煩滿不舉汗出而

寒丙子甚庚辛大汗氣逆則丙丁死刺手太陽陽明

出血如大豆立已

腎熱病者先腰痛溺黃苦渴數飲身熱熱爭則項痛

而強筋寒且癢足下熱不欲言其逆則項痛員背澀

然然戊己甚壬癸大汗氣逆則戊己死刺足少陰太

陽諸汗者至其所勝日汗出也

肝熱病者左額先赤心熱病者腹先赤脾熱病者鼻

先赤肺熱病者右額先赤腎熱病者額先赤銅雖未

發見赤色者刺之名曰治未病然病從部所起者至

期而已其刺之反者三周而已重逆則死諸當汗者

至其所勝日汗大出也

諸治熱病以飲之寒水乃刺之必寒水之居止寒處

身寒而止也

熱病先背脊痛手足雖刺足少陽補足太陰病者

為五十九刺

熱病始於臂痛者刺手陽明太陰而汗出止

熱病始於頭者刺項太陽而汗出止

熱病始於足脛者刺足陽明而汗出止

熱病身先重骨痛且聾好眼刺足少陰病甚為五十

九刺

熱病先眩目而熱骨痛刺足少陰少陽

太陽之脈也榮氣熱病也榮未交日今且得汗待

時而已與脈脈脈見者死期不過三日其熱內連

野少陽之派色也

少陽之脈色榮煩熱病也榮未交曰今且得汗待時而已與少陰脈爭見者死期不過三日

熱病氣六三樞下間主胃中熱四樞下間主高中熱五樞下間主肝熱六樞下間主脾熱七樞下間主腎熱

榮在脈也項上三樞陷者中也

頰下逆額爲大瘰下牙車爲腹滿頰後爲脅痛項上者局上也

古今醫統曰兩手大熱爲胃厥假在大中灸涌泉穴五壯立愈

導引

保生祿要曰諸痛在諸動皆屬心火常呵以搜其火既以和其心諸心切勿食穢氣屬其靈夏至夜半後地氣陰生大熱勿食冷受寒氣亂侵更忌房中事元氣漸虧門大抵皆暑火甚於黃心則愈思思時常飲六一燈心湯豆蔻香椿木飽醉勿煩風前此則無患矣
手足火燒處應推散想水洗之

醫案

儒門事親曰一叟年六十值役煩擾而暴發在口鼻覺如蟲行兩手爬癢數年不已醫人診其口手脈皆洪大如繩總數曰口爲飛門胃爲竇門口手者胃之上源也鼻者足陽明經起於鼻交頰之中旁約太陽下循鼻柱交人中環唇下交承漿故其病如是夫微役煩擾使爲火化火乘陽明經發狂故經言陽明之病登高而歌棄衣而走罵言不避親疎又况肝主謀膽主決低微迫速則財不能支則肝膽謀而膽慮不能決則無所伸忍無所忍心火熾燄遂乘陽明經然胃本屬土而肝膽木鬱爲相火火隨木氣而入胃故暴狂狂乃命靈變室中通而汗出如此三次內經曰木鬱則達之火鬱則發之是也以調胃承氣湯半斤用水五升煎半沸分作三服大下二十行血水與糞相相而下數升取之乃康以通聖散調其後矣

麻先生妻嘗七月間病臟結滑泄以去濕降火之藥治之精盡後腹脹及乳痛狀如吹乳頭重壯熱面如渥丹寒熱往來噤乾乾逆胃胃痛不能轉側耳鳴食不可下又復渴余欲瀉其火臟腑已潰數日矣欲以溫劑止利又禁上焦已熱實不得其法使人就諸葛寺禮請數人載人未至因檢劉河間方惟益元散正對此症能降火解表止渴利小溲定利安神以青絲蒲荷木酒一升薑之板石使作數大服之夜半通身出冷汗如洗元覺足冷如冰至此大瘰頓輕脫涼諸症定止止止及載人至余告之已解載人曰益元固宜此是少陽證也能使人寒熱頓愈絕無有

寒熱亦不至甚既熱而有瀉不欲再下何不以黃連解毒湯服之乃令診脈脈人曰緩子痛來心常欲嘔哭爲快合給曰買欲知此余亦不知所謂脈人曰少陽相火凌燒肺金受火氣而制無所投生肺主悲悲欲嘔哭而爲快也

先生曰余素諸親無不敬服厚初洪數有力服益元散後已平又聞脈人言始以當歸芍藥以解暑中數服服之大效矣
李氏親日常亦至壬子年火運年又其年病目者往往暴盲連火來烈故也民能定是年目大發遂遇載人以瓜蒂散散之亦立消不數日又入發其病之說皆發亦左之右亦實應子再滿之又遇凡五交亦五次皆滿又刺其子中出血及項上鼻中皆出血上下中外皆方方能退退不數觀書及見日張云當候秋涼再攻則愈火方旺而在皮膚雖攻其裏無益秋涼則熱漸入裏方可擒也惟宜痛處閉目以養其神水暗而靜爲水明與動爲火所以不宜見日也蓋民能因初愈後曾冒暑出門故痛連發不愈如此

滿泄之後不可常攻後服風乾子以退熱
載人之子自出家之後日漸羸瘦語如覺中出此病在中也常發第二指大寒此心火也約今數日飲冰甚服涼劑載人曰惡寒則愈矣其母憐其大寒載人罵曰汝親也吾用藥如鼓之應桴尚涼涼宜乎世俗之諺我也七月服冰不飲病日瘳矣

趙平尚家一男子年二十餘歲病口中氣出臭如登廁雖說咸與甘與對載人曰脾金主腥金爲火所煉火主焦臭故知是也入則成腐腐者皆也此驚極

則反漿水化也病在上宜涌之先以茶調散涌而去其七分夜用舟車丸清川散下五七行其目而鼻翳鳴呼人有病口鼻而唇其老者世訛以為肺系偏而與胃相通故莫此妄論也

薛氏醫按曰余素得受生觀書久則倦意必服補中益氣加麥冬五味酒炒黑黃藥少許方覺精神清安否則夜間少寐足內酸熱若再良久不寐腿內亦熱且兼腰內筋似有抽痛意致兩腿左右頻移展轉不安必至倦極方寐此勞傷元氣陰火熾虛下注丁酉

五十一歲齒縫中有如物塞作脹不安甚則口舌如有瘡然日補益甚若應良久或服前藥始安至辛丑時五十有五晝間齒縫中作脹服補中益氣一劑夜間得寐至壬寅有內熱之變日間雖服前藥夜間齒縫亦脹每至午前諸齒并肢體方得稍健午後仍脹觀此可知血氣日衰治法不同

大尹倪支山因怒頭暈時或寒熱日脯熱其此肝火筋脈氣虛頭暈用八珍加柴胡山梔牡丹皮二十餘劑而愈

職坊王用之喘嗽作渴面赤鼻乾余以為肺肺有熱用二陳加本連山梔桔梗麥門而愈

尚寶劉毅齋怒則太陽作痛用小柴胡加茯苓山梔以清肝火更用六味丸以生腎水後不再發大司馬許澗谷在南鎮台時因勞發熱小便自遺或時不利余作肝火陰挺不能約制午前用補中益氣

加山藥黃蘗知母牛膝服地黃丸月餘諸證悉退寓意曰吳邵官得腹痛之病徹夜叫喊不絕小水全無以米連湯加元胡索投之始安又因傷食後反

病生二十餘日肌肉瘦削眼胞下陷纔得略寧適遭家難遽變壯熱目紅腮腫全似外感有餘之候余知其為激動真火上炎令服六一味地黃加知藥三十餘劑其火始退退後遍身瘡瘍黃腫腹中急欲得食不能少耐片頃整日哭煩余為驚其母曰旬日後腹稍充氣稍固即不哭煩矣服一交膏而全瘳此極難辨治之證竟得相保不失快哉

欽定古今圖書集成博物彙編醫部全錄

第百五十八卷目錄

醫部彙考二百三十八

瘧門一

黃帝素問五藏生成篇

靈樞經

孫思邈千金方

朱肱活人書

嚴用和濟生方

劉完素六書

張從政醫門事親

朱震亨心法

格致餘論

平治會萃

虞博醫學正傳

戴思恭治法要訣

樓英醫學編目

王梅明醫鑑

李梴醫學入門

李中梓醫宗必讀

趙獻可醫貫

醫部彙考二百三十八

瘧門一

黃帝素問

至原要六論

太陰在泉濕淫所勝民病飲積心痛

太陰在泉辰戌歲飲積心痛寒濕上病也

太陰之勝濕勝則濕氣內鬱飲發於中附腫於上

太陰之復濕變乃奉飲發於中

此火上相合而淫於戊午以前獨勝者陰濕之

氣復勝於歲半以後濕氣在中故內鬱而迫於下

焦飲發於中附腫於上者大邪之從下而中而

上也復者謂受所勝之氣勝制變極而復發

五常政大論

太陽司天溫氣變物水飲內積

太陽司天則太陰濕土在泉故生水濕之病

六元正紀大論

太陰所至為積飲否隔

此春病之常也

太陰所至為積滿

此夏病之常也

少陰司天之政四之氣民病飲發

感溫熱之氣故飲發

土鬱之發民病飲發注下

皆感濕土之氣而發

氣交變大論

歲土太過雨濕流行腎水受邪其則飲發中滿食減

在地濕土在天為濕故諸邪之歲土運太過雨

濕流行飲者脾氣不能轉輸而為痰飲水飲也中

滿食減土虛而不能主化也此淫土甚則反虛其

本位而自傷故於四季之十八日土氣得位之

時而反變生此病也

重經

陰疾診尺篇

尺膚粗如枯魚之鱗者水飲飲也

如枯魚之鱗者皮膚是寒寒也寒者水之氣此

水邪次飲於內故寒者見於外也

痰飲

問曰大飲有四何謂也曰有痰飲有澼飲有支飲

問曰四飲何以為異師曰其人素盛今瘦水走腸間

澼澼有聲澼之痰飲飲後水流在脅下飲即痛兩

之懸飲飲水流行歸於四肢當汗出而不汗出身

疼重謂之澼飲飲逆倚息氣短不得臥其形如腫謂

之支飲

水在心心下堅築短氣身重不欲飲水在肺吐涎沫

欲飲水在脾少氣身重木在肝胃下支滿腹而痛

水在腎心下悸

夫心下有留飲其人背寒冷如掌大

留飲者下痛引缺飲飲則嘔已

判中有留飲其人短氣而渴四肢酸疼頭痛或沉者有

留飲

膈上病痰滿喘咳吐痰則寒熱背痛腰膝日流自出

證而治之可服清風去熱導滯化痰如通聖加牛夏
導氣之劑豈不妙哉如折暴風疾者形寒欲冷無痰
者火盛制金濕痰者停飲不散可服加連龜板子
除溫丹無幾散亦有消痰者解每三聖丸上之五者
食遠可用漢防己丸并砂運而用之若依法服之沒
有神效

吐法

痰在胃脘之上大滿大實非吐安能得出仲景曰大
法春宜吐蓋春時陽氣在上人氣與邪氣亦在上故
宜吐也涌吐之藥或丸或散中病即止不必盡劑過
則傷人然則四時有急吐者不必直待春時也但仲
景言其大耳耳今人不得此法遂廢而不行試以名
方所記者略數之如仲景傷寒論中以蔥白豆豉湯
吐頭痛枳實白朮湯吐便後瓜蒂散吐傷寒六七
日因下後腹滿無汗而喘者本方稀瀉散吐鬱實中
滿痰厥夫言吐關緊閉如喪神守萬全方以蠶矢散
吐頭痛眩暈頭風惡心普濟方以追風散吐口噤不
關不省人事以皂角散吐濕瀉錄方以常山吐瘧
孫尚方以三聖散吐狂神驗方吐舌不正內經曰高
者越之玉冰白上盛不已奪而吐之仲景曰宿食在
上脘者當吐之又如飲飲酒積在上脘者亦當吐之
又曰病人手足厥冷兩手脈乍結以客氣在胃中心
下滿而煩欲飲水者如病在胃中當吐之今
用吐法者仲景方中瓜蒂散吐傷寒頭痛用蔥白
豆豉湯以吐頭痛頭痛或單瓜蒂散數名獨聖加茶末
少許以吐痰飲加全蠍稍以吐兩助助痛瀉瀉有
聲者內經所謂濕在上者以苦吐之其是之謂歟今

人亦有吐者然或中或否或涌而不能出或出而
不能止甚知上涌之注名曰搶奪搶之一字自有情
縱奪舒延有醫士謂一婦人半月不止遲至數月命
懸須臾食雖失計未予解之卒而歸者渴下咽止止
或謂瀉者何以止吐予謂之曰瓜蒂散隨服即死今吐
藥瓜蒂所以立解也如搶奪吐不止者解以蔥白湯
石桑吐不止者解以甘草黃芩湯惟草木吐者解以
麝香者之本草解之若寒者有豆豉瓜蒂茶葉地
子黃連苦參大黃辛苦寒者有鬱金常山藜蘆甘
苦而溫者有地黃汁苦而溫者有木香遠志厚朴辛
而溫者有薄荷花辛而溫者有殺精草葛根黃辛
而寒者有藜蘆粉辛甘而溫者有烏頭附子尖酸而寒
者有首烏藤葉薑汁酸而平者有銅綠甘酸而平者
有赤小豆酸而溫者有假蘇酸辛而寒者有膽酸酸
而寒者有白木飯辛酸而溫者有皂角其鹹而寒者
有食鹽其甘而寒者有牙粉甘而微溫者有參蘆
甘草而熱者有鹹猪乳此二十六味惟常山推鬱瓜
蒂有小毒驚風元花輕粉烏頭去不番外二十六味
皆吐藥之無毒者各別選擇而用之此法宜先少服
不滿漸次加之全之撥或者以氣散鉤鉤探引不出
以蠶矢投之投之不出再探之且投且探無不出者
吐至昏眩頭痛者飲以冰水止解如無冰小許沒水
亦可飲壯者一吐而安弱者可三四次吐之並無損
也有吐之天日頓快者石得吐者蓋吐之傷而未平
也候數日再當飽之如覺痛者動不風火及涼物皆
不忌惟食飽飽餓餓飽飽大之物大既降中脫
沖和陰虛必強大禁房事大受大怒謹守禁忌不信

洋言真知病難決可吐者然後吐之庶無全也
朱貴亭心法

痰病

脈浮當吐入得脈沉者雖開也必覺調理大凡治痰
用藥過多致脾氣虛則痰易生而多
因痰用香木白木然痰用香木然痰用香木然痰用香木然
拘牽牙山極風痰用兩星老痰用海石半夏苦杏仁
附五倍子作丸服痰在膈上必用吐法痰亦不能去
風痰多見奇難症痰多見危症飲若氣實痰熱結
在上者吐難得出痰清者屬痰一陳湯之類膠固稠
濁者必用吐熱痰痰風外證為多熱痰之食積者
必用攻之釐氣虛者用補氣藥送下痰因火盛逆上
者以攻火為先白木黃冬秋石膏之類
內傷快痰必用參芪白木之屬多用薑汁傳送或加
半夏虛痰如竹瀝中氣不足加參末
乘之為物隨氣升降無處不到脾虛者宜補脾氣清
中氣以運痰降下二陳湯加白木之類兼用升麻提
起
中焦有痰與食積而生病者胃氣亦賴所養卒不可
便攻若攻之盡則虛矣
痰成塊或吐咯不出覺氣鬱者氣濕痰熱者皆難治
痰在胸膈間者可下而愈在經絡中非吐不可吐法
中就有發痰之藥焉
假如稠粘因鬱而得痰則神出舍空則痰生也血
氣入在舍而拒其神不能歸源
血傷必用薑汁補之不能歸源
清痰非薑汁不能行經絡五倍子能治老痰佐藥

大治遺癰一陳湯一身之痰都治管如裏下行引引

下藥在上加引上藥

凡用吐藥五升提其氣便吐也如防風山芫川芎桔

梗芽本薑薑汁之類或可用瓜蒂散

凡風痰者必用瓜蒂散或白附子天麻雄黃牛黃汁

本屬醫治牙角之類

凡人身中下有塊者多是痰則其平日好食何物

吐下後方用藥

清淨土用膏木治痰成痰一過行極妙後換血

遂成痰藥

肢通臂離乃火動其痰用一陳湯加山芫子黃連黃

本之類隨氣吞酸此食體有熱火氣上動以黃本為

君兩星半夏為臣臣經為使使多加青蘆

痰在胃下非白芥子不能達痰在皮裏痰外非薑汁

竹瀝不能入用化痰藥加鹹藥飲堅之味苦寒仁杏

仁海石桔梗連翹佐以研以薑汁薑和丸噴服

海粉即海石熱痰能降濕痰能燥痰乾痰頑痰能

消可入凡子木子不可入煎藥相煎痰能衝癰倒

聲小胃丹治腸上痰熱風濕痰痰弱將諸痛能損胃

氣貪損痰實者用之不宜多參現凡能清痰

喉中有物咯不出噎不下此是痰重者吐之輕者

用香薷氣實必用脾濕

天花粉大能降胃上熱痰痰在隔間使人嘔吐或健

忘或風痰皆用竹瀝亦能養血與脾瀝同治治稍重

能食者用此一味效速速發一瀉治痰結在皮裏痰

外及絡絡中痰必在汗黃汁其治治血滯不行中焦

有飲自熱汗冷吃兩三銀毫必留中痰痰不事復愈

凡痰之為患為喘咳喉利吐逆喘促怔忡驚悸寒熱

瀉瀉瀉瀉瀉瀉或胃胃胃胃胃胃胃胃胃胃胃胃胃

痰水令四肢麻痺不仁皆痰飲所致善治痰者不治

痰而治氣順則一身之津液亦隨氣而順矣古方

治痰飲用汗吐下溫之法應見下若以順氣為先分

導大之王陽若云痰清白者為痰黃而濁者為熱不

却始則清白久則黃濁清白稀軟清於上黃濁稠結

凝於下嗽而易出則清而白狀而不能出則黃濁結

滯若略唾日久漸成惡味酸醜酸醜喉佳苦不

至帶血血敗則黑痰為關格異病人所不識又清白

者氣味淡日久者漸成惡味酸醜酸醜喉佳苦不

百病多有兼痰者世所不知人身中有結核不痛不

紅不作膿痰注也治痰法實脾土燥脾濕是治其本

格致核論

痰病似論

血氣有身之神也神既衰乏邪因而入理或有之若

血氣兩虧痰者中焦妨礙升降不得運用以致十二

官失其職聰聰言動皆有其虛妄以邪治之其人必

死肝哉冤乎誰任其咎蓋慕之子傳兄年一七八時

暑月因大勞而渴飲梅漿又連得大驚二四次妄

言見鬼病似邪鬼診其脈兩手皆虛弦而沉沉數子

曰數為有熱虛虛是大驚又梅漿之變變於中既補

虛清熱熱去痰清痰乃可安遂與人參白木陳皮茯

苓木連等藥調湯入竹瀝薑汁與服旬日未效眾皆

允差之不當余厭之知其虛未充與痰之未導也仍

與前方入刺瀉又旬日而安外弟咸一日醉飽復亂

言言語妄見陶之係伊兄兄附體言生前事甚乃

叔在邊陲之日非邪也乃食腥羶酒太過感所為耳

灌鹽湯一大碗吐痰二升汗因大作困睡一宵而

安又金氏婦壯年暑月起起歸婦姑適而生失失序

遂經醫自愧因成此癰言語失倫其又又又又又

句曰奴奴不足張君數而後余曰此非邪乃痰病也但

以補肺清熱導痰數日當自安其家不信遂數者

噴水而呪之旬餘而死既聞曰病非邪而邪之何

達至於死余曰昔月赴某外境熱熱辛辛辛辛辛

鬱然而尤有積痰加之憤悶其痰與熱何可勝言

今乃驚以法以法以法以法以法以法以法以法以

實其體密其膚使汗不得泄也汗不泄則熱熱內燔

血不得事則熱而熱不能獨立也不死何候或曰

外壅熱要有素因科痛可嚴乎曰移精氣氣乃

小醫耳可治小病者內有虛邪外有實邪實邪用正

之法自有成式然則可考然得木惟賴上發痰一叩

原木胃熱得之豈不痛快亦可取安若內虛而虛與

冬令嚴寒得水下咽必胃而致毒微微熱在上熱

邪在表須以汗解辛得清冷脾脾困困熱熱何由解

致內攻陰陽離散血氣並爭去死為近

平治奇解

痰病治法

吐法無用升升升升升升升升升升升升升升升

風祛便胃升升升升升升升升升升升升升升升

吐法用附子尖桔梗檀人參薑瓜蒂薑薑薑薑薑

等藥此皆自吐不用手探但舉湯可吐

吐法先以布搭膊勒腰於不通風處行此法薑薑子

半并搗和以漿水一梳過去粗人少油與黃蘗至半溫服後以雞卵探吐凡用藥須以桐油浸却以皂角水洗去泥膜乾用之
又法用蝦蟇數半斤人鹽巴鹽等物製汁先吃蝦蟇飲汁以劍刃引吐必須緊勒肚腹

明處博學正傳

痰飲論

內經曰諸氣鬱鬱皆屬肺氣蓋肺氣鬱則成熱熱盛則生痰丹溪曰自然成痰自積成痰痰挾血運成痰蓋此為痞痛喘滿胃之大病也王隱君曰痰證古今未詳方書雖有熱飲蓄飲支飲痰飲諸飲之異而莫知其為病之源或謂風日昏痰耳鳴或曰眼瞤動肩臂耳輪搖或曰四肢逆氣逆地似痛非痛或為齒痛喉痛牙痛汗瀝而痛痒不一或喉氣吞酸嘔逆噎噎或咽塞不利咯之不出噎之下不吐似瘧瘧形如破絮視現肉之類或心下如停水或心煩冷痛將作或憂鬱昏怪思慧之狀或足腕夜軟腿背辛痛或四肢骨節痠疼並無常所乃至手麻臂痛狀若掛閃或脊中有牽大塊如水之寒痛者或連身習習如蟲行者或眼淚滿口或古潮基為喉閉等證又或連項結核似瘰癧或或胃腹間如有二氣之雄噎塞煩悶有如煙氣上衝頭面烘熱或為失志顛狂中風癱瘓或為勞瘵風濕脚氣之候或心下怔忡驚悸如畏人將捕或喘嗽嘔吐或喉冷涎綠水黑水甚為肺癰者便膿膿破其為內外失病百端皆痰之所致也蓋津液既凝為痰飲而內湧上候於口燥乾流而下則大小便閉塞面如枯骨毛髮焦乾婦

痰飲論

人則經閉不通小兒則驚風抽搐治法宜先逐去敗痰然後虛實調理故製沉香滾痰丸為通治三焦痰飲之要藥也愚竊以其論證闕詳不問虛實而一概以峻藥攻之恐未中肯綮也蓋痰實有停滯病邪有淺深一或失于何以收效故丹溪曰治痰用利藥過多致脾氣虛則痰反易生又曰中使有食積與痰而生者胃氣亦相所養卒不可便攻攻盡則愈虛而氣弱矣痰症尤正可投之於形氣壯實與積聚固者若體氣虛弱者人決不可輕用
慈惠秘製治痰訣

停飲飲痰

飲凡有大惡寒者痰飲伏飲飲時六飲之一耳人病此而止口痰者皆停飲久未有不為痰多因氣道閉塞津液不通飲者清是痰溫積滯停滯則倒流逆上鬱濁矣痰無所不有若不速決清痰而欲治治已事之水而使之清是理也
凡為喘咳嘔吐眩暈心者怔忡驚悸熱痛腫痛腸塞閉或胃脘間滯滯有聲或背心一片如水冷皆飲之所致如木之壞有痰濁與痰飲善治痰者不治痰而治氣氣順則一身之津液亦隨氣而順矣並宜藥下降氣氣順痰消各半貼和煎或半小夏伏苓湯加枳實木香各半錢各五套凡或以五套丸科依分兩作飲下煎服丸九好平居無他事只有痰飲口或清或堅宜一陳湯小半夏伏苓湯或各開通謂之白丸九神丸此非特治痰也凡九甚聲喘咳先速即買青服藥水效者一生湯加木香半錢石頑痰氣逆上

不為藥解當自下利之宜五隔寬中散加半夏錢吞破散丸仍佐以半硫丸散大復便驅飲利不盡半硫丸當常服若人便先不困來自利及老人虛人宜利其小便宜小半夏伏苓湯改用自來而倍之或導痰湯加枳實半錢

痰飲飲而變生諸證不當為諸論舉妄言作名且以治飲為先飲消則諸證自愈有卒然昏悶口眼喎斜似中實非中四肢軟弱身如浮雲似虛而實非虛皆痰飲所為也又有發虛寒不能攝水致水邪溢上故作痰飲宜八味丸

其人素有痰飲流注何肯作痛宜星香散或導痰湯下五套丸

痰飲

凡有痰者眼皮及眼下必有微灰黑色目便知不待切脈眼黑而頰赤者熱痰也面大黃色亦熱痰也外惡心煩滿熱口乾思冷大便燥結小便赤熱久必生風或眩暈耳鳴眼花多痰虛治之而用熱藥服久必厥大實發大熱而中風可急下之眼黑而行走呻吟動輒難者入胃痰也其證煩憊骨節疼痛眼黑而氣短促者為四肢痰厥也左右關脈不見者腦中痰也亦可吐之而吐者消息下之凡人背上一條如線而