

卷四之六

瘍醫大全卷三十四

燕湖顧世澄錄江氏纂輯

諸瘡部

凡疔瘡楊梅結毒俱彙於此部中以便檢閱參治

疔瘡門主論

華元化曰疔有五色屬五臟紅屬心發於舌根青屬肝發於目下黃屬脾發於口唇白屬肺發於右鼻黑屬腎發於耳前以種類言之

孫真人千金方論疔瘡一十三種一曰麻子疔其狀肉起頭如黍米色稍黑四邊微赤多癢

石疔其狀皮肉相連色如黑豆其硬刺之不入肉微痛

出色黃大如錢孔形高者

曰火疔其狀如湯火燒灼瘡頭黑

水流出瘡形大小如匙面者

至十若滿三十六藥所不能治未滿三十六可治

大體硬

如錢孔頭白裏黑腐汁出中硬

治所傷可以藥

十三曰牛狗疔其狀肉色脆起搗不破已上疔瘡十三種初起瘡心先癢後痛先寒後熱熱定則寒多四肢沉重心

驚眼花若重者則嘔逆

狗二疔無所禁忌縱不醫治亦不害人其狀寒熱與諸疔不同故不殺人也凡疔起後背強瘡痛極甚不可忍者是

觸犯禁忌以此為辨

王肯堂曰疔之四圍有赤腫名曰護場為可治疔之四圍無赤腫名曰不護場不可治

醫錄之相東陽
編要用和全校

生一疔之外別處肉上再生一小瘡即是有應可用針挑破護場瘡四圍有赤腫生多瘡者謂之滿天星飲食如常頭痛身熱手足溫

陳實功曰疔瘡有朝發夕死隨發隨死誠外科證中迅速之病也凡治此證責在乎早如在頭面頭乃諸陽之首元陽熱極所致其形雖小其惡甚大再加艾炙火益其熱逼毒內攻反為倒陷走黃之證作矣既作之後頭面耳項俱能發腫形如胖尸七惡頓起治雖有法百中難保一二不可不慎正又曰毒發於心經者生為火燭疔多生心臟之俞募并之端唇口手掌指節或手足指初生一點紅黃小泡抓破痛癢非常左右肢體麻木心煩發躁言語昏憤

又曰毒氣發於肝經者生為紫黑疔多生手足腰脇筋骨之間或足大指初生便是紫泡次日破流血水三日後串爛筋骨痛苦楚眼紅目暗指甲純青睡語驚惕又曰毒氣發於脾經者生為黃鼓疔初生黃泡光亮明潤四面紅色纏繞多生口角腮顴眼胞上下及太陽正面之虞便作麻癢細急硬強重則惡心嘔吐煩渴乾噦又曰

毒氣發於肺經者生為白及疔多生手大指初生白泡頂硬根突破流脂水癢痛驟然易腐易陷腮損咽焦毛聳肌熱咳吐膿痰鼻掀氣急又曰毒氣發於腎經者生為黑靨疔多生耳竅胸腹腰腎及足小指湧泉偏僻軟肉之間初

生黑斑紫泡毒串皮膚漸攻肌肉頑硬如疔痛徹骨髓重則手足青紫驚悸沉困軟陷孔深目睛透露又曰紅絲疔起於手足節間初起形似小瘡漸發紅絲上攻手搏或攻大腿令人寒熱惡心嘔吐遲者紅絲至心常能壞人急

用針於紅絲盡處挑斷出血尋至疔上挑破插入蟾酥條膏蓋內服蟾酥丸發汗追出疔根得膿自愈又曰唇下疔又名馬口疔又曰手掌心疔又名擎珠疔又曰患疔經五六日不瘥目中見火光心神昏昧口乾心煩嘔吐

不足皆屬疔毒內陷均須速治

馮魯瞻曰疔者經曰膏梁之變蓋因膏梁之人皮厚肉密內多滯熱故變為疔然古方計有一十三種三十六疔之分總由臟腑積受熱毒邪氣搏於經絡以致血凝毒滯注於毛孔手足頭面各隨臟腑部位而發其形如粟米或痛

或癢漸至遍身麻木頭眩寒熱時生嘔逆其則四肢沉重心驚眼花經雖所載疔色有五以應五臟其實紫黑及黃泡者居多先癢後痛先寒後熱也宜內服發散解毒攻托之劑外敷拔毒菊葉蒼耳草之類大概疔已成膿則毒

以外洩可無他慮惟在初起最宜慎之疔毒攻心禍如反掌蓋疔由心火蘊結故其痛異常為害甚速病人口嚙生

豆不覺豆腥者即是也若於耳後方圓一寸發者尤甚蓋水枯火熾之極也不可妄動如抓破見風毒即內攻不救

銀針砭去惡血以藥塗之上者血紅次者血紫下者血黑若一失治則稽留不散輕則爛傷墜指重則入腹而死

又曰內經以白疔發於右鼻赤疔發於左鼻黃疔發於口唇黑疔發於耳門青疔發於目下蓋取五色以應五臟各有所屬部位更有發於或肩或背或腰或足發無定處如在手足頭面骨節間者最急其餘猶可緩也

李東垣曰疔上按之疼痛應心者是疔也秋冬寒毒久結皮膚中變作疔瘡不急治之日夜根長流大諸脈數通如箭入身顛掉不已若不慎口味房室死不旋踵精義

申斗垣曰夫疔瘡取治其法不一當先看其緩急如緩者一日瘡斂白色而小二日色白微大三日色微紫四日色真紫此候之緩也急者五日色青紫小六日色深青大緊七日色黑如火火瘡之狀此最急之候假如身上生一瘡

而他處又生一小瘡為之應候先用針挑破小瘡則泄其毒謂之可治若只有一疔他處無小瘡謂之無應候不可治疔無應候是毒氣之甚故不可治也大抵疔瘡四圍有紅赤破腫者名曰有護場如疔瘡四圍不赤腫者即是不護場不可治也有護場方可治也疔之生者身熱頭疼手足溫煖飲食如常是常疔也疔之危者眼轉大渴而喘唇

面青不進飲食五心腫無有脈四肢冷不起床不精神腹痛甚於常是有內疔也啟玄

周文米曰凡療疔瘡皆宜刺瘡中心至痛處又刺四邊十餘下令血出去盡惡血敷藥藥力得入針孔中方佳若藥不達中藥力難達反致誤事又看口中頰邊舌上有赤黑如珠子者是疔也集驗

養生篇曰人汗入肉食之則生疔瘡不可不慎

竇漢卿曰凡疔瘡針刺患人手足中指不痛者難治又曰如疔在頭面手足骨節間者甚急又曰疔瘡頭臨碧綠色者不可用針刀出血又曰疔瘡日久潰爛者不可用針出血只可用刀割去腐肉又曰疔瘡生根入腹者

便死用磨針刀鐵漿水一碗絲綿濾淨銀窩內煎三四沸服之病者須臾腸鳴行利一二次甦醒方妙又曰疔瘡不破則毒入腸胃惟蟬蛻極效用一兩為末蜜調下又曰疔發於太陽眼邊者名曰釘腦疔十死一生又曰疔瘡膿水出孔如蜂窠病易瘥也又曰凡人暴死多是疔毒急取燈燭照其身若是小瘡即是其毒宜急灸之並服

實夢麟曰：嘴唇痘疔初生米大，或粉刺擠破，入湯火風氣，即要變為疔瘡。疔瘡即疔之別名也。先用葱白同飛龍奪命丹五粒和嚼爛，熱酒半碗送下，以衣覆患處，略出汗為妙。上午服藥，下午即將絕利磁鋒劃破瘡口十字，即搽飛龍奪命丹末在內，而外用蟾古研爛，貼肚底皮貼之內服，追疔湯劑。若發鬚髮者，即剃去鬚髮，如前法治之。此法靜夜細思試而行之，百發百中，活人多矣。馮取目秘遂並梓行，病人一月內無色慾者，患處平安，無得肉乃其微也。金陳遠公曰：有生疔瘡者，疼痛非常，亦陽毒也。初生之時，入最難辨，但以生黃豆令嚼之，不知腥者便是其瘡頭，必發黃泡中，現紫黑之色，細看泡中必有紅白一線通出泡外。凡疔生足上紅線，由足入臍，疔生手上紅線，由手走心，如生唇面紅線，由唇面至喉，如見此紅線，即於盡處以針刺出毒血，則免毒攻心。若現白線，不必刺也。總以消毒瀉火為主。世人戒用官料之藥，此乃不知醫之語。毒非藥安得除哉？拔疔散治之。紫花地丁、甘菊花各一兩，水煎服一劑。紅絲除二劑，疔散三劑，全愈。不必外治。挑疔之多事也。若已潰爛，加當歸二兩治之，不必四劑。毒盡肉生也。冰蠟胡公弼曰：猪疔其形圓而小，口內有油，忌食猪油、猪肉。牛疔其形圓而小，口內無油，庖起，掘之不破，有寒熱忌食牛肉。狗疔其形長而帶尖，色赤，亦有寒熱忌食狗肉。羊疔其形長而帶白色，有寒熱忌食羊肉。瓜藤疔不計其數，其形圓長如瓜形，因食瓜毒而生。忌食諸瓜。豆腐疔其狀白泡三日內頂陷，因食豆腐內有人汗而生。忌食豆腐。氣疔其狀或大或小，皰白，如有氣在內，因感恚怒而生。忌氣惱。鬼疔其形大小不一，因中邪毒之氣而生。異於諸疔。比氣疔更甚，令人言語如見鬼狀。紅絲疔其形纒纒赤色，如絲線，周身纏繞，宜松針刺去血，忌熱物。內疔言其生於內臟腑上，腔子裡面，喉內口內與外疔更不同，利害宜托裡追疔。蘿蔔疔其形黑兼紫，如水晶，故名之。皰白黑血毒水宜去之，宜托毒。楊梅疔形黑紫如黃梅狀，若遍身楊梅瘡，內雜疔瘡一二箇，則令通身瘡不起。發須針刺出毒，服托裡土茯苓等藥。魚臍疔如魚之肚臍，多生臍膊肚小腹肚上，乃手足陽明經分毒氣治宜加引經藥。蜈蚣疔形長如蜈蚣，亦有頭足，發寒熱，因飲食中被蜈蚣咬走，遺毒於內而生。宜加雄黃。程山齡曰：治疔之法，貴在早，初起即治者十全十活，稍遲者十全五六失治者十全一二。內服莫妙，菊花與甘草湯頂之。以上三陽受毒，必用針刺挑斷疔根，搽藥膏，蓋頂之。以下三陰受毒，即當艾灸之，不痛亦須針刺，搽藥自

疔瘡門王方

菊花甘草湯治疔之聖藥也 白菊花四錢 甘草四錢 水煎服滓再煎服

反唇疔疔生唇下者是 經霜南瓜蒂煨灰加冰片少許研細麻油調搽

馬口疔疔生唇下者是 新鮮鱧魚血磨蟬酥塗之

拔疔法 巴豆去殼 磁石研 用葱涎和蜜為膏敷疔上

血疔出血不止者是 真蘇油一鍾服下自止

蟾酥餅 兼治腦疽乳癰附骨疽瘰癧一切惡症或不痛或大痛或麻木用此敷貼瘡頭 潮腦硃砂各一錢 蟾酥

酒沒藥各一錢 乳香各一錢 明雄黃各一錢 巴豆霜各一錢 輕粉各一錢 麝香各一錢 以上各為細末於五月五日午時在淨室中用蟾酥酒

和丸如菜豆大每用一丸口涎調貼疔瘡上以膏蓋之此藥為丸為條為餅聽便施用一方去巴豆霜潮腦加寒水石

煨枯礬胆礬各一錢 蝸牛二十一個

惡疔大毒 金銀花 當歸身各五錢 天花粉 甘草 地丁各三錢 皂角刺各一錢 川椒各一錢 酒煎服

疔毒惡瘡 家菊花並葉共搗汁用酒沖服將滓加鹽少許敷上立愈冬月用根亦可 又方 紫梗菊花搗碎白

酒煎服 又方 鮑魚鱗各一錢 荷花各一錢 辦夾好置書頁中過疔貼上即愈

大疔惡毒秘方 火硝 北煤各一錢 肉桂各一錢 出者各一錢 等分 研細末磁瓶收貯凡遇一切疔毒用陳寶糊紙水濕掩疔上再

以此藥敷之疔根自出

疔瘡神方 蒼耳草根葉搗爛入童子小便絞汁冷服一鍾日三服仍以根並葉苗任取一束燒灰存性為末用醋

泔盪散和如泥先將瘡中心及四邊刺破令血淌出拭淨敷上不過十次根即拔出為諸方第一

飛龍奪命丹正 專治疔瘡及癰毒發背腫發乳癰一切無名腫毒惡瘡及有頭不知痛癢者已成未成神效 蟾

酥雄黃各三錢 乳香各一錢 沒藥各一錢 銅綠各二錢 胆礬 硃砂 血竭 寒水石各一錢 當門子 水片 輕粉各五錢 牛

二十個 蜈蚣一條 酒浸各一錢 右俱為極細末用蝸牛連殼研如泥少加飛羅麝和丸如菜豆大每用三丸用葱白三

個令病人嚼爛吐於男左女右手心將丸藥放在蔥內熱酒送下被蓋約人行五六里出汗為效無汗以熱酒助

之重者再進一服病在上食後服病在下食前服忌冷水灰茄油膩猪雞魚麪及一切發物孕婦忌服

走馬回疔丹

疔瘡初起針破出血用此一粒插入孔內膏蓋之次後追出膿血疔根為效 硃砂 雄黃 各二錢 酥化 磁砂 白丁香 輕粉 各一錢 蜈蚣 一條 金頂砒 麝香 各五錢 乳香 六錢 右為細末糊和成粒如麥子大插瘡

內以膏蓋之

鉛粉散

冷疔生於脚上初起紫白泡疼痛徹骨漸至腐爛深孔紫血水氣穢經久不癒用此大效

黑鉛 四兩

適以鉛開入水中取起再化如此百

口油紙蓋好 度去水取澄下者三錢 松脂 一錢 黃丹 一錢 輕粉 各五錢 麝香 各二錢 共研極細先用葱湯洗淨麻油調擦瘡

東毒金龜散

疔瘡針刺之後癰毒走散作腫宜此藥糲之 生大黃 欝金 各一兩 白芨 白薇 白芷 各四錢 黃柏

兩 菜豆粉 一兩

輕粉 五錢 共為細末酸米漿調糲四邊夏熱甚蜜水調

消疔簡便方

疔瘡及諸惡毒初起但未成膿者服之神效 白礬 三錢 葱白 七錢 右二味同搗極爛分作七塊每

塊用熱酒一杯

送下服畢用厚被蓋之再進葱湯一鍾少頃汗出如淋從容去其覆物其病如脫此雖味澀難服

敷疔 銀珠 三錢 紅棗 七枚 煨爛

其效甚妙凡居鄉村之處遇有此症不及延醫只傳此方服之活人甚眾誠為良便方也

疔 甘松 三錢 雄黃 一錢 麝香 一分

酒水各半先煎甘松山柰煎好濾清調雄黃麝香服

紅絲疔

用銅錢捫起頭處將木上舊釘起一根用棉花包裹蘸相油點著令油滴錢眼內一滴即愈

疔瘡

生葱和蜜搗敷患處過一飯時疔即拔出

保生槌子

疔瘡背疽癰癤一切惡瘡 巴豆 四十九粒 硃砂 二錢 輕粉 半大 金脚信 雄黃 各二錢 麝香 一錢 為極

細末用黃蠟五錢鎔化將藥合成槌子冷水浸少時取出旋丸捏作餅子如錢眼大將瘡頭撥開安一餅子於頂

上上用膏貼

蟾酥丹

蟾酥不拘多少黃丹白 等分為丸如麥粒大針破疔瘡以一粒納之膏蓋

散疔膏

磁石乳細以葱頭十四根取汁入蜜少許調勻敷留一孔一敷即散妙不可言內服托裡藥

拔疔 螻蛄腹下有一點白者即心也先以針刺破疔頭再將針取出螻蛄心點疔頭上以膏蓋之半日間血出根拔而愈忌羊肉

一切疔腫人孫真 一色蒼耳草連根葉燒灰以醋脚泥調搗乾即再搗重者十次愈

喫牛肉中毒生疔 金絲重樓一枝七葉不拘多少切碎研細和溏雞屎調勻搗上立效

疔瘡怕動刀針 巴豆仁一粒飯一粒研貼瘡上立時拔出疔根再尋癰瘡取肝貼上亦效

諸疔 菊花葉搗汁服一碗死可回生

疔瘡已篤者二服即愈潘霞 上蜂房具 蛇蛻一條 黃泥固濟燒存性為末每空心好酒服一錢少刻大痛痛止

其瘡已化為黃水

爛頭疔 白梅一枚 大蜈蚣二條 白菊花一把 共搗爛加透明雄黃同敷如乾再另敷一二遍無不愈者

紫馬疔 切不可食肉生白酒煎豬鬃發草紫花地丁車前草服之

追疔奪命湯赤水 羌活 甘草節 蟬蛻 川黃連 獨活 北細辛 青皮 金銀花 防風 澤蘭葉 殭

蚕 金絲重樓 赤芍各等 有膿加 何首烏 白芷 要通利加 大黃 牽牛 青木香 山梔 毒在

下加 木瓜各等 每服五錢先將一貼加澤蘭葉金銀花各一兩薑十片煎熱服汗出為度病退加大黃二錢

煎熱服取利一二去餘毒為妙此方取效如神百發百中若心煩嘔吐用甘草節萊豆粉各等分酸漿湯調下

二錢如嘔逆惡心用乳香萊豆粉各等分甘草湯調下二錢

小奪命散 治疔瘡及腦疽惡毒其效如神 槐花子 地丁 千頭子即掃帚子又名 水煎通口溫服加真蟾酥

少許尤妙

拔疔丹一名疔毒散 凡一切疔瘡無名腫毒初起磨敷已成已潰用一粒放瘡口上膿血即拔出如遇陰疽對口

大症可用十數粒鋪瘡上如神 巴豆霜 乳香法沒藥法 真蟾酥乳酒化開 明雄各二 樟冰 露蜂房陰陽瓦 辟

疔砂各一 真輕粉 當門子各五 右乳極細照分兩各稱準和勻以蟾酥膏和杵為丸如藥珠大晒乾磁瓶密貯任用小此即露蜂房也

疔瘡凡馬騾功得自盧成瑛傳專治一切疔瘡兼治濕痰流注梅瘡初起 巴豆仁去皮明雄 生大黃各三錢 共研細末

加飛麝醋打糊為丸如金鳳花子大每服二十三丸熱湯送下瀉三四次無妨弱人只服十九丸自消得嚏即愈

鬚行紅絲疔面白疔腫脹至目與鼻俱隱入肉裡才關緊急 昔有一道人用患者耳垢齒垢刮手足指甲屑和勻

如菴豆大放茶匙內燈火上炙少許取作丸將銀簪將疔頭挑開抹入用棉紙一層津濕覆之痛立止半日可

開腫已消半次日服活命飲二劑遂愈 血疔或生肘下或生眼角疔有一竅如針眼淌鮮血不止 真香油四兩無灰酒不拘多少和勻熱服其血立止隨

用野菊花濃煎常服切忌茶湯 萬靈奪命丹 治一切疔瘡入腹煩悶惡心兼治癰疽發背惡瘡 硃砂水飛蟾酥人乳輕粉 胆礬各五錢 血

竭各一兩雄黃 枯礬各二兩 共為細末麝糊丸芡實大每服一丸令病人先將葱白三寸嚼爛吐在手心將丸包

在葱內熱湯吞下出汗 疔生磁石錢麝香分 研極細每用少許膏蓋 又方 胡椒二十粒大獨蒜一箇葱白三根 共搗爛油紙上作

膏貼之神驗 秘方 用鐵釘放屋上受風霜之氣日久上鏽以刀刮下乳極細加麝香少許磁瓶密封如遇疔瘡已破者搽少許

即流黑水不過三次疔根自出如未破者以水調點疔上即可拔疔如神 疔瘡不用刀針針針 草麻仁四十九粒銀珠分 共研細如乾加唾津少許疔頭讓出即週圍敷之兩三次即出小黃頭

拔疔第一方針針 草麻仁四十九粒杏仁七粒松香二兩荔枝肉三個銀珠許 共搗成膏貼之 拔疔根針針 荔枝肉一枚 溲雞屎 菊花根葉多 共搗爛敷上立愈 又方 鱗魚鱗貼之

水疔門主論 凡人手足一時生出小瘡四圍紅赤中間一點漆烏堅硬如石痛不可忍者名曰水疔破後惟流血水歲玄

水疔門主方 治水疔 土牛膝不拘多少搗爛入鹽少許和勻敷疔上半日即愈 又方 陳壁土 食鹽各一錢 雄黃二錢 共

治水疔 土牛膝不拘多少搗爛入鹽少許和勻敷疔上半日即愈 又方 陳壁土 食鹽各一錢 雄黃二錢 共

治水疔 土牛膝不拘多少搗爛入鹽少許和勻敷疔上半日即愈 又方 陳壁土 食鹽各一錢 雄黃二錢 共

治水疔 土牛膝不拘多少搗爛入鹽少許和勻敷疔上半日即愈 又方 陳壁土 食鹽各一錢 雄黃二錢 共

治水疔 土牛膝不拘多少搗爛入鹽少許和勻敷疔上半日即愈 又方 陳壁土 食鹽各一錢 雄黃二錢 共

治水疔 土牛膝不拘多少搗爛入鹽少許和勻敷疔上半日即愈 又方 陳壁土 食鹽各一錢 雄黃二錢 共

研末極細津水調敷疔上其疔自落

紅絲疔門主論

水疔 五月五日午時採錦蒼草搗細末酒調服三錢取汗 又方 荔枝肉一枚貼疔上以生白酒飲醉取汗

胡公弼曰紅絲疔一名急疔生於手足肘腕之間初起如黃豆大色似緋袍此疔根行如箭日夜行一尺二寸狀如紅絲線一般皆因大喜大怒氣血逆行所致走入心腹令人悶亂不救凡遇此等急症尋見紅絲之處即用神針針斷其根針入四五分取出紫黑惡血急服追疔奪命丹隨飲浮萍酒立愈

紅絲疔門主方

浮萍酒 治紅絲疔一服即愈 浮萍不拘多少搗爛用好酒一觔或半觔煎滾沖浮萍內半時許通口服隨嚼浮萍草數疔上

楊梅瘡



楊梅瘡門主論

陳實功曰楊梅者又名時瘡俗名魚瘡因其形類楊梅耳總由濕熱邪火所化先從上部見之皮膚作癢筋骨不疼其形小而乾者是氣化傳染乃脾肺受毒毒在皮膚不曾傳表為輕宜萬靈丹發汗自解先從

下部見之筋骨多疼小水澀淋其形大而硬者是精化慾染乃肝腎受毒毒在骨髓未透肌膚為重宜九龍丹以瀉骨中之毒須內毒已解筋骨不疼瘡根淡白方可搽藥若求速效妄用藥薰擦必貽後患醫家病家均慎重之 馮魯瞻曰楊梅瘡者因形相似而名之也凡氣受之而得者堅實凸起又名棉花瘡若血受之而得者其形扁塌而潰又曰菓子瘡皆類其像而俗呼之北方名曰天泡瘡雖名異而實同然治療須別凡自致者重傳染者輕淫慾太妄以致陰虛先見及縱口恣味三焦腎熱精竭血結遺滯諸經而成也傳染者中氣不足外染稍輕然患此者切不可用毒物發之亦不可用涼藥遏之並求速效須用煎藥解毒補益托散外用煎藥洗浴仍以膏藥搽貼拔毒出外方無後患 錦囊

申斗垣曰陰楊梅毒與陽楊梅毒大不相同陰楊梅毒色紅而不起不破乃血中受風熱之毒又云男子受婦人梅毒毒穢起相感而生故又曰翻花楊梅毒是表虛毒氣猖獗而成又曰楊梅豆子是毒氣之微感之輕也又

曰楊梅癰是患瘡時食羊牛肉或洗浴當風抓癢有犯房德致令渾身腥臭或乾而起白屑或腥水淋漓治當分氣血身之上下多少又曰楊梅毒食猪腸藏致令愈後復生楊梅圓子瘡也

陳達公曰有嫖妓戀爐酣戰覺馬口間如針刺痛此毒氣已過也未幾生魚口矣生疳瘡矣偏身生瘡矣黃膿汎濫

具腐不堪人以爲毒盛多用敗毒之味不知日事敗毒而毒益盛瘡益多有腐爛而死者夫楊梅之毒中於泄精之

時必元氣虧損故毒乘虛而入若元氣大旺毒難深入即有傳染不過輕微之毒可一瀉而痊遍身毒瘡乃大虛而

毒深中也不補虛而瀉毒何能奏功乎若止服敗毒無異下石矣二生湯生黃芪土茯苓各三兩生甘草三錢水煎

服四劑瘡漸紅又四劑乾燥又四劑全愈此方不去解毒只宜黃芪補氣氣壯邪自難留得甘草之化毒土茯苓之

辨語云

胡公弼曰楊微瘡又名砂仁瘡其患皆因色慾過度染受穢汚惡毒或先患下疳或先患橫痃然後始發此瘡此瘡

將萌于掌心隱隱當見紅點治之者切不可苟圖財帛暗用輕粉等藥隱之梅毒一服輕粉如油入麵毒入筋骨而

莫能解也不但終身骨中疼痛結毒潰爛上至五官頭顱下至玉莖元首蝕蝕無存噫輕粉之為害可勝道哉患此

瘡者亦不可畏人物議而求速效醫者當盡發其毒使之外出務使永無遺患無愧又曰有患楊梅毒遍身獨有

一二個形色紫黑如葶梅疼痛特甚多令通身瘡不起發此乃楊梅疔也即如痘疔阻遏不能起發行變無異須用

針刺出血服托裏土茯苓等劑又曰楊梅漏初起似肉泡其人起薄皮層層揭去直揭至三四十層方能穿破宜

服人參耆苓湯毒未穿不用膏藥如已破貼梅漏膏待肉平去膏藥

將示吉曰總之楊梅毒宜發不宜遏貴在除根莫求速愈得其旨矣說的

廣筆記云有以水銀舊磁搽搽五心醫楊梅毒致令患者三日間舌爛齒脫喉潰潰氣滿室吐出腐肉如猪肝色二

便不通湯水不入腹脹幾死證已危急矣醫斯證者須以手按病人之腹不痛者知雖脹未堅毒未及心其毒尚淺

速治可救法用鉛二觔分百餘塊加大劑甘桔湯料銀花甘草各四兩水三十碗煎濃汁先服三四碗徐澆舌上任

其自流澆灌一個時長其舌即可轉動口內可即漱淨隨令飲汁數杯將前滓再煎連前滓汁攪和一處頻頻洗濯手足次日二便出黑水無數始安然後用吹口藥及內服敗毒內托之劑而痊
澄曰楊梅瘡又名棉花瘡因其綿綿難絕也又名時瘡乃時氣乖變邪氣湊襲形如楊梅或上或下綿綿不絕皆由入房不淨淫火鬱結毒若瘡毒傳染氣化者輕先入脾肺其瘡先見於上部皮膚作癢筋骨不疼其形小而乾毒在皮膚未入裡治宜發散若淫女精精化總染者重流於肝腎先發下疳次生魚口先從下部見之漸至遍身大而且硬筋骨多疼小水澀淋此症最重因其毒氣內入骨髓外達皮毛若非汗下兼行將何以洗濯其臟腑乎若瘡發已久血氣已衰毒猶未退宜解毒托散為主總以醫至筋骨俱已不痛瘡根淡白內毒已散方用點藥輕者半年重者一載方可全愈若不遵此法欲其速愈妄用薰條擦藥呼吸等法往往致成後患者多矣

楊梅瘡門主方

首用第一煎方 全當歸 穿山甲切碎 甘草節 沒藥去油 柴胡 乳香去油 天花粉 川貝母 皂角刺 赤芍各三錢

防風 連翹 肉桂各二錢 金銀花 廣陳皮各七錢 白芷一二錢 右各稱準分作三劑每日一劑用黃酒一

碗水一酌煎至一酌為度宜砂罐煎之溫服取汗二次水酒減半照上溫服取汗戒口味不過三服即愈看何部

位照後加味治之神效 頭上加 藿本 面上加 升麻 白芷 頂上加 升麻 桔梗 羌活 腹加

白芷 柴胡 背加 皂角刺 胸加 瓜蒌 腰加 羌活 獨活 腸肘加 柴胡 青皮 臂上加 內

桂 羌活 耳後加 升麻 柴胡 獨活 桔梗 四股加 肉桂 金銀花 肩膊加 肉桂 升麻 脚

底加 肉桂 牛膝 瘡成加 肉桂 皂角刺以上引經藥 各用一錢 肉桂 金銀花 肩膊加 肉桂 升麻 脚

煮藥神方 何首烏半斤 天花粉 藏靈仙 鱉甲炙 金銀花 皂角刺 川草薢 白殭蚕 木通 白芷 麻

黃 蟬蛻 當歸 蒼朮 川芎各二兩 生大黃 生地各四兩 全蛇蛻兩 右藥用水一斗磁鍋內煎至五六升

去滓淨揀大黑棗五觔入汁再煎收至藥汁乾為度將棗晒乾不時食數枚毒漸消自收落屬而愈

消風敗毒散 歸尾 川芎 生地 赤芍 黃芩 乾葛 升麻各一錢 川黃 防風 黃柏 連翹各八 羌活

金銀花 蟬蛻 甘草各五 水煎二三劑熱服 初起必加大黃二錢 芒硝半 通利惡物去淨後即勿用

二十四味風勝飲約說 毒發出時用防風 荆芥 白芷梢 連翹 苦參 赤芍 黃連 地骨皮 白鮮皮

黃芩 山梔子歸尾 木瓜 金銀花 蟬蛻 蒼朮仁 黃柏 殭蠶 五加皮 甘草 白茯苓 皂角

刺各一土茯苓白寶者 上部瘡多倍加川芎 下部瘡多倍加木通 瘡痛加羌活獨活 體虛加人參茯苓

去梔子分作五六十劑每日水煎二劑服忌牛肉燒酒猪肝腸鹽宜炒過食不妙恐生癰此方起死回生活人甚

羊肉發藥約說 梅瘡初起皮膚燥癢上部多者 蟬蛻 川芎 當歸 三 歲靈仙 兩 麻黃 春用七錢夏用五錢秋

先用羊肉一觔水十碗煎七碗去羊肉入前藥於汁內煎至三碗去滓一日內早午晚分三次服完用羊肉好酒

過口喫盡被益取汗或吐或瀉三四次以粥補住內毒自解外毒自發忌牛狗鵝雞火酒茶醋等物每早食仙棗

三枚如病人不能飲酒或虛極者服胰子湯

仙棗方 大黑棗二十一枚去核入胡粉三分逐個用線繫緊放入小砂罐略放水煮熟露一宿空心喫三枚冷茶

送下

胰子湯約說 楊梅人虛氣弱不能汗下用此解毒托散方能送毒方出 蒼朮仁 川芎 金銀花 牛膝 木通

胡黃連 當歸 川黃連 防風各一 甘草 白殭蠶七條 土茯苓二斤 米泔浸一二時打豆肥皂七粒 打陳

酒河水各二碗煎一半入前藥併胰子一副去油淨同煎一碗空心服取汗忌口如前虛弱甚者加人參

豬肉茯苓湯約說 梅毒下身先見遂及遍身骨節酸痛二便澀滯 牛膝 蒼耳子 甘草 全當歸 蛤粉 金

銀花 紅花 天花粉 皂角刺各三 蟬蛻 二個 土茯苓洗淨木 精猪肉各四 穿山甲土炒研 大黃一兩 如常

生白酒三碗煎一半空心服猪肉過口大便利三四次後以粥補住

仙遺糧湯約說 土茯苓即仙遺糧洗淨 皂莢子五箇切 當歸 白鮮皮 川芎 蒼朮仁 木通 威靈仙 防風

金銀花 木瓜 茅蒼朮各一 甘草五錢 人參虛者久氣分 水二碗煎八分看病上下食前後服腿脚之下加牛膝

一錢病淺者一月可退病深者百日可痊此瘡欲發先發下疳預服此方能免發瘡也此治梅瘡初起筋骨疼痛

數月延綿不已並治楊梅風毒誤服輕粉癰瘰瘰癧骨疼不能動履之良方也食忌全前

解毒天漿飲 梅瘡不問新久遍身潰爛者及筋骨作疼者 土茯苓二兩 防風 當歸身 蟬蛻 防己 白鮮皮

連翹 海風藤 皂角刺 金銀花 川芎 木瓜 苡仁 各一 天花粉 甘草 五分 牛膝 一分 水二鍾煎八分

臨服入酒一杯量病上下服之

楊梅結毒 王明 天花粉 錢二 白殭蚕 蟬蛻 去兩服 杏仁 肥皂子 獨核 皂莢子 以上各 金銀花 錢五 土茯苓 取牽連

者名 蟬蛻 連青草 四兩 壯實用六兩 忌見鐵器用井水六碗煎三碗任服忌茶醋鹽戒房事如無獨核肥皂子使用肥皂子十個

打開看內有黑色黃色油膩味的俱不可用只揀青草色的方可用皂莢子如蟲蛀的使用十箇如初生魚口渾

身筋骨疼痛即宜服此便可不發梅瘡此方得之異傳活人千萬功效甚捷但服此藥日日須喫白水肉以免心

嘈不可少也

經驗楊梅瘡方 錦囊 麻黃 穿山甲 白芷 葦靈仙 蟬蛻 各二 生黃芪 錢 生羊肉一觔水五碗煎三碗將

藥取起入藥在湯內煎至二碗熱服蓋被出汗為度

楊梅瘡楊梅風方 錦囊 土茯苓 兩 川當歸 金銀花 牛膝 各二 皂莢子 甘草 防風 羌活 川芎 各一 熟地

錢三 水煎三鍾三次服 又方 錦囊 土茯苓 兩 金銀花 皂角 錢五 水煎湯另用大肥皂燒存性為末每用

三分調服

梅瘡神方 後服 川黃連 川芎 胡黃連 當歸 各一 土茯苓 兩 猪胰子 個 酒水各鍾半煎一鐘看瘡上下分食前

後服

二皂飲 沈員 肥皂子 獨核者 皂莢子 三十 苦參 金銀花 各一 河水碗半井水碗半煎一碗露一宿次早空心

熱服其毒自消 又方 土茯苓 兩 蟬蛻 皂角刺 肥皂子 殭蚕 錢各一 水三碗煎一碗服一七除根

人參耆苓湯 土茯苓 兩 人參 一分 土黃耆 三錢 如無以 水十五茶鍾煎湯當茶只食淡肉忌鹹

楊梅瘡服此永無結毒之患 生 胡黃連 錢三 牛膝 川黃連 酒炒 各一 加新鮮土茯苓一觔洗淨拍碎水八碗罐內煎

至四碗入猪胰子一箇再煎至二碗再將猪胰子一個剝碎入藥內同胰子一日服盡

寶靈丹 母論梅瘡初起已潰服此神效並治結毒下疳串毒以及男女內外不可明言之處惡毒等證 珍珠 屑

連翹 滴乳香 滋廣木香 真血珀 研 沒藥 法沉香 水片 錢各一 西牛黃 分五 辰砂 分五 真胎骨 不拘多少 泥 滴乳石

三錢用客或香紫背天葵甘草芽
香各三錢水煎一伏時收取研用
右藥各味另研照分兩配合再研千餘下磁瓶收貯每用丹三分加飛白麴

二分和研極勻分作三服每服用新鮮土茯苓一觔刮去粗皮以木槌打碎入砂鉢內加河水十碗煎至六碗每
用二碗調服上丹一分七釐如患者中氣不足土茯苓只用十兩大便不通加百草霜五分調服膿水多加當歸

白芷各一錢五分毒在上部加川芎桔梗各三錢在咽喉加元參三錢在腰加杜仲三錢在脇加柴胡防風各三
錢在下部加牛膝沒仁防已各三錢俱加入土茯苓湯中煎服服過如毒氣不行小便不利可於土茯苓湯中加利

水等味服之自利一料除根

琥珀牛黃丸 治楊梅破爛並一切疽癰久潰膿血不乾者 琥珀 猪牙皂 木香 各一 人中白 煨輕粉 雄黃

硃砂 乳香 油法沒藥 油法白芷 各三 當歸 西牛黃 分三 槐花 兩 炒 一丁香 分秋冬三錢 右為極細末酒糊為丸如蘿

蔔子大初服五九五日後服七九又五日後服九九又五日後仍服七九又五日後再服五九週而復始俱用土

茯苓甘草煎湯下其毒消散如神

又方 芝蔴 槐角子 升各一 全炒研細每清晨白湯調服二合七日即愈 又方 陳琉璃陰陽瓦焙研極細土

茯苓煎湯調服二錢 又方 白果肉 紅棗肉 肥皂子 各四十 共搗為丸每早上茯苓湯送下三錢 又方

羊糞不拘多少陰陽瓦焙存性每服三錢好酒送下數服自愈 又方 紅棗肉 核桃肉 輕粉 各三 共研

細作九分九服每服三十九硃砂為衣瘡在上食後服瘡在下空心服七日瘡愈換用花椒七粒湯泡送下

楊梅瘡神效丸 錦囊棉花核 炒 肥皂子 炒 廣膠 炒 槐花米 炒 馬料豆 炒 麻子 炒 各 為末雄豬胆汁為丸每服五

錢酒送下生在上身者加穿山甲 二兩 炒 又方 錦囊 硃砂 雄黃 五分 苦參 荊芥 天麻 麻黃 面粉 牛

蒺藜子 槐角子 各三 右為末用糖心雞蛋為丸桐子大每服三十九用雞湯或羊肉湯送下一日一服表出毒

氣永不再發忌一月房事神效

楊梅瘡後腫塊方 錦囊冷飯團 兩 十五 防風 沒仁 木通 濟銀花 防已 白鮮皮 木瓜 皂角刺 茯苓 各五

錢白芥子 錢四 歸身 錢七 分二十服每用水煎空心午後晚飯前各一服忌雞魚生冷房事及煎炒茶酒十餘日立效

虛弱加人參五錢其妙不可盡述

楊梅瘡遍身臭爛 大蝦蟆一隻竹刀腹上割一小孔將大紅棗填滿再加蟾酥五分用線紮好麻油半斤入砂鍋

內炙至黃色為度取出研細磁瓶收貯每服三分無灰酒調服取汗五日全愈

忍冬湯 金銀花一兩黑料豆二兩上茯苓四兩甘草三錢 白水煎每日一劑酒助藥力

金蟬蛻甲酒 梅瘡不拘新久輕重皆驗並治結毒筋骨疼痛諸藥不效者更妙 好酒五觔大蝦蟆一隻浸酒內

封瓶口煮兩炷香時取起待次日隨量之大小飲醉為度冬夏蓋煖出汗為效所膳之酒次日再服口飲量之一

半酒盡瘡愈服酒後七日不見風要緊忌口味房事百日除根

久不收口 陳肥臘肉切薄片貼上三日一易先以千里光煎水洗之

神應散 何首烏 天花粉 荆芥穗 苦參 防風各一兩肥兒子性燒存薄荷葉各五錢 共為末分十服每日用新

鮮白土茯苓八兩公猪肉四兩入前藥一服用水七碗煮爛去滓具肉聽食其湯代茶飲之不過十日全愈再無

餘毒如善咬肉者可作大劑與之

先天一氣酒 治楊梅瘡筋骨疼痛 鉛七觔打成片剪碎用上好堆花燒酒十五觔將鉛片浸酒內泥封壇口隔

湯文武火煮一晝夜埋土中一七退火氣早晚任服一二杯待筋骨不疼然後服八寶丹收功

蜈蚣槐花丸沈員 槐花揀淨炒研細用蜈蚣搗丸空心酒服三錢

口上楊梅瘡 先將豆腐淨炒熟將布囊盛之對嘴俟作瘡時以胆礬塗之即愈

翠雲散 銅綠 胆礬各五錢熟石灰 輕粉各一錢 共研極細末磁瓶收貯濕瘡乾擦乾瘡用公猪胆汁調點一日

點三次自愈 又方 杏仁四十九粒泡去皮共壓去油取霜研極細入輕粉三錢冰片五分再研勻猪脊髓調

點若瘡一二箇既大且硬可先用白降丹少許拔去毒氣後用此藥收功

鵝黃散宋正 楊瘡潰爛成片膿穢多而疼甚者宜之 石羔煨 黃柏炒 輕粉各等 研為細末乾擦爛上即可生疤

再爛再搽毒盡乃愈此解毒止痛收乾之妙藥也

梅瘡點藥玄散 白砒 精猪肉各一兩紅棗肉各五錢共搗如泥外用黃泥固好煨紅取出研細用鵝胆調搽如神 又不

疼點藥玄散 真輕粉 杏仁皮 松花粉各一錢 水片一分 用鵝胆汁調搽

梅瘡靈藥 水銀 皂礬 各一火硝 明礬 青鹽 各一兩二錢 共研入陽城罐內並泥固濟先文後武打三炷

香取出冷定聽用點梅瘡神效 一方多雄黃硃砂各三錢 白粉霜 點楊梅瘡 水銀 食鹽 明礬 皂礬 火硝 各二錢 除水銀不研將六味研末入

陽城罐內中間放水銀上以鐵蓋蓋好再用鐵絲繫緊以牡蠣鹽泥封口晒乾裂縫再補好照昇藥法打三炷香為

度冷定取開刮下蓋內靈藥每用一二厘冷水調點三四次愈

梅瘡膏藥 猪油熬去滓一兩加香油三錢全熬離火稍冷加乳香沒藥各五錢兜茶七錢研細和勻又入冰片麝

香各一分輕粉五分臨用攤貼神效

又膏方 老松香一觔河井水煮九次先用麻油四兩煉滴水成珠入煮過松香胆礬銅綠二味只各用一兩研細

攪勻收膏攤貼

梅漏膏 麻油半觔熬至滴水成珠入白蠟五錢鎔盡入血竭兜茶乳香沒藥各五錢胆礬一錢再下飛丹二兩鉛

粉五錢離火入冰片一分麝香二分攪勻成膏欲去污肉加龍骨赤石脂各二錢

五寶丹 生 杏仁 五粒 乳 輕粉 五錢 硃砂 三錢 冰片 一分 麝香 一分 共研極細末破者乾搽未破者水調敷之隔日痂脫自

愈 洗梅瘡法 黃連 黃芩 黃柏 黃蠟 白芨 各五錢 川椒 三錢 食鹽 少 煎湯洗之 又方 用前湯入好醋

少許加冬青葉三十片全煎取葉貼瘡上再煎湯洗 又方 土葛蒲煎湯洗瘡易於收口 又方 臭梧桐

金銀花 野菊花 各等 煎湯入舊馬桶內薰之一日二次有痔漏加枸杞子

通僂五寶散 王 鍾乳粉 三錢 琥珀 水片 各六錢 大丹砂 二錢 飛白麵 八分 各踐足和勻分十二服每日

用土茯苓一觔水煎十二碗清晨一碗入藥一服服其土茯苓湯須一日服盡湯不可別飲重者再服一料無不愈

者忌鷄鵝牛羊房事此方古今第一 初起燻法 秘 長砂末一錢綿紙分作七條香油浸透每次燻二條燻時板凳坐著暑天用單被冬天用夾被蓋之

不可出氣要口含水恐傷口皮爛畢吐去不可嚥下其效如神此方弱人不宜輕試