

傷寒論淺註補正卷一下

漢張仲景原友

開長樂陳念祖修園淺註

男

蔚古愚 元犀靈石 全校字

蜀天彭唐宗海容川補正

廈門鄧其章雲航參校

辨太陽病脈證篇

太陽病常惡寒發熱今

吐傷中氣津液外泄而

白汗出

汗出而外證亦微

不惡寒發熱

脾胃之氣不足而

關上之脈

見微細

虛

數者此非本病以醫者吐之

之

過也一二口吐之者

以二日為陽明主氣之期吐之則胃傷而脾未傷故脾能運而

腹中饑

胃不

而口不能食三四日吐之者

以四日為太陰主氣之期吐之則脾傷而胃未傷脾傷則不勝穀故

不喜糜粥

胃未傷仍喜柔潤故

飲食冷食

朝為陽胃為陽上胃陽未傷故能

朝食

暮為陰脾為陰土脾陰已虛故至

暮吐

所以然者

以醫誤

吐之所致也

前傷胃而不傷脾後傷脾而不傷胃非脾

胃兩傷之劇證

此為小逆

此一節言病由誤吐一時氣逆使然後人擬用大小半夏湯然却不知仲師無方之妙法

述 此章凡四節皆言吐之失宜而變證有不同也

太陽病不當吐而吐之但太陽病原當惡寒吐今反不惡寒不欲近衣者此為吐之傷上焦心主之氣陽無所附而

內煩也

此一節言吐之不特傷中焦脾胃之氣亦能傷上焦心主之氣也

病人脈一息六七數為熱證與虛數果為熱熱當消穀而引食而反吐者此非熱以過發

其汗令陽氣外微陽受氣於胸中故膈中之氣亦虛脈乃數也數為外來客熱非胃中之本熱無熱不能消穀以胃

中虛冷故吐也

上二節之吐言以吐致吐此節之吐言不以吐而致吐也

補曰此與金匱胃中空虛客氣動膈同義蓋陽氣微是指陽明胃中之氣微膈是胸前膈膜通於胃脘之處膈膜由胸前上通於心包心火之所以生土者皆由心包傳入膈膜以薰

化胃中之飲食而心又主血脈西醫言心體跳動不休脈即應之而助今以膈氣虛心火不能生胃土而客氣乘虛入於膈中擾亂心主之血脈乃見數象是此數脈非陽明胃中本熱乃乘虛外來侵膈中之客熱也客熱在膈不在胃中故胃中仍虛冷所以吐也淺註隨文敷衍未能了晰又西醫之說詳吾醫經精義與內經論脈相合讀者當參考之

病證在疑似不可定之際必求諸病人之情

太陽病

既過經不解當辨其病留於何經之分

十有

餘日

或留於陽明之分則

下溫溫欲吐而胸中痛

以心下與胸中為陽明之所主也或留於太陽之分則

大便反溏

而腹微滿

以大便與腹為太陽之所主也胃絡上通

於心脾脈又上膈

鬱鬱微煩

然以上諸證或虛或實不無疑義必須審病人之情

先此

十餘日之時自

若得

極吐

下而後通其

意者此胃

實也可與調胃承氣湯

微和胃氣

若不爾者

為虛證則

不可與

若但欲嘔

而無心下

胸中痛

而無鬱微煩

證但微溏而無腹此且

非柴胡證

況取遠為認承氣證乎然則為以其嘔即欲吐之狀故知

欲吐之狀

故知

先此時

極吐下也

此一節言病證在疑似之間。而得其欲吐之情。為主兼參欲下以定治法。甚矣問證之不可不講也。

太陽病六

日已過而至

七日

正當太陽主氣之期

表證仍在

脈則宜浮今

脈微而沉

是邪不在表而在裏矣。太陽之病內傳多是胸膈今

反不

結胸。

是病不在上而在下矣。

其人發狂者

邪熱內盛逼亂神明也。此證

以熱在下焦。小腹當鞭滿。

然小便與血皆居小腹蓄血不行皆作硬。

滿。小便自利者

知不關膀胱之氣分而在於衞任之血分。必用藥以

下其

血乃愈。所以然者以太陽之表

熱

隨經而

瘀熱在

少腹裏故也。

以

抵當湯主之。

此與桃核承氣證不同。彼輕而此重。彼為熱結膀胱。乃太陽肌腠之邪從背脊而下結於膀胱。此為瘀熱在裏。乃太陽膚表之邪從胸中而下結於少腹也。

補正 曰狂為實證。微為虛脈。何以脈微反主狂哉。楚狂雖是實。乃陰分血實。非陽分氣實也。金匱言陽氣虛者為狂。謂狂為陰分之血實。而陽分之氣反形其虛。此脈之微亦正是陽

分氣虛知斯不在氣分也。沉脈應病在裏。承上文太陽證來。則太陽之氣出入於胸中。脈應在裏。當結胸。今反不在上焦胸前之膈膜中。不爲結胸。而其人發狂者。內經云。血在下如狂。以熱在下焦。膜網夾室之內。是爲血室。血結爲死魄。魄亂其魂。是以狂也。血室後連大腸前連膀胱。正當小腹之間。故小腹當鞭滿。設熱結在膀胱。則小便不通。今小便自利者。知不在膀胱。乃在血室中。當攻下其結血。使從大腸瀉道而出。乃愈。所以然者。以血室之油膜上連板油。而著於背脊。太陽經行身之背。隨經瘀熱從背脊入血室之裏。不從胸入。故不結胸。不在膀胱中。故小便自利。背脊連油膜從血分入。故入血室。若夫熱結膀胱。是從胸前上焦氣分從水道決瀆之路而入。故入水府。修園不知三焦膀胱原委如此。是以從入之路被其倒亂也。

抵當湯方

水蛭三十個熬

蟲蟲三十個熬去翅

桃仁三十個去皮尖

大黃三兩酒浸

右四味剉如麻豆以水五升煮取三升去滓溫服一升不下再服

張令韶曰

太陽有經與氣之分亦有外與表之別。桃仁承氣證熱結膀胱乃太陽肌腠之邪從背脊而下結於膀胱故曰外不解者尚不可攻肌腠為外也抵當證瘀熱在裏

乃太陽膚表之邪從胸中而下結於小腹表氣通於胸故曰表證仍在反不結胸皮毛為表也蓋太陽之氣從胸而出入太陽之脈循背脊之下絡膀胱經病外邪從背而入結於膀胱者詳於桃仁承氣湯方註而氣病表邪從胸而入不涉於膀胱故不曰熱結膀胱而曰反不結胸熱在下焦蓋下焦即胞中衝任二脈之所起也衝脈起於氣衝任脈起於中極之下以上毛際亦居小腹故前章曰小腹急結此章曰小腹鞭滿急結者急欲下通之象不必攻之故曰下者愈只用桃仁承氣足矣此曰鞭滿全無下通之勢故不曰血自下而曰下血乃愈言必攻而始下也非抵當不可二證之分別如此又曰太陽病六七日正當太陽主氣之期表證仍在脈當浮今微而沉者氣隨經絡沉而內薄也內薄於胸當結胸今反不結胸者知表邪從胸而入下於陰分陰不勝陽故發狂熱在下焦故小腹鞭滿鞭滿而小便自利便知其不在無形之氣分而在有形之血分也方用蟲蟲水蛭一飛一潛吮血之物也在上之熱隨經而入飛者抵之在下為血為熱之瘀潛者當之配桃核之仁將軍之威一鼓而下抵敵拒大四物當之故曰抵當

血之與水以小便之利與不利分之請再申其說

太陽病

從胸而陷於中土故

身黃脈沉結少腹硬小便不利者

乃脾氣不能轉輸水聚於少腹

為無血也。而小便自利。其人如狂者。非水聚。血證諦也。必諦審其果是。抵當湯主之。否則不可。姑試也。

此一節申明上文。小便自利之義也。喻嘉言云。此條乃法中之法也。見血證為重病。抵當為

重藥。後人辨證不清。不當用而誤用。與夫當用而不用。成敗在於反掌。故重申其義也。

內經云。今夫熱病者。皆傷寒之類也。傷寒有熱。至所有之熱。皆歸於少腹。故少腹應病。小便不利。今反利者。熱歸血海。為有血也。但

結陰位。卒難蕩滌。投藥過多。恐傷中氣。故當緩下之。然又恐藥力太微。病根深固。難拔。故應用之藥。宜盡數以與之。不可留餘藥。宜抵當丸。

此一節變湯為丸。分兩極輕。連滓而服。又法外之法也。

抵當丸方

水蛭 二十個 熬 蠭蟲 二十五個 熬去翅 桃仁 二十個 去皮尖 大黃 三兩 酒浸

右四味。杵分為四丸。以水一升。煮二九。取七合服之。晬時當下血。若不下者。更服。晬時。周時也。

也。

陳修園曰

抵當之脈浮取微而沉取結按曰微而沉非沉微也故又以沉結升之抵當之證發狂小腹鞭滿小便自利其中又有發黃病審其小便不利為膀胱之氣不化小

便自利非膀胱之氣不化為下焦之瘀不行以此方之難用又不可不用不得不重申其義也然此為抵當湯丸二證公共之辨法也師又以抵當丸方法者著眼在有熱二字以熱瘀於裏而仍蒸於外小腹又滿小便又不利而反自利其證較重而治之不可急遽故變湯為丸以和洽其氣味令其緩達病所曰不可餘藥者謂連滓服下不可留餘庶少許勝多許俟晬時下血病去而正亦無傷也

雖然辨蓄血者既以小便利為斷矣然不詳審其主證而並辨其兼證恐專執小便利之一說概認為血證亦非辨證之法內經云飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱故太陽病小便利者以其飲水之多夫飲水多而小便利則水氣不洩應必心下悸心

水制也小便少者氣不施化必苦裏急也豈獨血證然哉

正曰淺註以心下悸與小便少者作一串說反形迂曲蓋上節以小便利不利分有血無

血此又以小便利不利分水之在上在下謂小便利者水不結在下以飲水過多必停在胸膈間上凌心火而心下悸是水在上故膀胱不裏急也若小便不利者以飲水多不停胸膈

問必下結於膀胱無上凌心悸之證必有苦裏急之證矣詞甚爽直讀者當玩

張錢塘云 上節以小便利不利而辨其血之有無此又以小便之多少而驗其水之有無總結前三節之意以見不可概認為血證其章法之精密如此

問曰 吾聞太陽主開病竟有不能出入內外結胸少陰主樞竟不能樞轉藏結其病狀何如答曰 結有陽主開而固結於胸為結胸出入而固結於藏為藏結其病狀何如答曰 結有邪太陽之正氣與邪氣共結於膈胸有形之間故按之則痛寸以候外太寸脈浮關以候中病氣關脈沉此名曰結胸也

也 結於膈胸有形之間故按之則痛寸以候外太寸脈浮關以候中病氣關脈沉此名曰結胸也

也

張錢塘云 此章論結胸藏結痞氣之證直至病脈素有痞方止其中

何謂藏結答曰 胸雖不結陰邪如結胸之狀而內則發於少陰不如結胸之飲食如故下干於逆於心下其外如結胸之狀而內則發於少陰不如結胸之飲食如故下干於

時時下利寸脈浮為少陰之神關脈小細為少陰之藏沉緊為少陰之藏氣結名曰藏結舌為

外候舌上白胎滑者陰寒甚於下而君難治○藏結之狀既明而藏結之證不可不講藏結發

熱之化則無病今不得其熱化則為藏結無陽證少陰主不見往來寒熱是少陰之陽氣不能從樞其人反靜舌

身寒論卷之五 太陽篇下 五

上胎滑者

爲君火衰微而陰寒氣盛不得不切戒之曰

不可攻也

此承上文而言藏結之證也

正曰藏結是言下焦膜油中之夾室卽血室丹田之中也與金匱婦人臍燥之臍皆指此言非泛言五臟也血室胞宮其膜上通胸脇下通大腸故上如結胸而下則時時下利兩面夾寫出臍結之所在凡血室有熱則發於膜腠之間而爲往來寒熱藏結皆是陰結無陽證也故不往來寒熱仲景此章歷言胸膈脇膜下焦膜油而竝詳丹田之結通身膜網已詳矣修圖於此尙欠分曉又詳於下痛引少腹入陰筋節

少陰上火而下水其氣交會於陽明中土故脈現於關沉與結胸無異而小細緊爲臍陰虛寒結證所獨也

按程郊倩云

浮爲寒傷表脈沉爲邪入於裏脈上節單言泥沉而有力也此節兼沉小細緊而言脈之分別如此

今試言結胸之因并詳其狀而及其治病發於太陽陽太陽主外而反下之則熱下乘。結於胸膈因作結胸病發

於少陰少陰主裏而反下之邪若結於下則為藏結矣。因而作痞痞症發於陰原無下法不以

於後而所以成結胸者以下之太早故也試再由其因而更詳其狀。結胸者氣結於內遂不外

輸不項亦拘緊強有反張如柔痊令內之結狀下之則外之經和宜大陷胸丸方氣一通

張錢塘云此言結胸藏結之所因而於藏結之中復又推言痞結以見痞之同發於陰而不

感上集君與藏結同者藏結結於下而痞結結於上也結下者感下焦陰寒之氣結於上者

大陷胸丸方

大黃半斤

葶藶半升

芒硝半升

杏仁半升去皮

右四味搗篩二味納杏仁芒硝合研如脂和散取如彈丸一枚別搗甘遂末一錢匕白蜜二合水二升煮取一升溫頓服之一宿乃下如不下更服取下為效禁如藥法

蔚按 太陽之脈上循頭項。太陽之氣內出於胸膈外達於皮毛。其治法宜從汗解。今因汗而反下之。則邪氣因誤下而結於胸膈之間。其正氣亦隨邪氣而內結。不能外行於經脈。以致經輸不利而頭項強急。如柔痙反張之狀。取大黃芒硝苦鹹以泄火熱甘遂苦辛以攻水結。其用杏仁葶藶奈何。以肺主皮毛。太陽亦主皮毛。肺氣利而太陽之結氣亦解矣。其揭丸而又納密奈何。欲峻藥不急於下行。亦欲毒藥不傷其腸胃也。

然亦有不可下者。當以脈為斷。結胸證。寸脈當浮。關脈當沉。今診其脈竟浮而大者。浮為在外。大為正虛。邪結於中。而正氣反虛。浮於外定不可下。若

下之。裏氣一泄。正氣無所依歸。外離而內脫。則渙散死。

此言結胸證乃太陽之正氣。邪氣而結於內。若脈見浮大。是邪實固結於內。正虛反格於外也。

張錢塘云 正者主也。客者邪也。正邪並結者。客留而主人仍在。故可下之。邪結於中。而反正格於外者。主人去而客留。故不可下也。

太陽 中風病。診其脈浮而動數。風性浮。浮則為風。風為陽。數則為熱。陰陽相搏。故動則為痛。邪盛則數

則為虛。病太陽之頭痛。得標陽之發熱。凡傷風必自汗。汗少則惡風。汗出多亦必惡寒。原無盜汗之證。盜汗亦無惡寒之證。今微盜汗出

則為虛。病太陽之頭痛。得標陽之發熱。凡傷風必自汗。汗少則惡風。汗出多亦必惡寒。原無盜汗之證。盜汗亦無惡寒之證。今微盜汗出

則為虛。病太陽之頭痛。得標陽之發熱。凡傷風必自汗。汗少則惡風。汗出多亦必惡寒。原無盜汗之證。盜汗亦無惡寒之證。今微盜汗出

則為虛。病太陽之頭痛。得標陽之發熱。凡傷風必自汗。汗少則惡風。汗出多亦必惡寒。原無盜汗之證。盜汗亦無惡寒之證。今微盜汗出

而反惡寒者。乃中風稽久之證雖不表邪未嘗解也。醫反下之。表邪乘虛動數。之邪氣膈

氣在內相拒而痛胃中而被下空虛客氣無所顧動膈膈上為心肺主呼氣之出膈下為肝腎主吸

續短氣上下水火之煩熱煩躁之心中懊懣此皆陽之氣隨邪內陷心下因硬則為結胸以大

陷胸湯主之。若不結胸而陷於太陰濕土之分。但頭汗出津液不餘處無汗劑頸而還。若小便

不利濕熱因無去路鬱身必發黃也

此一節言中風誤下而成結胸也。

正曰脈動應頭痛脈浮應發熱數為虛則應盜汗若果內虛則不惡寒今反惡寒者乃表

邪未解非內虛也在表宜散醫者不知表散而反下之則動數快利之脈反變出艱遲之象

此非虛寒脈遲乃因下後阻抑其脈使不快利脈被其阻則不易出况胸膈間為正氣往來

之路為邪所入正氣拒之則為拒痛蓋正氣生於氣海上於胸膈尤賴胃中氣實有以托之

則正氣外出邪不得入。今下後胃中空虛不能扶托正氣。遂令客熱之邪得入。膈中行動不止。正氣因與相拒也。膈中者呼吸之路道也。邪正相拒則呼吸之路不通利。故短氣邪內犯則煩。正難出則躁煩躁之極。心中懊憹。所以然者人之元氣生於膀胱水中透入氣海而上於胸膈。氣生於水爲邪所阻。迫於胸中則仍化爲水與邪熱結。是爲水火交結。心下因硬則則爲結胸。此仲景自行注解之文。淺註不知膈間膜油下達氣海。內通心包上達口鼻。外通皮毛。是以註多不晰。又下文若不結胸。是胸前之膈通利。則氣得上出。故但頭汗出。餘處無汗。是邪熱從周身皮毛陷於肥肉膏油之內。則周身膜油氣不得出。故無汗。若小便利則水得下瀉。不與熱蒸。小便不利者水壅於內。必與熱蒸。從肥肉肌腠中必發出黃色。是黃證乃邪熱阻於通身之泊中陷胸。是邪熱阻於胸前之膜中陷胸。是水火相結發黃。是水火相蒸必知邪正水火之理。又必知膜油之別。然後知仲景連及黃證。是與陷胸互相發明也。

大陷胸湯方

大黃 六兩 去皮

芒硝 一升

甘遂 一錢

右三味以水六升。先煮大黃取二升。去滓納芒硝煮一兩沸。納甘遂末溫服一升。得快利止後服。

【附按】

大黃芒硝苦鹹之品。借甘遂之毒直達胸間之飲邪。不專蕩胃中之邪穢也。湯與丸分者。九恐下之大急。故連滓和蜜服之。使留中之邪從緩而下。湯恐下之不急。取三味之

過而不留者。蕩滌必盡也。

陳亮師曰。結胸者。結於胸中。而連於心下也。身之有膈。所以遮

上下也。膈能拒邪。則邪留於胸中。膈不能拒邪。則邪留胸而及於胃。胸胃俱病。乃成結胸。

如胸有邪而胃未受邪。則為胸脇滿之半表半裏證。如胃受邪而胸不留。則為胃家實之陽明病。皆非結胸也。故必詳辨分晰。庶無差誤。

結胸亦有不

傷寒六日為一經

七日

又當來復於太

陽。則傷寒之

邪鬱而為熱實。其證重矣。

脈沉而

且。沉為在裏。緊則為痛。為實。今

心下痛。按之如石之硬者。非他藥所

可。必以大陷湯主之。

此一節言傷寒不因下而亦成結胸也。

補曰熱實二字見另有寒實結胸不在此例詳於下文醫者當細辨也又凡緊脈今法只斷為寒不知緊是絞結迫切之形無論寒熱但是絞結迫切等證皆能見此脈形通考仲景脈法自見

太陽傷寒十餘日熱結在裏蓋胸中為太陽之裏復作往來寒熱者乃太陽藉樞轉之機仍欲外出可與大柴胡

湯迎其機以導之但結胸而無大熱者此為太陽水之氣不行於結在胸脇也身上俱無汗但頭上

微汗出者水逆於胸而不大陷胸湯主之令水氣泄於下而正氣運於上則樞轉亦利矣蓋太

雖不能轉樞然邪去能外泄也以柴胡湯為樞轉之提劑而大陷胸湯為泄邪之峻藥

補曰熱結在裏則似結胸矣使不往來寒熱而但見煩痛大熱等證便當用大陷胸湯今

復有往來寒熱則熱邪雖入結於胸中而正氣尚欲達於身外也宜用大柴胡湯有大黃以

奪其結熱有柴胡湯以達其正氣為表裏兩解之法若但結胸無往來寒熱之證且無陷胸