


欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷三十二



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷三十二

刪補名醫方論卷七目錄

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

更衣丸

麻仁丸

桃仁承氣湯

抵當湯丸

梔子豉湯

梔子豉加甘草湯

梔子豉加生薑湯

梔子厚朴湯

梔子乾薑湯

瓜蒂散

小陷胸湯

大陷胸湯丸

三物白散

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

甘草瀉心湯

生薑瀉心湯

半夏瀉心湯

旋覆代赭石湯

麻黃連軹赤小豆湯

梔子蘘皮湯

茵陳蒿湯

御纂醫宗金鑑卷三十二目錄

欽定四庫全書

醫宗金鑑卷二十一

補名醫方論卷七

大氣湯

治陽明病潮熱手足然

出譫語汗出多胃燥獨

滿痛脈滑實又目中不

之口燥咽乾者自利清

水色紅平心一痛口燥舌乾者六七日腹脹不大便

者

大黃

四兩
酒洗

厚朴 半觔

枳實

五枚
炙

芒消 三合

右四味以水一斗先煮二物取五升內大黃煮取
二升去滓內芒消再上火微煮一二沸分溫再服
得下即停後服

小承氣湯

大黃

四兩

厚朴

二兩
炙
去皮

枳實 三枚

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫三服
初服湯當大便不爾再服以利為度得便即止服
集註柯琴曰諸病皆因於氣穢物之不去由於氣之不

順也故攻積之劑必用氣分之藥因以承氣名湯
方分大小者有二義焉厚朴倍大黃是氣藥為君
名大承氣大黃倍厚朴是氣藥為臣名小承氣味
多性猛制大其服欲令大泄下也因名曰大味寡

性緩制小其服欲微和胃氣也因名曰小且煎法
更有妙義大承氣用水一斗煮枳朴取五升去滓
內大黃再煮取二升內芒消何哉蓋生者氣銳而
先行熟者氣純而和緩仲景欲使芒消先化燥屎
大黃繼通地道而後枳朴除其痞滿若小承氣以
三味同煎不分次第同一大黃而煎法不同此可
見仲景微和之意也

喻昌曰金匱治瘕為病胸滿口噤臥不着席脚攣

急必齧齒可與大承氣湯乃死中求生之法也靈
樞謂熱而瘕者死腰折瘕瘕齒齧也茲所云臥不
着席卽腰折之變文脚攣急卽瘕瘕之變文且齧
齒加以胸滿口禁上中下三焦熱邪充斥死不旋
踵矣在傷寒證腹滿可下胸滿則不可下然投是
湯者須知所謂胸滿謂其邪尚在表故不可下此
證入裏之熱極深極重匪可比倫况陽熱深極陰
血立至消亡卽小小下之尚不足以勝其陽救其

陰故取此湯以承領其一綫之陰氣陰氣不盡為陽熱所劫因而得生者多矣可與二字甚活臨證酌而用之初非定法也既有下之重傷其陰之大戒復有下之急救其陰之活法學者欲為深造端在此矣

調胃承氣湯

治表解有汗裏熱不除胃因不和而不作解者

大黃

四兩
酒洗

甘草

二兩
炙

芒消

半觔

右三味以水三升先煮二味取一升去滓內芒消
微煮令沸少少溫服之

註

三承氣湯之立名而曰大者制大其服欲急下其
邪也小者制小其服欲緩下其邪也曰調胃者則

有調和承順胃氣之義非若大小專攻下也經曰
熱淫於內治以鹹寒火淫於內治以苦寒君大黃
之苦寒臣芒消之鹹寒二味並舉攻熱瀉火之力
備矣更佐甘草之緩調停於大黃芒消之間又少
少溫服之使其力不峻則不能速下而和也

更衣丸

治津液不足腸胃乾燥大便不通

硃砂

五錢研
如飛麵

蘆薈

七錢研
細生用

滴好酒少許和丸每服一錢二分好酒下

集註柯琴曰胃為後天之本不及固病太過亦病然太

過復有陽盛陰虛之別焉兩陽合明而胃家實仲

景製三承氣湯以下之三陽燥結而津液亡前賢

又製更衣丸以潤之古人入廁必更衣故以此命

名也硃砂以汞為體性寒重墜下達蘆薈以液為
質味苦膏潤下滋兼以大寒大苦之性味能潤燥
結從上導下而胃開開矣合以為丸兩者相須得
效最宏奏功甚捷誠匪夷所思矣

麻仁丸 又名脾約丸

治腸胃燥熱大便秘結小便數多

麻子 二升

芍藥 半觔

枳實 半觔

大黃 一觔 去皮

厚朴 一觔 去皮

杏仁 一升 去皮 煎熬碾脂

右六味為末煉蜜為丸桐子大飲服十九日三服

漸加以利為度

集成無已曰約者約結之約又約束也經曰飲入於