

欽定四庫全書

子部

聖濟總錄纂要卷八



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

聖濟總錄纂要卷八

吐血門

吐血統論

論曰吐血病有三種一則緣心肺蘊熱血得熱則妄行

下流入胃胃受之則滿悶氣道貫衝故令吐血二則虛

勞之人心肺內傷志怒氣逆肝不得藏血乘虛而出因

休寧程林纂

怒氣逆甚則嘔血三者緣酒食過飽胃間不安或強吐之氣脉賁亂損傷胃心血隨食出此名傷胃

黃芪散 治吐血

綿黃芪 白芨 白斂 黃明膠

粉炒
四兩

共末空心飲下二錢

綠雲散 全前

百合 人參 側柏葉 阿膠

粉炒
二兩

共末空心飲下二錢

神效鹿角散 治吐血咯血

鹿角膠

川柏

炒五錢

杏仁

二十一枚
去皮尖

共研入白麴水下二錢

阿膠散 治咯血吐血

阿膠

白芨

白芷

白斂

川柏

蜜炙
一兩

共末飲下二錢

藕汁茯苓散 治吐血不止

生藕汁

白茯苓

懷生地

炒黑蒲黃

等分

以三味共末調藕汁下二錢

補肺煮肺散 治吐血咯血等

杏仁

一百二十枚去雙仁皮尖研極爛

百合

四兩

葱白

三莖

熟糯米

三合

共和勻用猪肺一具去筋管膜全煮熟蜜湯下

異攻散 治吐血不差

人參

一兩

研極細五更時打雞子清和服二三錢

黃藥子散 治吐血

黃藥子 防已等分

共末用小麥湯下一錢吐甚者一服減二服止

艾灰散 治吐血

艾葉

燒灰存性為末新汲水空心下二錢

竹葉芍藥湯 治吐血衄血大小便出血

淡竹葉 合六

赤芍

甘草

兩炙一

阿膠

兩三

川歸兩半

水煎五錢溫服日二

地黃藕汁飲 治心肺熱極喘悶吐血

生地汁 生藕汁 生薑汁 小薊根汁

生牛蒡子汁 生白蜜等分

共和勻徐呷數口

地黃飲 治吐血不止

懷生地一兩取汁 鹿角膠一兩炙

童便五合煎沸入汁末十數沸分三服

吐血不止

論曰藏真高于肺而主氣藏真通于心而主血藏真散于肝而藏血是三者或因憂愁思慮與夫恚怒氣逆傷之則氣亂而血妄行下入於胃胃受之則脹滿其氣賁衝于上故吐血不止也

白金散 治吐血肺元受損

上白麴

石菖蒲

一兩

共末空心水下二錢暑毒氣薑汁蜜水下

白斂湯 治吐血咯血不止

白斂

二兩

阿膠

炒二兩

用酒水合煎三錢去滓入生地汁半合沸服

生犀桔梗散 治吐血似鵝鴨肝晝夜不止

生犀角

生桔梗

一兩

共末空心溫酒下二錢晚下一錢

補肺百花煎 治吐血不止兼咳嗽

生地汁 生藕汁升一 生薑汁升半 乾青柿五枚 研作

糊 黃牛乳升半 胡桃肉十枚 大棗二十枚 研

好白酒一升全上數味煎如飴入後藥

黃明膠炙研 五錢 杏仁去皮尖 研三兩 秦艽五錢 研末

全上合煎減半入蜜四兩養成煎空心用糯米飲下一二匙日三服酒下亦可

阿膠湯 治吐血不止

阿膠炒研 熟艾三兩 白芍 地榆四兩 小薊根五兩

水煎五錢

土馬驤湯 治心肺蘊熱恚怒氣逆便血妄行日夜不

止

土馬驤

焙二兩

人參

白朮

秦艽

炙甘草

枳實

炒麩

懷生地

酒洗

柴胡

一兩

水煎五錢空心溫服日二

嘔血

論曰憂愁思慮則傷心恚怒氣逆上而不下則傷肝蓋

心主血肝藏血二臟俱受傷則血溢妄行流散不止氣逆則嘔吐而出血也

三汁飲 治吐血嘔血衄血等

麥冬汁 生地汁 生藕汁 熟冷水

各一鍾

白藥

一兩

和勻溫服一二鍾以差為度

生地黃湯 治憂愁恚怒嘔吐出血煩悶少氣胸中痛

懷生地

半斤

阿膠

粉炒研

炙甘草

兩半

用大棗水煎五錢空心溫服日二

荊芥穗飲 治嘔血不止

荊芥穗 山枝仁 片苓 蒲黃_{一兩}

水煎五錢空心溫服晚再服以差為度

唾血

論曰邪熱薰于肺則損肺恚怒氣逆傷于肝則損肝肺
肝傷動故令人唾血如唾中有若紅縷者屬肺臟如脇
下先苦痛而後唾鮮血者屬肝經俱可析而治之

紫苑散 治肺氣內傷邪熱薰積欬唾有血

紫苑 川歸 川芎 附子 款冬 五味子

白朮 桂心 生地 甘草 細辛 側柏葉

杏仁 去皮尖炒研 貝母 一兩

共末入蜜少許和滾湯空心下二錢晚再下

蒲黃散 治唾血不止

蒲黃 一兩生

研羅細末用冷水和三錢空心下日二

舌上出血

論曰心主血在竅為舌若心臟蘊熱血得熱而妄行或溢于心之竅故有舌上出血之症甚者出如涌泉

升麻湯 治心臟有熱舌上出血勢如涌泉

升麻 茜根 小薊根兩半 熟艾一把 凝水石三兩

水煎三錢去滓入生地汁半合再沸服日二

阿膠散 治舌上出血不止

阿膠粉炒研末 黃芪蜜炙 蒲黃新者一兩

共末用生地汁空心下二錢

熟艾葉湯 治心臟熱舌上出血及一切失血

熟艾葉

用糯米全炒

松黃

側柏葉

炙一兩

水煎三錢空心溫服日二

汗血

論曰內經云臟經通于心血脈之氣行焉又曰肝臟血故人卧血歸于肝然血雖藏于肝而妄則行之若肝心二臟俱傷于邪則血隨心液為汗而出是為汗血也