

欽定古今圖書集成醫部全錄彙編醫典

第二百七十七卷目錄

醫部全錄一百九十七

四散門九

鍼灸

導引

醫部全錄一百九十七

四散門九

鍼灸

導引

素問曰肝熱病者熱爭則狂言及驚脅滿痛手足厥
不得安臥庚辛其甲乙大汗氣逆則庚辛死刺足厥
陰少陽

腎熱病者先腰痛腹脹苦渴數飲身熱熱爭則項痛
而強筋寒且痿足下熱不欲言其逆則項痛員員滑

滿然戊己其壬癸大汗氣逆則戊己死刺足少陰太

陽

熱病先例痛手足厥刺足少陽補足太陰病甚者

爲五十九刺

熱病手足痛者刺手陽明太陰而汗出止

熱病始於足者刺足陽明而汗出止

蓋經起日正月二月三月人氣在左無刺左足之陽

四月五月六月人氣在右無刺右足之陽七月八月

九月人氣在右無刺右足之陰十月十一月十二月

人氣在左無刺左足之陰

平太陽之別名曰缺盆起於腕上分間雖太陽之經

直入掌中散入於指脛其病實則手銳掌熱虛則大

欸小使遺數取之去腕半寸則走陽明也

手少陽之別名曰外關上腕二寸外逢臂中合

心主病實則肘臂虛則不收取之所別也

足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其別者

循胫骨外廉上膝頭項合諸經之氣下結喉嚨其病

氣逆則喉痹卒喑實則在通處則足不收邪結取之

所別也

邪在肝則兩脅中痛寒中惡血在內行善怒時時

腫取之行間以引脊下痛三里以溫胃中取血脈以

散惡血取耳間青脈以去其邪

身有所傷血出多及中風寒若有所墮擊四肢解清

不收名曰體清取其小腹膝下三結文三結文者陽

明太陰也膝下三寸關元也

舉臂搖足不任身取天柱

病起手臂者先取手陽明太陰而汗出病起頭首者

先取項太陽而汗出病起足脛者先取足陽明而汗

出

熱病面青痛手足厥取之臂間以第四鍼於四逆

足難目沒寒痛於肝不得索之金者斯也

足靜不可舉側而取之在權合中以員利鍼大鍼不

可刺尚注下血取曲泉

雲門側骨委中體空此八者以瀉四逆之熱也

左足應立春其日戊寅己丑左手應立夏其日戊辰

己巳右手應立秋其日戊申己未右足應立冬其日

戊戌己亥歲辰以下應冬至其日壬子大寒太乙所

在之日及諸戌己凡此九者善候八正所在之處所

主左右上下身體有強勝者欲治之無以其所直之

日漬治之是謂天忌日也

全要略曰病狀顯其人但能前不能却刺顯人二

分此太陽經傷也

甲乙經曰寒熱懶懶浮遲經瘦四肢重痛少氣難言

至陽主之

留中影脈其則交兩手而臂舉舉端逆刺經渠及

天府此謂之大俞

寒熱咳嗽沫唾中熱虛則肩臂寒慄少氣不足以息

寒厥交兩手而臂口沫出實則肩臂熱痛汗出四肢

暴厥身溫搖時寒熱發則煩煩刺善而巨欸口噤不

開惡風逆出刺缺主之

心痛如懸陰厥脈微後摩急不可前却血虛則澀便

腹血足則上痛若不能言善笑足痿不收屈滑青

赤白黃黑青取井赤取泉黃取輸白取經黑取合

寒熱痿痺四肢不舉腹下腫馬刀瘻喉痹瘰癧瘻

搖痿痺不仁陽輔主之

寒熱瘰癧頭重足寒不欲食則舉京骨主之

寒熱鼻衄出逆逆脚腫寒重戰慄不能久立脚急腫

脚痛足筋掣少腹痛引喉咽大便難承筋主之

跟筋急急急痛引股股陰陰熱陰熱舉痛舉熱膝痠

重合陽主之

臂勞臂勞逆逆不溫呼吸少氣喘息不得舉臂功舉

主之

臂勞馬刀瘻不得舉臂舉主之

欽定古今圖書集成醫部全錄彙編醫典

第二百七十七卷目錄

醫部彙考一百九十七

四肢門九

鍼灸

導引

醫部彙考一百九十七

醫部彙考一百九十七

四肢門九

鍼灸

導引

素問曰肝熱病者熱爭則狂言及驚脅滿痛手足厥不得安臥庚辛其甲乙大汗氣逆則庚辛死刺足厥陰少陽

腎熱病者先腰痛而後苦渴數飲身熱熱爭則項痛而強筋寒且痠足下熱不欲言其逆則項痛員其澹滿然戊己甚壬癸大汗氣逆則戊己死刺足少陰太陽

熱病先例痛手足厥刺足少陽補足太陰病甚者為五十九刺

熱病手足痛者刺手陽明太陰而汗出止

熱病始於足歷者刺足陽明而汗出止

蓋經起日正月二月三月人氣在左無刺左足之陽四月五月六月人氣在右無刺右足之陽七月八月九月人氣在右無刺右足之陰十月十一月十二月

人氣在左無刺左足之陰

平太陽之別名曰別起於腕上分間雖太陽之經直入掌中散入於指歷其病實則手銳掌熱虛則大

坎小便遺數取之去腕半寸別走陽明也

手少陽之別名曰外謁土腕上腕二外透臂臂中合心主病實則肘臂虛則不收取之所別也

足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其別者循胫骨外廉上諸項項合諸經之氣下結喉嚨其病氣逆則喉痹卒背實則在頸道則足不收取所取之所別也

邪在肝則兩脅中痛寒中惡血在內行善怒時時睡取之行間以引脊下痛三里以溫胃中取血脈以散惡血取耳間青脈以去其邪

身有所傷血出多及中風寒若有所墜擊四肢解清不收名曰體清取其小股膝下三結文三結文者陽明太陰也膝下三寸關元也

舉臂搖足不任身取天柱

病起手足臂者先取手陽明太陰而汗出病起頭項者先取項太陽而汗出病起足歷者先取足陽明而汗出

熱病面青痛手足厥取之臂間以第四鍼於四逆筋變目浸寒痛於肝不得索之金者勝也

足臂不可舉側而取之在樞合中以員利鍼大鍼不可刺尚注下血取曲泉

雲門側骨委中體空此八者以瀉四肢之熱也

左足應立春其戊寅己丑左手應立夏其日戊辰己巳右手應立秋其日戊申己未右足應立冬其日己酉己亥

戊戌己亥歲以下應冬至其日壬子大寒太乙所

在之日及諸戌己凡此九者善候八正所在之處所主左右上下身體有強勝者欲治之無以其所直之日清治之是謂天忌日也

全要要略曰病狀顯其人但能前不能却刺腦人二分此太陽經傷也

甲乙經曰寒熱懶懶浮遲經瘦四肢重痛少氣難言至陽主之

留中彭師其則交兩手而臂舉舉端逆刺控運及天府此謂之大俞

寒熱咳嗽沫掌中熱虛則肩臂寒少氣不足以息寒厥交兩手而臂口沫出實則肩臂熱痛汗出四肢

暴厥身溫搖時寒熱發則煩煩則善而狂口噤不能言風逆出則缺主之

心痛如懸陰厥脈微後脈急不可前却血虛則澀便腹血足則上痛若不能言善笑足痿不收屈伸青

赤白黃黑青取井赤取泉黃取輸白取經黑取合寒熱痠痛四肢不舉腹下腫馬刀瘻喉痹瘰癧瘰癧

搖痲痺不仁陽輔主之

寒熱昏暗頭重足寒不欲食則舉京骨主之

寒熱鼻衄出逆逆即痛寒重戰慄不能久立即急腫

跟痛足筋掣少腹痛引喉咽大便難承筋主之

跟痛足筋掣少腹痛引喉咽大便難承筋主之

重合陽主之

臂勞梓陽逆逆不溫呼吸少氣喘息不得舉臂抄舉

主之

臂勞梓陽逆逆不溫呼吸少氣喘息不得舉臂抄舉

主之

臂勞梓陽逆逆不溫呼吸少氣喘息不得舉臂抄舉

主之

臂勞梓陽逆逆不溫呼吸少氣喘息不得舉臂抄舉

主之

臂勞梓陽逆逆不溫呼吸少氣喘息不得舉臂抄舉

主之

臂勞梓陽逆逆不溫呼吸少氣喘息不得舉臂抄舉

主之

善善悲不樂厥足下熱面盡熱汗行間主之

腰膝寒厥手背痛善驚妄言面赤汗出微閉主之

腰脊痛強引背少腹微仰微不得仰息惡寒尻不舉溺赤腫以下至足滿不仁可以坐起勝熱命主之

膝痛快慢不可以使仰膝以下至足不仁入脊腰背寒次節主之先取缺盆後取尾椎與八節

寒痛不可舉足跟中蹠後痛脚痿使舉主之

氣壅胸脇急腹脹內廉痛交信主之

臂滿膨脹熱則盡閉膝下腫虛則遺溺脚逆軟就

然病先手背微痛口鼻鼻張目下汗出如轉珠兩乳下二寸堅骨滿悸刺缺主之

振寒振寒手不伸肢厥滿渴氣易喘鼓脹不得汗煩滿因爲從難尺澤主之左室刺右室刺左

振寒小指不用寒熱汗不出頭痛喉痛舌卷小指之間熱口中熱煩心心痛胃內廉及脅痛熱咳痰口乾頭痛不可緩少澤主之

振寒寒熱打嗝臂滿頭不可煩煩滿身熱惡寒目赤痛臂生臂厥暴痛短氣短氣臂痛車痛肘臂痛於臂中引陽汗出而驚頭痛強身寒頭不可以顧後脊主之

振寒熱頭項痛實則肘臂項痛狂易虛則生瘧小者痛支正主之

氣喘熱病難不止煩心者也腹脹通息熱氣足經中寒不得臥氣滿臂中熱暴泄仰息足下寒中咽呃吐

不欲飲飲隱白主之

熱煩煩心足寒清多汗先取然谷後取太谿大指間動脈皆先備之

手足寒至節滿息者死

手足滿熱汗不出手肢轉筋頭痛如錐刺之狀熱不可以動動益煩心喉痹舌卷乾臂內廉不可及頭耳聾鳴眩陰皆主之

臂外廉痛熱病汗不出目外眦赤痛頭眩兩頰痛寒逆泣出耳鳴暴多汗目癢臂中痛不可及側痛無常處依絡主之

目視不明振寒目瞤瞳子不見淚兩脅痛脚痿轉筋丘墟主之

胸重身熱及寒凝汗不出煩心足下熱不欲近火項痛目瞤鼻及小便皆不利至陰主之

熱痛腰脊痛重數脈不能久立端如裂腳股急痛足舉引少腹痛喉咽痛大便難腹脹承山主之

四厥手足悶者使人久持之厥熱經痛內庭主之

瘰癧互引即如結如結如裂喉痛主之

瘰癧互引即如結如結如裂喉痛主之

瘰癧互引即如結如結如裂喉痛主之

瘰癧互引即如結如結如裂喉痛主之

瘰癧互引即如結如結如裂喉痛主之

瘰癧互引即如結如結如裂喉痛主之

瘰癧互引即如結如結如裂喉痛主之

瘰癧互引即如結如結如裂喉痛主之

瘰癧互引即如結如結如裂喉痛主之

瘰癧互引即如結如結如裂喉痛主之

瘰癧互引即如結如結如裂喉痛主之

瘰癧互引即如結如結如裂喉痛主之

膝以下至足滿不仁不可以坐起引不舉發命主之

足下熱痛不能久坐滿熱不能行三陰受主之

膝外廉痛不可屈伸經痛不仁陽關主之

臂中痛不可舉以毫鍼寒而留之以月生死爲病數立已長寒亦可

偏枯四肢不用臂大主之

手臂不得上頭八澤主之

兩手舉不收伸及腋偏枯不仁手病偏小筋急大陵主之

足不收痛不可以行大泉主之

足下發熱履癰主之

手足臂舉肘門主之

痺痺臂腕不用得物不收合谷主之

肘痛不能自帶太起頭眩痛面黃風肩背痛不可顧關衝主之

望外廉肘臂痛五指舉不可屈伸頭眩煩亂痛中渚主之

偏枯臂腕發痛肘屈不得伸手又風頭痛汗出自臂頭痛項惡煩驚五指舉不可屈伸厥休癰痛主之

風邪驚手腕痛汗風汗出至要陽谷主之

風逆暴四肢腫滿肘痛寒熱則煩心飽肘肘大節主之

風逆四肢腫滿復滿主之

寒風逆四肢腫滿復滿主之

寒風逆四肢腫滿復滿主之

寒風逆四肢腫滿復滿主之

寒風逆四肢腫滿復滿主之

肩中熱指臂痛肩隅主之
肩重不舉臂痛肩隅主之
肘重肘臂痛不可舉天宗主之
肘痛尺澤主之
肩肘中痛難屈伸手不可舉腕重急曲池主之
肩肘節痠重臂痛不可屈伸肘節主之
肘中攣攣臂內廉痛不可及頭外關主之
肘痛引肩不可屈伸振寒熱頸項肩背痛臂痿癱不仁天井主之
肘臂腕中痛頸腫不可以顧頭項急痛肘澤澤肩肘小指前谷主之
肩痛不可自帶衣臂腕外側痛不舉肘前谷主之
臂不可舉頭項痛咽腫不可轉前谷主之
肩痛欲折腕如拔手不能自上下養老主之
臂臥四肢不試動搖身體黃瘦手五里左取右右取左
女子手肘拘攣腹滿血月水不通乳餘疾瘰癧子陰瘰癧交主之
婦人陰挺出四肢浮滿身悶照海主之
臂內廉痛引頸不可屈伸連腹引咽喉痛膝關上之痛腫重足跗不收股痛巨虛下廉主之
脛痛足攣失履濕痹足下熱不能入立膝口主之
膝若痺痛不能屈伸不可行養丘主之
膝寒痺不仁不可屈伸轉關主之
臂引膝股外廉痛不仁筋急痺陵泉主之
寒從足小指起脈膊上帶臂臂痛無常處主陰主之

足大指搏傷下車按地過背指端傷為局解解主之
熱病煩心悶而汗不出掌中熱心痛身熱如火浸淫爛滿古本痛中衝主之
熱刺刺然谷足先寒上至膝乃出誠脈四逆喘氣滿身汗出而清體解中痛不可得行足外皮膚濕泣主之
身軀寒少氣熱甚惡人心惕惕然取飛揚及經骨跗下陷流立已淫淫程處熱汗不出督主之
寒濕淫古煩手臂不仁痺沫臂乾引飲手腕臂指股痛脚酸上氣耳中生風欬喘逆臂痛痺社飲食不下膨膨然少商主之
千金方曰掖門主手臂痛
巨關主手清
肩自主手凝木不舉
陰交主手肘拘攣
少商主手不仁
列缺主手臂身熱
大陵主手舉不伸又云主手擊小偏
內關主手中風熱
間使主手痛
曲澤主手背逆氣
中衝臂少衝大泉經渠列缺主手擊肘中痛
前廉主臂臂舉急手不舉
尺澤主臂痛手不可伸
神門少海主臂舉
養老主手不得上下

內庭主四厥手足問
厥骨中渚主五指攣不可屈伸
曲池主手不可舉重腕急肘中痛難屈伸又云主手不舉
陽谿主臂腕外側痛不舉
心掌肝脈主臂急手相引
尺澤關衝外關救陰主臂不及頭
前谷後絡陽谿主臂重痛肘臂
臂會支溝曲池腕骨肘節主肘節臂臂直重厥急痛肘難屈伸
中宛陰譚主厥舉
腕肘前谷曲池陽谷主臂腕急腕外側痛脫如拔天井外關曲池主臂痿不伸
大泉經渠主臂內廉痛
巨骨肘前谷主內不舉
肩髃天宗陽谷主臂痛
曲池關衝三里中渚腕谷尺澤主肘痛肘舉
陽谿主肘急不能自舉友
魚際重道主肘舉性滿
大陵主肘舉肢痺
間使主肘內廉痛
地五會陽輔中渚委陽天池臨泣主腋下垂
天宗主肩重臂痛
肩外廉主肩用痛而寒至肘
腋骨主肩臂痛
陽關主肘外廉痛不可屈伸臂痛不仁
崑崙主肘如結聚如裂

陰陵泉主足痺痛

京骨平山承筋脚丘主脚痺

承山承筋主脚痺脚急腰痛脚筋急筋絕

浮白主足痺不收

天柱行間主足不任身

行間主厥足中熱

然谷主足不能安履度不能久立

中都主足下熱腰寒不能久立溫痺不能行

衝陽三里僕參飛揚復留元胃主足痺失履不收

僕參主足跟中蹠後痛

飛揚主蹠中痛

復留主腰寒不能白溫又主脚後廉急不可前足跗

痛

京骨然谷腎輸主足痛

太谿大筋勝臑主足清不仁

地倉大泉主足蹠不能行

光明主膝蹠不能起

風府蹠蹠主足不仁

脣口三里承山承筋主足下熱不能久立

丘城主腕不收坐不得起解脛脚痛

澤哺陽交陽泉主臂脛膝骨痛不仁

環跳束骨交陰除交陰合主臂脛中痛不可舉

臨泣三陰交主臂中痛不得行足外皮膚

中脘隱白行間主腰中寒熱

大衝涌泉主腰痺

跌陽主脇外廉骨痛

至陰主風寒從足小指起脈痹上下

至陽主腰疼四肢重少氣難言

厲兌脣口三陰交主腰寒不得臥

內庭趾主肢痛不可屈伸

陽明環跳承筋主腰痺不仁

涌泉然谷主五趾蹠痛足不踐地

風市主兩膝痺痛引骨拘急痺癢或青或黃或枯或

驚却麻木

太衝主膝內膝前痛

梁丘曲臑陽主膝痺膝不得屈伸不可以行

懷鼻主膝中痛不仁

中封主少氣身重濕痺腫內膝前痛

解谿脣口丘墟太白主膝股脛筋酸痺筋

合陽主膝重

上廉主風水膝腫

陰市主膝上寒

伏兔主膝中寒

俠谿陽關主膝外廉骨痛

髀關主膝寒不仁痿痺不得屈伸

光明主膝痛屈伸不能行手足攣小

膝關主膝內廉痛引臍不可屈伸連臍引咽喉痛

凡攣臍應可灸不可刺若其上腰勿攻之即死

章門主四肢懈惰息怠

曲泉主四肢厥寒

曲泉主四肢厥寒

曲泉主四肢厥寒

曲泉主四肢厥寒

曲泉主四肢厥寒

曲泉主四肢厥寒

曲泉主四肢厥寒

照海主四肢痿痺

五里三陽絡并胃經三陽主嗜臥四肢不舉動搖

復溜豐大都主風逆四肢痺

則氣動矣風市穴伏兔穴次膝關穴

後三里穴上廉穴下廉穴次臑骨

又灸八處第一風市穴次伏兔穴次膝關穴

臂直下舒十指掩著兩臂便點當手中央指頭轉大

節上是灸之百壯多亦任人輕者不可減百壯重者

乃至一處五六百壯勿令頓灸三報之佳第二伏兔

穴令病人累膝端坐以病人手牽兩膝上指下旁

與曲膝頭齊上旁側肉際當中央是灸百壯亦可五

十壯第三膝骨穴在膝端骨上厥外骨邊平處以

手按之得解解則是一云在膝端下近外三骨其體

中動則以手按之得解解是灸之五十壯可至百壯

第四膝關穴在膝端骨下兩旁陷者宛宛中是第五

三里穴在膝端骨下五寸附脛骨外是一云在膝

頭骨節下三十人長短大小當以病人手度取灸之

百壯第六上廉穴在三里下一寸亦附脛骨外是灸

之百壯第七下廉穴在上廉下一寸一云附脛骨外

是灸之百壯第八臑骨穴在肘外緣上一寸一云四

寸之是凡此諸穴不必一頓灸盡壯數可日日夜夜

灸之三日中灸令盡壯數為佳凡病一腳則灸一腳

病兩腳則灸兩腳凡脚弱骨節多兩腳又一方云如

覺脚便覺灸三里及經骨各一處兩腳者合四處

灸之多少隨病輕重大要經脈不可減百壯不獲速

以次灸之多多益佳一說灸經骨最要人有患此脚

弱不即治及少履履重上氣於足乃須大灸受隨

曲泉主四肢厥寒

曲泉主四肢厥寒

曲泉主四肢厥寒

五指骨痛取環跳穴關合谷
曲池手三里
此治瘰癧同上
痺寒力倦諸取脾骨橫紋二分痛則渴無力劇者
灸之

時疫氣逆風取環跳在髀腹中側臥伸下足屈上足
方可鍼可入三寸半補少滿多留八吸足筋一寸二
分漏八吸滿之麥中出血

時疫壯熱取環跳膝臑鍾鐺英作丘墟鍼五分留三呼
灸之壯

時瀉痢疾風不能轉側坐動輒難取環跳三寸半灸
七壯風市灸二七壯又取中崑審三里陽陵泉
如不已取下穴五極關中

假胃風取脊中崑輸人中
假胃風取脊中崑輸人中

辟除心驚足痿腰疼痛痺按脊冷麻不可屈伸臂
痹流注取市中清陽關懸鐘
環跳取陽陵泉三里伏兔陰市
風火之取風後曲脊其處
市灸之取風後曲脊其處
風暴外痺痛腫腰膝痠疼用坐痹或膝腿熱不可行
動取秩脊五分錯刺明各一寸
行痹引膝軟尺脈重痛膝股痠痛有聲諸節盡不能
行取陽陵泉中封
風濕內蘊痛引臍不可屈伸連引咽喉痛取大衝

五中封膝關

腰痠寒足下熱不能入立濕痹不仁取中都衝陽承

山承筋

腰痠四肢重少氣難言不得臥取至陽三陰交

草鞋風取崑崙崑崙之留六呼太崑崙之留六呼申脈

五分補少滿多留一呼忌灸

草鞋風取崑崙崑崙之留六呼太崑崙之留六呼申脈

五分補少滿多留一呼忌灸

又法取足居丘墟商丘陷海如不已取後穴太衝解

足腕不任痿躄坐不起轉脚痛取光明治皮五分丘

墟重五分

腕痠不收寬足不任腰取然谷浮白崑崙

外踝紅腫痛取申脈半寸瀉之

轉腰風取曲池如轉外踝痛掌刺孫絡如轉內踝痛

取足少陽小指間三分兼刺大都二分如繞前廉痛

刺行間六分

脚背紅腫取太衝丘墟衝陽陽指出血腫泣

又法取太衝陽池行間內庭如不已取崑崙丘墟

大指節前骨疼取太衝彈絃出血

足五指盡痛不得踐地取湧泉一分然谷一分

鶴膝風腫及屈伸取腕骨在膝孟骨上一寸榮丘穴

兩旁各五分鍼入五分留一吸瀉之又取膝關在膝

蓋骨下體內旁橫微膝眼在體外旁榮穴留

八呼瀉之

膝腫取行間又取陽陵泉橫透陰陵泉補生瀉成取

陰陵泉橫透陽陵泉補生瀉成又取膝關

脚抽痛取委中出血

脚膝痛筋急取風池二間三陰交三里

寒膝伸不屈治其梗在轉輸骨上橫骨下股外之中

側立搖動取之筋動應手

坐而膝痛治其梗在轉輸骨兩旁相提處

立而膝痛治其梗在轉輸骨兩旁相提處

膝解中熱者治其熱

膝痛痛及痺治其熱在膝解之後曲脚之中委中

穴

坐而膝痛如物隱者治其熱在梗之後背立按之動

搖筋應手

膝痛不可屈伸治其背內大杼穴也

連筋者折治陽明中脘二里穴也

膝痛若別治巨陽少陽榮然谷穴也

淫澤經瘦不能久立治少陽之經在外踝上五寸光

明穴也

兩肘俱舉取曲池九分先瀉後補西呼瀉九呼尺

澤手如力方可鍼五分先補後瀉

筋臂骨痛取通門補之

張仲文神仙灸法治脚筋急不可屈伸灸曲風兩

文頭左右脚四處各三壯即內外曲交穴每灸一腳

二火齊下艾柱燒燒至肉初覺疼使用一入齊改至

膝筋拘攣不開取兩膝外曲交穴灸二十七壯即牽

陽穴

景岳全書曰凡脚氣初覺即灸曲風三三壯或用

雷火鍼以導引濕氣外出及飲醃醃以通經散邪其

要法也

若痺既成而邪毒者必腫痛甚一時藥餌難散宜

灸去惡氣以消熱腫之刺之後以藥搗之

導引

奇效良方曰治脚痺筋急伸屈難舒向前其痛

即止

保生秘要曰手足麻痺導引法者左足搭右膝上以

右手扳左腳左手托脚跟取向右頭即轉左右亦如

之兼法運動氣脈自則通功氣血兩通之速起於膝

元會意導引法漸行患處多旋自轉以還原位行住坐

臥得閉皆可運用或將以指拈捻摩按之更痛使

血氣暢之意

手足麻痺病急轉行通氣法或金針再推散四肢主

骨節疼痛想火燒之

手指痛依急急用藥酒再折分散

手足不仁目轉筋痛并氣滯皮癢骨水瀉患處痛身

汗出四肢痠要在動行是妙功道宜兩足交相摩更

可三陰穴處同

手足酸先急腕大瀉泉是功按上至膝又從膝處助

按下至涌泉止又從左手助按過右手右手助按過

手足大燒患處推散想水洗之

平生得獲手內外骨節處想火燒之又以水洗之再
遍散四肢血脈

足歷廉瘡依患處念用環轉數次推開分散用火燒
之即愈

手動風從左手心處想火起轉至於肩過心頭直至
右手心處亦想火轉至肩過心頭於左手心處

腳氣涌泉穴在足心濕氣皆從此入日夕之間常以
兩足赤肉更次用一手握指一手摩擦數日多時覺

足心熱即將指略略動轉倦則少歇或令人擦之
亦得終不若自擦為佳脚力強健無痿弱痠痛之疾

矣
附通關注從北極定極斗柄大旋三偏天地包羅行

於臍下分開兩路旋下兩腿之前聯絡不絕雙行轉
腿底向後換元海上至金門會合從右轉左大旋三

偏從椎骨下分行兩肩經肘後外關達掌心循內關
過肩井由項後透泥丸行明堂漸落雙瞳自面部下

胃腸背心窩從左轉下降大旋三偏如前臍下分開
循環徧體周流運用卯酉二辰行之或九度或二十

一度而止慎勿執著若有若無此所謂煉其形和其
氣也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百十八卷目錄

醫部彙考一百九十八

醫案一

醫案一

藝術彙考一百九十八

醫部彙考一百九十八

四肢門十

醫案一

醫案一

醫案一

醫案一

醫案一

醫案一

醫案一

醫案一

醫案一

醫案一

醫案一

醫案一

醫案一

醫案一

醫案一

醫案一

醫案一

醫案一

可堪百醫無效及到京有馳名上此方用之幾藥也

方用馬齒兒嚼爛上不通二兩福

澤摩錄曰會稽楊梅爲天下冠實苦脚氣或云楊

梅仁可治之郡守王崑饒五十石良用之而愈取仁

法以柿漆拌梅基之即自裂出也

儒門事親曰新羅馬夏年五十九因欠秋稅官杖之

得驚氣成風喘已三年矣病大發則手足顫掉不能

持物食則令人代哺口日微乾唇舌燥爛引漱之狀

如絛引傀儡每於市人皆聚觀夜臥於熱衣被盡去

獨身燥中熱而及外寒又試白蠟手不能握須者

求醫至破其家而病益堅更之子邑中儒小史也以

父母病訊數人載人曰此病甚易治若醫藥時不遇

一涌再涌則愈今已秋寒可三之如未愈更刺喉穴

必愈先以通聖散汁之湯服涌刺則吐痰一二升至

晚又下五七行其決小愈待五日再一涌出痰三四

升如黃蘗成塊狀如湯熱更以手顫不能自探妻與

代探咽噎連傷昏憤如醉約一小時許漸醒又下數

行立覺勢輕頭減熱亦不作足亦能步手能巾棉自

持匙補之及則白濕蓋大疾之去復氣未復故宜

以散風導氣之藥切不可熱劑溫之恐反成他病

也

黃如村一瘦南手搖狀如傀儡冬月不能履被遺

戴人之舞陽道經黃如不及用藥鍼其兩手大指後

中注穴上戴人自肘已上若無術能南手搖楊左

氏所謂風淫末疾者此也或刺後浴手太陽穴屈

小指握紋處是穴

李氏一小兒病手足搐搦以示戴人戴人曰心火勝

也勿特提手當從涌指此出乳母保抱太極所致

乃令補淨地以水灑之乾令復灑之令極淨後見兒

於地上良久渾身轉動泥泥滑滑仍以水洗之少頃

而瘳矣

一稅官風家病痔瘡難治重洋難療則痛甚兩足惡

寒經五六日間醫者掃撲洗擦皮膚少清有斑膏則令

風發之流入經絡共病轉走汗上下往來無定其

病極處便覺不寧而轉起內不覺難理如蟲行每遇

風冷病必轉增飲食減少肌體瘦之須人扶始能行

立所服者皆附藥桂枝湯燥熱難癒者戴人知其數

前後二年不愈一日予脈之其兩手皆沉滑有力先

以導水凡通經散各一服是夜二十餘行涌減半

漸服赤茯苓湯用芎藭防風湯此三方在宣明論中

治痔方是也日三服服七八錢聚聚汗出又作珍

曉露法無恙而愈

頭暈目眩自體至足生濕患瘡大者如錢小者如

豆或則擦破水到則浸淫狀類行棉棉愈而復生

瘡膿成片十餘年不瘳戴人哂之曰此濕熱也出

水濕而得故多在足下以每車滾下天十餘行一

去如掃

谷陽縣清監張仲溫謂一劇觀匠者胡靈臺高四尺

許因登之上下重或一足外膝難起熱痛如火一醫

欲以針鍼刺腫上出血戴人急止之曰膿已痛矣更

加鍼之二痛俱作何以必也乃與神針八九十九

下二十餘行飲食禁物夜半腫處痛痛止行步如

常戴人曰吾此法十愈不逆後人

常仲明之妻每遇冬寒兩手熱痛載人曰四肢者諸陽之本也當夏時熱而不痛及乎秋冬收斂則痛

百五十粒通經散二錢散比至夜午下十四行便立消作胡桃枝反細於不傷之經載人曰慎勿貼膏紙當令毒氣出流膿血水常行又一人載人恐毒氣未盡又服舟車丸百餘粒瀉川散三四錢又六行病人曰十四行易當六行反難何也載人曰病盛則勝藥病衰則不勝其藥六日其膿血盡載人曰膿水行時不畏風濕後畏風也乃以愈風餅子日三服之又二日方與生肌散一傳之而成皮腐嗚呼用藥有差幾使差別相懸向使不見載人則利誠之言非也以此知知醫已難用醫尤難

服膏藥丸健步回陽矣
東垣十書曰雲霧難醫重寒矣即冬大寒時因事到東垣忽覺有風氣乘至診候得六脈俱沉按之洪實有力其證手雖急大便秘澀面赤熱此風寒始至加於身也四肢者脾也以此風寒之邪傷之則痞急而變勞乃風淫未去而寒在外也內經曰寒則筋急正謂此也人素飲酒而有濕熱乘於脾胃之間故大便秘澀面赤熱內則手足陽明受邪外則足太陽經感風寒之邪用桂枝甘草以却其寒邪而護其急插又以黃藥之苦寒以瀉實而潤燥急救乾水用升麻葛根以升陽氣行手足陽明之經不令濕氣以桂枝辛熱入手陽明之經為引用酒燉復以芍藥甘草專補脾氣使不受風寒之邪而退本邪專益肺金更加人參以補元氣為之輔佐加當歸身去寒急而和血潤燥活血通經湯主之

之劑調之酒燉之刺淺之惟小指次指尚寒載人曰病根已去此餘熱也方可鍼豁谷豁谷者骨空也一日痛和往鍼之用重權中雖足法向上臥鍼三進三引訖復卓鍼趨向下臥鍼送入指間皆然手熱如火其麻全去昔劉河間問作原病式常以麻與酒同歸燥門中真知病機者也

息脚腰股沉痛行步至馬皆不便或作脚氣寒濕治之或作虛損治之為兩孔復活血壯筋骨之藥無不用之至六十餘日亦赤上熱大小便俱瀉腰股之病如故載人診其兩手脈皆沉遲沉者在裏也宜壯之

乙巳春庚午年二十八身健元氣始發頭面渾身肢節微痛皆否足腰膝痛不可忍不敢扶策手若皮膚皆轉其起而復臥臥而復起晝夜苦楚難以名狀求子治之平章以北土南寒飲多飲酒積久傷脾不能運化飲食之所致投以當歸枳痛瀉一兩錢其痛減半再服痛漸除止有右手指未微亦瀉以二錢候刺手爪甲端多起惡血赤腫全去不數日飲食漸振肢體覺痛痛以枳實大黃湯治之去風氣之食食水瀉之為也新滋其濕血並而不可故服煩燥內經曰風能勝濕羌活桂枝湯溫經節去濕故以馬主血謂即不能行則痛當歸之辛溫散壅止痛相宜其為寒治瘡膏食故以馬主血

載人女儀兒有瘰癧載人令服舟車丸瀉川散大下之連愈人或疑之載人曰心火降則下寒消何疑之有

服藥白粥一二頓與之上馬已能履健矣
葉漢李十八郎病腰脚大不伸促健跛而行已數年矣服藥無功止藥即愈因秋暮涉水病復作醫氏使服四斤丸其父仲安乃乞藥於載人載人曰近日服何藥仲安曰四斤丸日得赤水其父驚曰日正暮發載人曰宜速來不來則喪明矣始來策杖而行目雖無所見載人先令蒲之藥下忽忘二十石兩日頓明藥已棄去比再蒲蒲能讀古曆日調一月令

散壅止痛相宜其為寒治瘡膏食故以馬主血

麻先生兄村行為大所稱昇至家應舉如鐵堅若鐵石毒氣入裏毒不下食頭痛而重住問載人女儀曰痛則利瀉以枳實丸下之見兩行不盡載人自舞陽曰謂麻曰既經如此足之三三三三陽可乎麻曰俱不可行知是何不大下之乃命夜臨臥服舟車丸

日頓明藥已棄去比再蒲蒲能讀古曆日調一月令

散壅止痛相宜其為寒治瘡膏食故以馬主血

寒以薄衣之濕熱傷於諸老血留結其發時故以
丹使也
丹使法曰倘初病底知難刺痛或則腫手腕亦痛
而腫大便泄滑甚急此血少又下焦血分受濕氣為
病健步凡主之
一材夫背低僅而足響已成廢人予診其脈兩手皆
沉弦而滑近以蠶人蝦腎故與之上桂下瀉過月餘
久吐瀉交作如此凡三貼然後平復
司承叔平生則自肆以下常覺熱冬不可加棉於上
書自言曰我資稟壯不怕冷予曰此足三陰虛宜斷
慾事以補養陰血庶乎可免矣而不吝年方十七患
瘵年而此

衛生寶鑑曰吳定府張大年二十九素好嗜酒至元
辛未五月間病手指節腫痛屈伸不利膝腫亦然心
下痞滿身重不飲飲食即欲吐面色萎黃精神
神減求至六月間求手予治之診其脈沉而緩緩者
脾也雖經云輸主體重節痛腫者脾之所主四肢屬
脾蓋其人素飲酒加之時助濕氣大勝濕於四肢故
為腫痛內經云諸濕腫痛皆屬脾土仲景云濕流關
節肢體煩痛此之謂也宜以大羌活湯主之內經云
濕淫於內治以苦溫以苦發之以淡澤之又云風能
勝濕羌活湯治溫濕關節而腫痛故以為君升麻
苦平風濕仙防風辛平苦辛溫發之者也故以為臣
血藥而不流則加當歸辛溫以散之甘草甘溫益氣
緩中澤瀉微平茯苓甘平導濕而利小便以淡澤之
也使氣味相合上下分散其濕因
中書折合公年四句錄於處補丙辰後從至揚州

北之東武偶偶忽作偏身肢體微腫其病乎不能
近足經尤甚履不任穿鞋以騎馬空而健而以竹器
盛之以阻惡來告予思內經有云欲發於中則難於
外又云諸痛為實實貴者宜決之以三針鍼數刺其
腫上血突出高一二尺餘漸消如線流於地約半升許
其色紫黑頃時腫消痛減以當歸芍藥湯重一兩半
服之是夜得睡明日再服而愈本草十劑云宜可去
瘰癧可去漆內經云濕淫於內治以苦溫羌活苦辛
透關節而勝濕防風甘辛溫散經絡中流濕故以為
主水桂瀉下升麻微苦甘辛平味之薄者陰中之陽
引而上行以苦發之也白朮苦甘溫和中勝濕養木
體輕汗氣力雄壯能去皮膚諸理間濕故以為臣夫
血藥而不流則痛當歸身辛溫以散之使血氣各有
所歸人參甘平溫潤脾氣正氣使苦劑不能傷
胃仲景云濕熱相合肢節煩痛者參黃芩同用治濕下
苦寒乃苦以泄之者也凡皆製妙以為因用治濕下
利小便非其治也猶若甘溫平澤瀉鹹平淡以滲之
又能導其留飲故以為佐氣味相合上下分清其濕
使滲泄之氣得宜通也

征南副元帥大貳木兒年六旬有八戊午秋征南
從之過揚州十里時仲冬病自利完數不化解度冷
終足筋寒以手搔之不知痛癢者幾日以溫之亦不
得理予診之脈沉細而微予思之年高氣弱深入敵
境軍事繁冗朝朝暮暮飲食失節多飲乳酪晨於早
濕滯不能外固因是清溫濕熱起於下故所為痛
逆內經云風於寒而受病微則為感則為大故為痛
此寒濕相合而為病也故當急退寒濕之邪雙補其

陽升矣不能病先以大豆佐於氣散寒胃壯補下
焦陽虛次三三穴各三七壯壯壯而愈且接
引陽氣下行又三陰穴二穴以散足受寒濕之邪
遂處方云寒淫所勝治以辛熱溫淫於外平以辛熱
以苦發之以兩子大辛熱助陽退陰溫散寒故以
為君乾薑官桂大熱辛甘亦除寒濕白朮辛甘辛
溫而燥脾濕故以為臣人參辛甘溫養脾胃辛甘辛
溫溫中益氣生薑辛溫能散濕滯之邪散白辛溫
以通上焦陽氣故以為佐又云補下治下利以急愈
則氣味厚故大作劑服之不數服而止痛遂止筋漸
溫調其飲食逾十日平復明年秋過揚州值值雨前
旬餘前添復作再依前法添補陽氣各三三壯再以
前藥投之數服長愈

至元壬午五月二十八日王伯廉年踰五旬有七右
臂臂腫盛上至肩下至手背皮肉腐爛六脈沉細
而微此乃脈滯供寒子舉舉痛痺痺和之曰此乃
附骨癰疽發已過以燔鍼灸之熨消腫解大日附下
再開之加吃逆不捷予和與丁香桂枝散兩服稍緩
大日吃逆尤甚自利膿血冷痛膿腐飲食減少時發
骨痛於左乳下臍處發一王壯又處托裏溫中湯
用乾薑附子木香沉香茴香羌活等藥服一兩半
欲與服或者曰諸痛痒癢皆屬心火火食盛鬱之
時用乾薑附子可乎予曰之曰理所謂然不得為不
內經曰脈細皮寒諸利前後飲食不入此謂五虛見
此逆者胃中虛寒故也諸痛痒皆屬心火非大言
幸熱之劑發治之則不能愈也遂投之諸痛悉去飲

金倍虛勞過飽色正和復用五香湯數日後月餘平復雖守常者衆人之見知親者習者之事知常而不知變新事因而取敗者亦多矣兄醫乎哉守常知變可同日而語哉

醫學綱目曰有人重病足不履地者十年見醫藥莫能治所親望之遑遑以求救者遇一游僧見之告曰此疾一藥可治但不知此土有否因爲之入山求索果得乃藏寶仙也使服之數日能步履其後山人謂愚漢知之遂著其法云採得陰乾月餘通節溫酒和之錢七空心服之如人本性較藥可加及六錢匕利過兩行則減之病除乃停服其性甚善不寒諸藥但覺茶及麪湯以甘草梔子代飲可也

一男子手足常自汗醫用茶連梗藥并補劑皆不效又足汗常多以八物半本爲君白附川烏佐使其汗即無

孫少府監藥查正舉得疾手足不舉諸醫皆以爲風鍼手足亦不知痛楚名孫診之孫曰此腳氣耳用橫柳木三錢生薑三片紫蘇七葉陳皮二錢水一大盞煎半上生去其熱服數劑即愈

一男子年近三十滋味膏粱性多焦怒秋間覺左右一點發痛延及於膝蓋靜夜劇惡夢口或渴或不渴或治或不治醫用風藥兼用補血至次年春其膝漸腫痛甚愈益黃瘦形軀瘦至手足膝腫如桃其小便赤數而便遂作飲食痰積在太陽陽明治之炒黃藥一兩在甘竹梢角屑木薑子木薑子各三錢川芎二錢陳皮半錢通草各五錢通煎煎加條三

錢爲細末每三錢車更生薑自熟汁同研細多少以水邊煎成膏帶熱食前飲之一晝夜四次與至半月後數服漸減漸輕至單加半條收效板半兩當歸半兩如前服又與半月應漸減食漸進不惡寒唯脚膝微軟未能久立及行乃於前方中去蒼木黃半時當夏熱加炒黃藥至一兩半半依本方內加半條春夏用芽葉冬用根枝取汁用之效尤速須斷酒肉溫潤胡椒散更加生地黃半兩冬加黃桂枝不月而愈

有人嗜酒日須五七十杯後患脚氣甚危或救以巴戟半兩糯米炒丸酒水下五七十丸仍禁酒速愈降已醫按曰文選號海山中譽頭痛發熱氣高而喘肢體倦怠兩手麻木全謂熱傷元氣用元參金氣湯頓安又用補中益氣湯加麥門五味而痊

衆人于尚之素稔積勞虛勞不能步履後舌瘡不能言面色黧黑余謂腎氣虛寒不能運及所發用地黃散子治之而愈後不復溫潤而復作或用牛黃清心丸之類發熱發其誠似中風用祛風化痰之類小便乾澀口舌乾燥仍用前飲及加減八味丸酒愈又用補中益氣湯而痊

一男子元氣素弱或頭目眩暈或肢體倦與仲復因勞役飲食不特兩于膝木狀體倦息余以爲蒸熱傷元氣用元參益氣湯而愈

知州韓廷儀先患風毒用疏風化痰養血之藥而痊其腿膝骨內發熱作痛服十味固本丸天麻丸益甚兩尺脈數而無力余以爲腎水虛不能生肝木慮大

內動而非風邪所致也不信又服寒涼愈風丹之類四肢痠痛偏身麻木凝滯上薄神思不清余曰皆脾氣虧損不能榮養周身及不能運歸脾土用六君子加黃連木香數劑壯脾理氣以導運歸脾又以八珍湯數劑以期五臟生之氣以榮養周身而諸症漸愈乃朝以補中益氣湯湯養脾肺以六味地黃丸滋補肝腎如此三月餘而安

新開老天丸元氣虧損後因四肢不收自汗如水小便自遺大便不實日緊日閉飲食不進十餘日或以爲中藏公喜憂余曰非也若風既中藏氣既脫恐或即見厥在反掌焉能延之乃候其至而目俱赤而肝經血虛肝氣否塞也四肢不收肝經血虛不能養筋也自汗不止肝經熱熱清涼寒也小便自遺肝經熱甚陰挺矢氣也大便不實肝木感風短脾土也遂用芍角散四劑漸覺氣愈又用加味逍遙散調理而安後因憂鬱前復作發熱熱吐飲食少思月經不止此木爲短土而脾不能養血也加用加味歸脾湯爲主佐以遠志散調補肝脾之氣清和肝脾之血而愈後每遇怒或睡中手足搐搦復用前藥即愈

一婦人素經水通期因勞怒四肢不能屈曲名曰癰瘕此血虛而然然者未用八珍湯加四逆散藥胡漸愈見危以加味逍遙散調理而痊

家幸劉翁因勞怒下體軟弱發熱痰涎用清熱湯入竹瀝薑汁服之熱痛減半再劑而愈

吾師愈愈知愈日大同因勞怒日五成風病矣兩腿迅則瘳軟而無力勞則作痛如鐵刺數散而有

力余言曰此肝腎陰虛火盛而致虛軟無力真病之元作痛知能飲火之氣也用壯水益腎之劑而愈先生曰何謂當歸耶以爲風恨無藥若服風藥則其陰散乃其之幸也竊謂諸症往往以爲風藥輒用發散而促其危者多矣

一婦人素血虛因大勞而足發熱肺熱月經過期或用四物不速效食少思閉痞結痰用二陳和實運大便不實吐痰甚及足厥作痛全口足熱肺熱月經過期乃肝腎血虛火胃病性寒飲食少思閉胃氣虛也蓋胃爲五臟之根本胃氣一虛諸病悉生先用補中益氣加茯苓半夏脾胃漸健乃佐以六味九以補肝腎不兩月而痊

一男子足膝軟日脚膝全口此足陰虛虛用六味滋腎一丸補之婦人足無力勢則傷思全口四肢者土也此傷脾虛宜用補中益氣及還少丹主之俱不從余言各執後服天麻一丸狂愈風丹而頑余素性從柔觀者入則愈必服補中益氣加麥門五味酒清苦藥少許力覺精神清安否則夜間少寐足內發熱若再長久不寐腹內亦熱且覺腹內筋似有抽搐致兩腿左右顛移展轉不安必至倦極方寐此勞傷元氣陰火乘虛下注丁酉五一歲歲

經中有如物作怪作態不其則口舌如有瘡癰日哺益甚若過長久或服前藥始安至壬午時五十有五晝間齒縫中作膿服補中益氣一劑夜間得寐至壬寅有內服之變日間雖服面則夜間雖服亦無甚至午前諸痛皆肢體方得稍健午後仍服數劑可知血氣日衰治法不同

一儒者四時喜寒熱飲食或吞酸噯腐或大便不實足指趾溫存此脾氣虛虛下陷用六君子加薑桂始之而愈稍爲失宜諸疾仍作前藥更加附子錢許數劑不再發

一男子形體倦怠飲食過可足指趾溫存行坐久則重墜此脾腎氣虛而下行用補中益氣加茯苓半夏而愈

一儒者雖盛暑喜熱火四肢常微滑湯漬之而赤吐痰一似胃火吐甚而食亦由惟食椒薑之物方快余謂食入反出乃脾胃虛虛用八味九及十全大補加炮薑漸愈不月千復

一儒者善飲便滑溺滿食減胃滿腸足漸腫腰膝腎虛虛用加減金匱腎氣丸食進漸消更用八味九胃強脾健而愈

用補中益氣加炮薑而愈

關老受厚瘡氣短有痰小便赤濡足跟作痛尺脈浮大按之則滑此腎虛而痰飲也用四物連六味九不月而康仲景先生云氣虛有飲用腎氣丸補而汪之誠開後學之鑒賡清無窮之天札腎氣丸即六味九也

一儒者患夢遺則作痛口乾作渴大便乾燥半復然用補中益氣湯加芍藥元參并加減八味九而愈

大尹徐克明因飲食失宜日哺發熱口乾體微小便赤濁兩腿發熱夜夜如自四物黃連知母之劑及頭眩目赤耳鳴燥熱便秘大便熱痛小便赤澀

又用四物各連枳實之類實屬陰虛飲食少思汗出如水再用一陳辛連黃連知母麥門五味言語謙安兩手麻痺余謂此冬工陽解解所用藥其各五錢歸本各三錢連志茯苓神效仁花甘草每一錢服之熱腫良久四劑稍安又用八珍湯調補而愈

一儒者因系結腰膝軟面黑余疑是足腫小腹脹痛上氣痰喘余以爲少陰陰損損氣虛虛之證用八味九料服服諸症漸愈又服九劑半年元氣漸充形體如故

一婦人發熱口乾月經不調半載後兩腿無力服祛風散濕之劑服益服益增更傷思慮事不運余作肝脾腎虛虛用六味八味一丸重服兩月諸症漸愈

一男子腹內作痛用參溫化境寒痛連腎肉而赤吐痰脚跟發熱口乾胃虛虛火上炎實宜通達不信服黃連知母之類而反

通府實廷用飲食起居九宜兩足發熱口乾吐痰自

用一陳四物各益其兩尺數而無方余曰此腎虛之證也不信仍服藥藥足腿熱發化爲瘡書又服導濕之劑亦腫大體外用敷藥而出水久而不愈及用追毒丹瘡火如挑始信余言滋其化瘡半載得瘡

儒者章立之左股作痛用清熱解毒之藥而亦腫脹痛連腰背風足無力余以爲足陰虛虛用補中益氣六味地黃兩月餘元氣漸復諸症漸愈其慎延年許而痊

府岸鍾之妻周風生髮色紅如似似者三四月痔瘡相傷水淋漓痛熱內熱口乾而響此腎虛之證用加減八味九數日而愈此等症候用祛風散毒之

劑以致誤人多矣

一男子素患精弱跟作痛口乾作渴大便乾燥午後熱甚用補中益氣加芍藥元參及六味丸而愈
大尹王汝婦兩足發熱吐痰如湧左尺數而無力余謂足三陰虛夜反腹四時一陳黃華如母之類發舌作痛又服清熱散毒之劑其舌如赤桃脈洪數而無力此脾肺復傷經筋長虛火上炎水泛而為痰也當益化源以生腎水遂用補中益氣湯六味地黃丸而痊

聞老新介庵師指擬作症出水腫煩脚而數止痒之藥不應服餘藥之劑余甚余以爲陰虛濕熱下注用六味地黃丸補中益氣湯而愈

大魯李北渡左足赤腫作痛此足三陽經濕熱下注先用隔蒜灸令軟一劑其痛頓止爰患處出水赤腫頓消天用托裏散毒散四劑矣患處出膿而愈常有地瘡元思即發發後微赤此足三陰經陰虛濕熱下注用隔蒜灸托裏散而起發用十全大補湯而腫減又與加減八味丸料百劑而愈

一儒者患腳氣腫硬色白兩月餘矣此足三陰經虧損爲外寒所侵用大防風湯及十全大補養服而消後屢屢不利飲食勞倦前復作遂江內熟飲食不化便難數此脾土虛寒而命門火不建相火用八味丸氣湯百餘劑甚且年壯得愈

一男子脚心發熱作渴引飲或用四物不連黃連知母藥腹痛作嘔熱大渴此足三陰經損而後復傷脾胃也元用六君加知母散數劑而脾胃醒再用補中益氣加茯苓半夏厚朴健胃以加減八味丸兼服

半數而愈

一儒者脚心發熱作嘔以淡湯及滾滾而出水肌體付立作渴以此脾虛而水泛爲痰也服益氣湯六味丸九劑元氣復而諸愈

少宗伯顧東江面黃而諸余以此腎虧損當滋化源以杜後患後雖熱之而終不服大元九月內左足面患處紅腫不痛脚腫沉重用隔蒜灸三十餘壯足壓即輕痛出水數口而消清赤矣仍隨時公將北行賀萬壽余診之曰脾虛氣弱氣虛極不宜急行公曰余得慶慶輸向夢華仙待我此壽徵也至河間縣聚仙堂病篤數日立瘞蓋能留我果幸於此亦異數也

一人足指患脫疽痛赤熱陰虛發之更以人參敗毒散去桔梗官桂加天花粉金銀花數劑而痊
一人年踰四十左足大指赤腫微痛此脾經毒下注而然名曰脫疽痛赤而腫以人參敗毒散去人參桔梗加金銀花白芷大黃二劑更以金銀花甘草湯苦薑四劑頓退再以十宣散去桔梗官桂加金銀花防已數劑愈

一人足指患脫疽已紫赤不痛痛發五十餘壯尚不痛又明矣首壯始痛更投仙方活命飲四劑乃以托裏散滋陰而愈
一齊梁人年逾五十患脫疽指已紫黑脚軟癰腫真入曰脫疽之證悉新去之毒甚脫疽不治治爲惡不痛者亦不治其飲食如故動息自寧爲瘡毒之證悉也尚可治遂以連翹敗毒散六劑更以金銀花甘草

柿苦蜜二十餘劑患指潰脫更以荷歸生地連龜金銀花白芷十餘劑而愈大元忽發瘡子治以加減八味丸不離服生薑等藥甚服八味丸而止

一婦人左足指患一泡膿水色赤大指無五日足是黑冷不知疼痛脈沉細此脾胃受毒所致連服靈壽命丹一服翌日全割去足上死肌肉割後骨始痛可救治以十全大補湯而愈元九月乃毒氣盡而拒截榮氣所致況至陰之下血氣難通緣云風淫木疾是也何若夜伐之則邪氣乘虛上侵必不救也
一人足指患脫疽已不痛冷明矣二十餘壯而痛喜飲食即常于兩膝到去之連服補劑後不信果遂上遂致不救

一人足指患脫疽赤熱痛作渴陰虛發之更以仙方活命飲三劑而潰更服托裏散加減八味丸潰脫而愈
一婦人年踰四十近患脫六生一毒只脫五趾不能伸屈曰脾寒格於肝經腫痛未腫生肉肝主筋肉溫則筋舒冷則筋急遂與香定痛丸之少愈更以助胃壯氣血藥十餘劑而消

王汝道患脫赤腫指有痔瘡服十宣散不愈診其脈沉細子以五積散一劑而痛止更以十宣散去桔梗加牛膝杜仲三十條劑漸消而愈此毒之瀰八風之變也
一男子足指患脫疽大痛已赤而兩腳發至痛止以人參敗毒散去桔梗加金銀花白芷大黃而潰更以仙方活命飲而痊此證形勢舉小其甚甚大須隔蒜灸之不痛者宜明灸之庶得少殺其毒

一男子腰背患腰痛亦係作痛令隔其灸二十餘壯痛止以仙方活命飲四劑而痛更以托裏消毒藥而愈

一男子足指患脫趾赤赤嫩痛作渴痛發熱數壯服仙方活命飲二劑而痛更服托裏藥及加減八味丸潰脫而愈

一男子脚背患脫趾痛而不腫痛煩躁大渴已脈大而潰此病氣已絕不治後果愈

一婦修甲傷大指被藥不潰嫩痛手誤飲冷藥以致患脫趾嫩痛少食後以爲痛氣內攻而然予診其脈沉細此痛傷胃氣而爲毒也遂刺之服六君子湯加香薷藿香食愈更以八珍湯加黃芪以甘桔梗月餘而愈

一幼女因風傷手足至春發潰指俱壞遂去之服以大補藥而愈

一女患跌打傷指年餘不愈日出膿數滴予謂足大指乃肝膽二經發源之所宜灸患處使瘀肉去陽氣至痛口自合否則不治後愈之不早治後幾勞證而殺蓋至陰之下血氣難到女患此多因勞傷致血脈不通或候風邪所襲則無血氣養遂成死肉惟當壯脾胃行經絡生血氣則愈有破破傷風以致牙關緊急口眼喎斜者先具玉真散二服後及以生血通經之劑則可

一男子修傷足指色黑不痛而欲飲余曰此因陽氣虛不能運達於患處也急去之速服補劑以壯元氣否則氣血不足不收矣不信果黑腫上腫而元氣抵手足氣血寧到之地或生瘰或傷指者狀其元氣

邪氣甚其潰爛延上必死不潰面色黧者亦死若骨斷筋皮尚連者急治之

趙子因母劉氏年六十左足面一瘡下連大指上延外踝以我藥皆每歲數發必發必愈旬月皆尋瘡甚極搖搖時出血如足流呻吟痛楚殆不可忍夜分即漸已明日復發每一更藥則瘡大面而創百試不驗如是二十餘年清熙甲辰仲冬之末先生爲大府

承一父母病大作相料甚難無計困極就舉夢四神僧默坐一室有一長楊子固亦半因而發虎一僧問其故子固答之曰實僧云可服牛黃金虎丹又一僧云珠砂亦可服服覺頗難試取半粒強服之

以久大痛藥家相信且備供而下碾確物如鐵石者數升是夕痛微瘳不痛而無血數日成佈自此遂愈其珠砂之說竟不復試先生因圖僧像如所夢者而記其事金虎丹出治國初方非老人所宜今乃取奇效意熱熱難驗而發於皮膚此久根深未易洗

云

大尹陳汝鄰兩腿殘軟或赤或白足跟患腫或痛或痒後痛而或如無皮或如刺難且腫至夜痛痛熾熱用硝中益氣湯加八味丸料補其肝腎而愈

一男子足跟作痛熱渴渴極小便如淋誤用敗毒散致頭痛惡寒欲嘔不食吐痰咳嗽此足三陰虧損而藥後傷金用十全大補湯加減八味丸各五十餘劑

一男子素不慣起居內熱引飲作渴體倦兩足發熱

後足跟作痛或用清熱降火之劑更加發熱又服敗毒之藥亦痛甚格用托裏消毒藥清熱養氣調狀如赤楊熱痛如錐內熱腫痛此因足三陰虧損引致十全大補湯久用加減八味丸外數劑皆痛兩月餘而愈其服清毒等藥而反者不能枚舉

一男子亦患足跟痛服清毒散擦搽他藥虛虛舉出其形體骨立自必死余用十全大補湯加山茱萸山藥兩月餘而愈

朱任向因足足腫然有聲半立久則左足麻木難夏月足寒如冰嘉靖己亥夏月因腰膝痛覺欲水復經

運覺右腹痛結以手摩之腹間漉漉有聲熱摩則氣泄而止每加刺飲食稍多則痛遂求治於醫令服根木丸固守無效甲辰歲求治於予曰此非脾胃

病乃命門火衰不能生土虛寒使火然也若專止脾胃誤矣可服八味丸則愈服之果愈八味丸有附子醫家因政經用大附子新開書旗同生起死非

良將莫能用

楊錦衣脚跟生毒如豆許痛甚狀似傷寒予謂獵人被虎咬脚跟成瘡理應爲終身之疾若人脚跟患瘡亦終不愈因名氣喘也遂以還少丹內塞散治之劑

可因因納藥作痛及服敗毒藥致血氣虧損腰膝軟而疔蓋足跟乃一脈之通處腎經所由之地瘡口不合則氣不能發生腎氣由是而泄故爲終身之疾况復毒先得於虛後知成瘡大補氣血猶恐不及况服敗毒藥乎

一膏藥之人兩脚發熱作渴口苦服散而無力全謂此足三陰虧損防惡風不信反服清熱化痰之藥更

加補熱頭運又服四物黃藥如母日補熱甚飲食漸少腳小面發紅余用補中益氣六味地黃九百餘服而愈其不信虛者以致不起者多矣

一婦人經候不調發熱肺熱胃弱不利飲食少思服清熱寬中消滯之劑前證愈甚更覺肢體痠痛腹脹濕化痰等藥經候兩三月一至服通經降火之劑足跟足指作痛其熱如炙余以為足三陰虧損用補中益氣六味地黃九兩月諸證漸退又用前湯并八珍湯兩月而康

一婦人足跟患腫兩腿痠軟或赤或白或痛或痒或如無皮或如皴裂日腫至夜腹痛熾熱此屬足三陰虛損用加減八味丸及逍遙散加熟地川芎白芍劑而愈

一婦人勞則足跟熱痛余以為足三陰虛用八珍而後後偏身痠疼誤服風藥發熱抽搐肝脈洪數此肝家血虛火盛而生風以天黃歸身丸用四物麥門五味交連芩甘草山梔柴胡煎送下面愈

一婦人兩足發熱足跟作痛日腫甚余以為肝腎血虛用加味逍遙散六味丸五十餘劑諸證悉愈

新都楊大僕年餘四十左足大指赤腫微痛此經經積毒下注而然余曰脫腫也黃色赤而痛以人參敗毒散去人參梔梔加金銀花白芷大黃一劑更以苦薤金銀花甘草煎四劑頓退再服以十宣散去桔梗官桂加金銀花防己數劑而愈

韓判官亦患脫趾痛甚亦不痛以隔蒜灸至五十餘壯尚不知痛又明灸白芷方知乃以敗毒散加金銀花白芷數劑而愈

一婦人臂痛筋攣不能伸屈遇寒則劇脈緊細主陳良甫所謂肝氣虛風寒流於血脈經絡搏於筋筋不榮則乾乾而為痛先以舒筋湯更以四物湯加杜丹皮澤蘭白朮治之而愈亦有臂痛不能舉或轉左右作痛出中腕伏按臂肌澤而不白宜茯苓丸或控涎丹治之

一婦人患遍身走痛兩月後左腳腫大幾脫履又患一塊脈經診則浮寒冷近接此氣血不足勝理不密寒邪襲虛而加減小續命湯四劑及加滋養生湯數劑疼痛漸去更以托裏藥倍加參芪歸木百貼而愈

劉生才臂結核如粟延至頸項共如癰癰此風濕流注亦以前藥治之而愈

一婦人兩腿脫紫黯寸寸搖破出血或用風乾血年餘漸開如掌許乃服草烏等藥遍身搔痒時出血木內熱鬱積飲食無味月經二月一至服洪而散後之則清此燥劑愈傷脾而血先以補中益氣湯加芎芩川芎五味十餘劑乃與加味逍遙散加熟地芍藥約二十餘劑再用歸脾湯加用芍藥熟地黃治之而不發

一男子善怒面青腿內腫患癖瘕色赤作痒或為疔刺出血發熱微痛作痛脫清風散而愈服過仙丹愈加熱作渴仍服之藥水沖湯其脈洪數左關為甚余謂用經血虛火內動復傷其血而瘡其耳先用柴胡清肝散數劑又用四物山梔子治之諸證漸愈用八珍湯地黃九兩月除而痊

一入腿內側患癰未作癰而腫痛以內托黃芪桑菊

湯一劑稍愈又一劑而痊

一入腿內患癰腫作痛四肢麻痺喉乾發熱發熱諸治不應乃服經絡而然也用玉容通經湯一劑諸證少退乃服大便利一天諸證悉退而愈

一婦人二十餘歲內患赤白久欠求內清涼痰滑數知解已成因氣虛虛不渡達刺之藥出作痛用八珍湯稍可但腫未消漸用十全大補湯加炮附子五分服數劑漸愈服十全大補湯二十餘劑而愈丹溪云癰出及痛者虛也則開赤云

有僧因內患腫一塊不痛不瀉治以托裏藥二十餘劑喉乾刺作痛予謂腫而潰潰而反痛此氣血虛甚也宜峻補之補氣補血無補法予謂正氣不足不可不補補之則氣化而痛自除遂以參芪歸木熟地黃治之兩月餘而大凡瘡瘍先發為難氣血鬱積蒸肉為膿故多痛腫瘻之疾雖退則氣血必漸減而痛愈盛者此氣血不足也亦丹溪所謂開赤之說

一入股外側患癰腫痛以內托黃芪芍藥一劑少可更以托裏藥數劑清之而愈

一入年餘左下要腰左腿外患癰毒三月方潰膿水清肌肉不生以十全大補湯加牛膝二十餘劑漸愈更以玉容散灸月餘而痊

一男子素有脚氣自下作痛發熱頭暈常吐酸水不仁服清毒護心等藥不應左關脈浮右關脈弦此亦脚氣也以牛黃左金湯治之而愈

一入腿內內潰之膿出四五塊許惡臭食積食積即如瘡此陽氣也以四君子加炮附子一錢煎藥少止又四劑而止以六君子加桂枝散飲食頓進乃以

十全大補湯及參附子餅兩月餘

一老人弱羸羸自遺精腎虛而微此氣血虛極也以前補之劑而能

一婦左腿痛不能伸屈膝緊絞之則痛以五粒散一劑痛少止又二劑而止以神應素且而念以脈弦緊

清屬寒故用五種散辛熱以散之

一右腿亦腫軟痛於其脈沉數則當歸拈痛湯四支反痛乃濕毒鬱遏又况下部藥力難達其藥不對證遂起虛處去毒血仍用前藥一劑頓減又四劑而消

一八年踰五十多患腿腫脈數煩躁飲冷便結腫痛微其此熱浮於內也宜用苦寒之藥投清涼飲倍加黃芩其熱頓退更以四物湯加黃芩而愈

一八年三月連得患作勞好色左腿外側紅腫如粟腫以大府實與承氣兩貼下之又一醫與大黃味砂血竭三貼而腫大虛後果死此厥陰多氣少血故也

一入腿腫腰成缺之出膿一梔許飲托裏藥一劑大發熱用參茸湯一劑而止翌日惡寒不食腹如絲以人參一兩熟附三片薑薑煎服而愈但食少不寐更以內補黃芩湯而愈

一入腿腫發熱惡寒以補中益氣湯治之從以爲緩乃服不連等藥熱甚盛得清治以人參養榮湯二十餘劑而漸更以參芪歸本或甘草肉桂月餘而愈夫失之爲病偏分實實者速苦寒能消心肺有餘之

火若老弱或飲食勞倦而發者此爲不足當以甘溫之劑治之未嘗有實熱而畏寒熱而喜寒者此其驗

陳監生年踰三十五腿微腫而脈虛雖日久肉已却故不思飲食東垣云骨節之證屬下而堅者發於筋骨此附骨疽也乃氣虛濕氣凝於肉理而然蓋諸腫皆寒於胃食少則胃弱壯氣速以六君子子湯加蒼朮當歸散劑飲食漸進更以十全大補湯而愈

一入過身走痛兩日夜在脚面結腫未幾腿股又患一塊紅腫診則浮腫診浮腫此氣血不足勝理不密寒邪襲虛而熱以加減小續命湯四劑及獨活寄生湯數劑疼痛頓大更以托裏藥倍加參芪歸本百貼而愈

南司馬士則山腿腫作痛寒熱發渴飲食如常脈洪數而有力此足三陽經濕熱毒常消積散毒散一劑而寒熱止再劑而腫痛消更用通散散而元氣復兩月後因惡腫痛如雞赤腫散過用活命飲一劑而痛減又用八珍湯加柴胡山梗丹皮而痛止復因勞役倦怠懶食惡重頭暈此脾胃氣虛不能升舉也用補中益氣湯加參劑子而安

一儒者兩腿腫痛肉色不變惡寒發熱飲食少思肢體倦怠此脾氣不足濕痰下注也以補中益氣加半夏芍藥茯苓一劑寒熱退而腫痛消又十餘劑脾胃壯而形體健

一男子入房後患兩腿腫硬不便不通余謂開載於二陰此乃肝腎虧損也用六味九利加車前千牛

陰而一便利用補中益氣湯而腫痛漸消其年少得生

一上合腿痛如雞肉色如敗肉黃機食痛甚作嘔此痛傷胃也六君子以和其脾胃用十全大補以助其腰而氣之更用而湯治如參芪黃歸本五味達志貝母而愈

一男子因勞傷飲食失節胃間作痛誤認爲毒毒服大黃等藥右腿腿腫肉色如敗肉痛甚惡寒喘渴發熱脈洪大而無力此勞傷元氣虛弱而然耳用補中益氣湯四劑又用十全大補湯數劑其年少而愈

湯屬解少溪兩腿生瘡痛甚遍身發熱吐痰口燥咽乾盜汗心煩渴亦足熱日痛甚甚惡寒此脾經虛火也用六味丸不月諸證悉退三月元氣平復

一男子左腿腫肉色如敗肉惡寒心飲食少思此脾氣不足而爲邪邪所感也用六君子加蒼朮梗川芎而寒熱止又用補中益氣湯而腫痛消

陳陸院忠誠因陰虛感風人房發熱腿痛似癰瘡用發表之劑兩腿腫痛惡寒發熱發熱惡寒發熱數兩尺九六余日屬足三陰虛感風所乘元氣損而邪谷甚耳用十全大補加山藥山藥兩劑一劑而愈

頭退却去附子又一劑全愈