

見形證治

痘瘡之期始於見點從見點而數之期止七日七日之內如花之始蕾而發也其氣日盛以出七日之後氣斂而花謝矣故服藥者當於七日之內日夜連服毋或姑息苦之以七日所以全之於百年人不知此而惟務姑息七日之外服無益矣予嘗謂痘毒之在血氣譬若糠粃之在米也惟血氣充足運轉迅急若篩米然運轉不停則糠粃不混於米而騰起浮聚自作一團血氣充足周流則毒不滯於榮衛之中而自然收斂以成瘡故痘瘡及時貫膿未嘗爛肌損肉只

是將皮肉紅色毒氣收貯窠囊而已其有日久纔發臭爛者此皆變證而非本然如此也今舉世以食物發痘而不知其本無益也惟服補氣血藥以助其運行推出之勢可也

發熱三日之後熱退身涼大小不等作三次出淡紅色如水珠光澤者不須服藥 凡痘子出現疎則毒輕不可妄治密則毒甚却要磊落大小分明不相粘連畧與托裏解毒之劑快斑湯消毒飲主之使之易發易屬如出太密粘連模糊其毒尤甚托裏解毒之劑宜多飲之以防癢瘍黑陷之變更察外證可治則

治不可則勿治 凡痘子出形皮肉如常根苗明潤
此毒輕也 不可妄治 如皮肉昏黑或赤腫根苗乾枯
青紫或灰白者此毒甚也 以消毒飲奪命丹合服

快斑湯

人參 伍分

當歸

防風

木通 各壹錢

甘草 參分

木香

紫草

蟬蛻 各貳錢

右剉細水一盞煎七分去渣溫服不拘時

消毒飲

牛蒡子

連翹

甘草

綠升麻

山豆根

紫草

各等分

右剉細水一盞煎七分去渣溫服不拘時

奪命丹

麻黃

升麻

各半兩

山豆根

紅花子

大力子

連翹

各貳錢半

蟬蛻

紫草

各壹錢半

人中黃

參錢

右研細末酒蜜和丸辰砂爲衣薄荷葉煎湯下
凡痘子之出最要唇潤舌潤紅鮮如常其毒則輕如
唇焦破裂舌燥有芒爲毒火太甚表裏鬱遏急宜解
之黃連解毒湯加大力子

黃連解毒湯 煩躁

發熱一二日便出如纔發一二日間痘便一齊湧出者須問其曾數日前有熱否如曾數日前乍熱乍涼以過期論惟原未發熱至今纔熱便斑現此表氣虛毒氣盛榮熱衛弱腠理不密肌肉不堅不能約束於外使毒氣衝擊故出太驟也宜用實表之劑可以無癢瘍無潰爛實表解毒湯主之一方用羌活散調

紫草膏或保嬰丹加紫草牛蒡子蟬蛻與服熱盛不退以羌活散調退火丹進之另用燈草木通蟬蛻地骨皮煎湯候冷服此用發表之劑與表虛衛弱之說

背馳蓋亦有初發熱時見表證失於解散實熱壅遏而怒發者此法猶可施也然得全者鮮矣

實表解毒湯

黃耆

人參

當歸稍

生地黃

白芍藥

地骨皮

甘草

酒片芩

柴胡

元參

升麻

右剉細加薄荷葉少許淡竹葉拾片水煎溫服無時

消毒快癆湯

桔梗

甘草節

荆芥穗

牛蒡子

防風

當歸尾

赤芍藥

天花粉

黃耆

元參

連翹

前胡

木通

水煎服

清地退火湯 治痘帶熱而出名爲火裏苗急用此
方以退其熱則後無青黑變陷之候

地骨皮

地膚子

錢各壹

牛蒡子

紫草

葛根

各捌

分

連翹

陸

痘瘡

公私四

百二石經堂

當歸

伍分

木通

參分

蟬蛻

貳分

右加薑一片水煎服如熱不退再服一劑或爲末
燈心湯服

羌活散

本門初熱

保嬰丹

本門預防

退火丹

卽六一散加牛黃

纏豆藤

見初熱

發熱四五六日始出如發熱四日至五六日後始出者須審視曾有外感內傷否蓋傷風寒傷食之熱久而不去則所蘊瘡痘之毒亦能乘間而出不可以過期論惟無內傷外感之因一向熱而不出此裏氣虛不能驅逐其毒使之卽出而毒邪得以留連停伏於

臟腑腸胃之間宜先用托裏之劑令其快出次以和
中之劑多服之可以無伏無陷無倒曆托裏宜托裏
快癥湯或十宣散和中宜四君子湯加黃耆或保元
湯合勻氣散主之

托裏快癥湯

當歸

黃耆

川芎

木香

青皮

牛蒡子

紫草

連翹

木通

防風

桂枝

蟬蛻

右剉細加淡竹葉十片水煎溫服無時

十宣散 一名十奇散 一名托裏十補散

黃耆

人參

當歸各貳錢

厚朴

薑製各壹錢

桔梗

各壹錢

桂心參分

川芎

防風

甘草

白芷

各壹錢

右爲細末每服一錢或二錢木香湯調下

增損八物湯

人參

黃耆

白朮

甘草

當歸

川芎

牛蒡子

赤芍藥

防風

荆芥穗

連翹

桔梗

葛根

右用水煎服

勻氣散

木香

青皮

各伍錢

山楂肉

貳錢半

右爲細末每服一錢甘草湯調服

應出不出痘疹之出自有常期如過期應出不出有數證不同不可不辨如內素實之人皮厚肉密毒氣難於發越一旦恃其體厚不怯風寒又爲外邪所襲或體素弱者風寒易感以致腠理閉密氣血凝澀故

應出不出也其證頭痛四肢拘急僵倚蓋覆常惡風寒此類宜發之氣強者用雙解散氣弱者用參蘇飲或惺惺散俱初熱或內虛者脾弱食少宜用補脾之劑加行氣發表藥四君子湯不能調元湯卽參耆飲並加木香青皮黃耆桂枝或臘膈自利宜用溫裏之劑黃耆建中湯腹痛益黃散脾竅與奪命丹合進利未止者豆蔻丸泄利合進益裏溫則氣不消削氣不消削則不陷伏矣若依上法分治猶不出者此毒壅伏於三焦不久而變生焉

加減參蘇飲

人參

紫蘇葉

葛根

陳皮

前胡

白芷

桔梗

枳殼

甘草

羌活

防風

右用竹葉爲引熱服

加減調中湯

人參

白朮

黃耆

甘草炙

木香

桂枝

白茯苓

藿香

白芍藥

酒炒

陳皮

右用生薑爲引煎服

聞人氏覩云是痘疹證熱數日而不發見者進退皆難便欲大發之懼其本稀而成癰爛不發之又無以出其毒氣古人立論始以藥微發之微發不出則加藥加藥不出則大發之大發之後所出不多氣候和平無他證者卽是瘡本稀不可更發也以此言之發不至太過守不至不及乃用藥之圓活也愚按古方用發表者升麻葛根湯輕劑也惺惺散重劑也謂微發謂加藥者或先用輕劑後用重劑或只用本劑先小作湯少飲之後漸加大多飲之非謂於本方之外

再加辛熱大發之藥也

凡痘疹過期應出不出者或因外感風寒依上發表之法或因內虛泄瀉依上和中之法如按法調治猶不出快熱反甚大渴腹脹滿大便鞭結不通煩躁不安者此毒邪壅伏於內三黃丸七味升麻丸初熱擇而用之甚則三乙承氣湯主之大便聞人氏云且身熱脈數大便祕而腹脹此熱毒壅遏未見形狀者當微下之非微下則熱不減此是始者熱在裏痘未出之時也若痘點隱隱在皮膚中者是已發越在表瘡正發時則不可妄下也又有結膿窠痴疣之際脉尚

洪數能食而大小便祕此表已罷裏有熱毒宜微利之大抵臟腑有熱往往利大小便者以其主出而不內故也

張氏從道云瘡痘氣勻卽出快蓋氣勻則榮衛無滯勻氣之藥如桂枝防風荆芥穗薄荷葉所以行在表之氣而使之無滯也故凡發表之劑多用之木香青皮枳殼木通所以行在裏之氣而使之無滯也故凡和中之劑多用之又瘡出之時常宜和緩如三春發生之氣則氣血和暢自然其出快其發透其疎齊若偏於太熱則壯火食氣其氣反虛而不能行偏於太