

欽定四庫全書

子部

尚論篇卷四

下

上至



欽定四庫全書

尚論篇卷四上

尚論太陰經證治大意

新建 喻昌 撰

仲景傷寒論六經中惟太陰經文止九條方止二
道後人致惜其非全書昌細繹其所以約畧之意
言中風即不言傷寒言桂枝即不言麻黃言當溫
者則曰宜四逆輩全是引仲觸類之妙可見治法

總不出三陽外但清其風寒之原以定發汗解肌
更於腹之或滿或痛間辨其虛實以定當下當溫
而已了無餘義矣是非深入閭奧者孰能會其為
全書也哉

太陰經全篇

法九條

一太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛
若下之必胸下結鞕

原文

腹滿自利太陰之本證也吐而食不下則邪迫於上

利甚而腹痛則邪迫於下上下下交亂胃中空虛此但可行溫散設不知而誤下之其在下之邪可去而在上之邪陷矣故胸下結鞭與結胸之變頗同胃中津液上結胸中陽氣不布卒難開也

二太陰中風四肢煩疼陽微陰澀而長者為欲愈

原文

四肢煩疼者脾主四肢亦風淫末疾之驗也陽脈微陰脈澀則風邪已去而顯不足之象但脈見不足正恐元氣已漓暗伏危機故必微澀之中更察其脈之

長而不短知元氣未漓其病為自愈也註不審來意
謂瀉為血凝氣滯大謬豈有血凝氣滯反為欲愈之
理耶

三太陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯

原文

太陰脈尺寸俱沉細今脈浮則邪還於表可知矣故
仍用桂枝解肌之法也 太陽經中以浮緩為中風
浮緊為傷寒故此不重贅但揭一浮字其義即全該
風邪用桂枝湯其脈之浮緩不待言矣然則寒邪之

脈浮緊其當用麻黃湯更不待言矣況少陽篇中云
設胸滿脇痛者與小柴胡湯脈但浮者用麻黃湯早
已挈明用麻黃湯之義故於太陰證中但以桂枝互
之乃稱全現全彰也不然同一浮脈何所見而少腸
當用麻黃太陰當用桂枝也哉

四自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也當溫之宜服

四逆輩

原文

註謂自利不渴溫邪也故用四逆輩以燠土燥濕此

老生腐譚非切要也仲景大意以自利不渴者屬太陰以自利而渴者屬少陰分經辨證所關甚鉅蓋太陰屬濕土熱邪入而蒸動其濕則顯有餘故不渴而多發黃少陰屬腎水熱邪入而消耗其水則顯不足故口渴而多煩燥若不全篇體會徒博註釋之名其精微之蘊不能闡發者多矣

五傷寒脈浮而緩手足自溫者繫在太陰太陰當發身黃若小便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日

十餘行必自止以脾家實穢腐當去故也 原文

太陰脈本緩故浮緩雖類太陽中風然手足自溫則不似太陽之發熱并不似少陰厥陰之四逆與厥所以繫在太陰允為恰當也太陰脈見浮緩其濕熱交盛勢必蒸身為黃若小便自利者濕熱從水道暗泄不能發黃也前陽明篇中不能發黃以上語句皆同但彼以胃實而便鞭其證復轉陽明此以脾實而下穢腐其證正屬太陰耳至七八日暴煩下利日十餘

行其證又與少陰無別而利盡穢腐當自止則不似少陰之煩燥有加下利漫無止期也況少陰之煩而下利手足反溫脈緊反去者仍為欲愈之候若不辨晰而誤以四逆之法治之幾何不反增危困耶雖陽明與太陰腑臟相連其便鞭與下利自有陽分陰分之別註家歸重於脾謂脾為胃行津液則如此不為胃行津液則如彼似是而非全失仲景三陰互發之

旨

六本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之

原文

太陽病之誤下其變皆在胸脇以上此之誤下而腹滿時痛無胸脇等證則其邪已入陰位所以屬在太陰也仍用桂枝解肌之法以升舉陽邪但倍芍藥以收太陰之逆氣本方不增一藥斯為神耳

七大實痛者桂枝加大黃湯主之

原文

大實大滿宜從急下然陽分之邪初陷太陰未可峻

攻但於桂枝湯中少加大黃七表三裏以分殺其邪可也

八太陰為病脈弱其人續於便利設當行大黃芍藥者宜減之以其人胃氣弱易動故也

原文

此段叮嚀與陽明篇中互發陽明曰不轉失氣曰先鞭後溏曰未定成鞭皆是恐傷太陰脾氣此太陰證而脈弱便利減用大黃芍藥又是恐傷陽明胃氣也尚論篇卷四上

欽定四庫全書

尚論篇卷四中

新建 喻昌 撰

尚論少陰經證治大意

傳經熱邪先傷經中之陰甚者邪未除而陰已竭
獨是傳入少陰其急下之證反十之三急溫之證
反十之七而宜溫之中復有次第不同毫釐千里
粗工不解必於曾犯房勞之證始敢用溫及遇一

切當溫之證反不能用詎知未病先勞其腎水者不可因是遂認為當溫也必其人腎中之真陽素虧復因汗吐下擾之外出而不能內返勢必藉溫藥以回其陽方可得生所以傷寒門中亡陽之證最多即在太陽已有種種危候至傳少陰其辨證之際仲景多少遲徊顧惜不得從正治之法清熱奪邪以存陰為先務也今以從權溫經之法疏為前篇正治存陰之法疏為後篇俾業醫者免臨岐

之惑云

少陰經前篇

凡本經宜溫之證悉列此篇

一少陰病始得之反發熱脈沉者麻黃附子細辛湯主之

之原文

脈沉為在裏證見少陰不當復有外熱若發熱者乃是少陰之表邪即當行表散之法者也但三陰之表法與三陽迥異三陰必以溫經之藥為表而少陰尤為緊關故麻黃與附子合用俾外邪出而真陽不出

纔是少陰表法之正也

二少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附

子湯主之

原文

得之一二日即上條始得之之互文口中和者不渴

不燥全無裏熱其背惡寒則陽微陰盛之機已露一

斑故灸之以火助陽而消陰主之以附子湯溫經而

散寒也

三少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二

三日無裏證故微發汗也

原文

不吐利煩燥嘔渴為無裏證既無裏證病尚在表可知故以甘草易細辛而微發汗又溫散之緩法也

四少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也虛故引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便白者以下焦虛有寒不能制水故令色白也

原文

欲吐不吐心煩腎氣上逆之徵也自利而渴加以口燥舌乾引水自救似乎傳經熱病之形悉具然腎熱

則水道黃赤若小便色白又非腎熱證乃下焦虛寒不能制水仍當從事溫法不可誤認為熱而輕用寒下也

五病人脈陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利

原文

陰陽俱緊傷寒之脈也傷寒無汗反汗出者無陽以固護其外所以邪不出而汗先出也少陰之邪不出則咽痛吐利一一顯少陰之本證即當用少陰溫經