

欽定四庫全書

子部

仁端錄卷十一



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

仁端錄卷上

齊肅

肚痛

書

陽相拒而為腹痛或作塊

之藥又當察外症不得妄一傷氣使蘊其毒而不得宣

傷生冷痘因而發以致

服與和平勻氣兼發散

明 徐謙 撰

陳葵 刪定

化也訣曰發熱腹中痛斑瘡腹內攻發多防不透發少便防癰惡候也故心胸大痛者不治

痘疹腹痛者毒蘊於三陰也臍以上屬太陰脾經當臍屬少陰腎經小腹為厥陰肝經須細別

初熱腹痛

內毒與外邪相搏欲出不出而腹痛飲食如常而腹痛者用化毒湯

原熱腹痛熱二三日後便秘而痛者燥糞與毒相併也

用三黃丸七物升麻湯或桂枝大黃湯

胝妄狂亂而腹痛者用三一承氣湯

或食生冷而腹痛者用理中湯加桂心

食過多而痛者痛必亟疾啼叫甚痛在臍以上飽悶噫

氣而青白唇淡手足冷量輕重消之用升消平胃散一

服即止或原物湯及神曲山查砂仁枳實廣皮紫蘓

腹脹硬痛便閉者下之用備急丸

發熱自利腹痛者痛必緩有作有止痛在臍以下或連

腰痛面紅唇紫手足不冷用黃芩湯加木香青皮或化毒湯

泄瀉腹痛者用托裡建中湯

痘未出身熱煩躁腹痛莫忍而不休者亟用活血散服後不止必出紫黑有紅斑瘡乃極重之候或獨蟬湯立見紅活

如腹痛大便實者用桂枝大黃湯調獨蟬湯活血散嘔吐蛔蟲而痛用平胃散加烏梅

吐利腹痛乃太陽寒水乘脾土也用益黃散寒甚用附子木香痛止瘡亦發

若焦躁小便數唇焦發泡而腹痛用犀角地黃湯合化斑湯兼活血透肌散

腹痛痘不出而發厥者用芍藥甘草湯加蟬脫煎服使毒氣泄而四肢溫而痛止

痘乍出乍隱腹痛者用七物升麻湯

初發熱及標痘時腹痛乃毒猶在內出不盡也用至寶

飲倍山查青皮木香少加柴胡煎服拔毒出外其痛自止

痘初出腹痛若暑月用黃芩黃連大黃牛蒡少磨木香汁寒月瘡黑者寒邪也用木香丁香

痘出三日尚未齊或見點紅赤過度腹痛難忍脾毒不能發越氣血凝滯或風之閉故也用獨蟬湯手中有痘始為出齊

痘出盡而猶腹痛者大發之用紫草飲總宜平胃散如

升發解利并利小便之藥則毒氣上下分消而痛自止
痘不出痛不止者不治

發熱標點心腹絞痛煩悶叫呼此痘陷伏燔灼臟腑也
或自小腹上冲心腹脹痛此入厥陰大痛也不治

或口臭舌胎發斑而腹痛甚此胃爛也不治

凡發熱時腹中攻攪覺痛上下不定或煩躁作渴詒妄
即當通大便其痛自定熱亦止而瘡隨發矣若下之稍
遲則變症蜂起身發紫泡而死切勿拘首尾汗下之戒

起脹腹痛

五六日皮堅起脾紅潤調勻而腹痛者只宜疎解但見兩臉痘起小便利則自安如兩臉不起速發之小便不利則利之

脹期多內傷也損其穀則愈不可妄下若見內傷之症又不可因循失下

傷生冷腹痛者用丁香脾積丸原物湯下

有瀉者用異攻散加丁香訶子

傷肥甘油膩糕餅熱物者用急脩丸原物湯下

凡傷熱冷物得利後並用四君子湯加陳皮木香或錢氏異攻散調之

飲食過飽腹中稍覺不快者用木香大安丸

內傷飲食腹脹痛中氣鬱而痘不起發者用寬中快斑湯

養漿腹痛

灌漿至結靨時腹痛當察其痘色尚紅便秘之類乃毒

未盡也即與解之錯過日期十救三四用保元湯加內托

毒已盡又無陷伏久不大便而腹痛者必有燥屎也宜通之用當歸丸胆導法

便清腹痛者必食生冷或受寒也宜溫之用理中丸溫中化毒湯黃芪建中湯加木香

風寒所逼毒發不盡忽腹脹痛而煩躁喘促痘變灰黑必傷食也先以丁香脾積丸原物湯下去其宿食後以

人參白朮散去葛根加青皮廣皮與養脾丸相間服
若傷食輕痘仍寶滿色潤者用錢氏異攻散加青皮山
查漿未充而腹痛泄瀉用保元湯加白朮肉蓯陳皮木
香芍藥厚朴裡急後重者停滯為積也用陳皮厚朴甘
草山查神麴麥芽枳殼砂仁俟便利痛止再加補托

收靨腹痛

收靨時忽腹痛著中脘者熱毒凝滯淤血作痛也用消
毒散血湯回漿後脾虛飲食失節而痛者用芍藥甘草

湯加厚朴山查酒炒山梔

若虛而肺金鬱於大腸刮積而痛者用參桔湯

痘後腹痛

忽然腹痛手不可按者傷食也便秘急疎利之否則漸加喘急難治用雄黃解毒湯

痛在上脘者宜清導用脾積丸

便利者用木香大安丸

痛在中焦者喜手按之食少便潤虛寒也用黃芪建中

湯

痛在小腹不可近者燥屎也用備急丸胆導法

不因內傷煩躁不寧而痛者毒氣入裡也用解毒行氣
定痛之藥腸鳴自利腹痛虛寒也用黃芪建中湯芍藥
甘草湯加乾姜澤瀉

虛痛不止者用桂枝芍藥湯

痘後腹痛口噤僵直者用鉤藤湯

腹滿痛便秘者熱毒盛而氣不得伸也用芍藥甘草湯

去肉桂白朮加酒炒大黃

燥渴狂妄腹痛用三乙承氣湯

有燥屎者用三黃湯

熱毒在胃時欲嘔吐者用黃連湯

有淤血者用桃仁承氣湯

治案

一痘未盡出腹痛噯腐吞酸大便酸臭乃飲食停滯也
用二服保和丸而愈

一痘起脹時不易行漿肢冷腹痛乃血熱痘而過用涼劑理中湯加肉桂木香炮薑一服而愈

一痘後傷食腹痛中氣不足宜補瀉兼施用香砂保和丸補中益氣湯調理而愈

一痘能食易化腹痛此胃熱易飢脾弱不能消磨鬱積而痛也用補中益氣湯加芍藥木香黃連而愈

益黃散

荊芥 乾薑 廣皮 甘草 茯苓 厚朴 人參