

醫學實在易卷之五

閩長樂陳念祖修園箸

男元犀靈石參訂

孫男

心典徵菴
心蘭芝亭

全校字

表證諸方

傷寒

桂枝湯

治傷風自汗頭痛項強發熱惡寒等證

凡傷寒論

金匱千金外臺聖濟方俱改
爲小劑以便時用下倣此

桂枝

白芍

生薑

各三錢

炙甘草

二錢

大棗

四枚

水煎服、啜熱粥、覆取微汗、未汗再服、一日夜
可三服

此方薑桂甘草大棗之辛甘以補陽、芍藥大
棗甘草之苦甘以補陰、是補劑非汗劑也。妙
在服後溫覆啜粥、取穀氣勝邪以爲汗、則汗

不受傷絕無變症之患。無論四時南北老幼
強弱皆可服之。

麻黃湯

治傷寒中風發熱惡寒頭痛身疼痛項強無
汗而喘等證。

麻黃

去根節
三錢

桂枝

二錢

炙草

一錢

杏仁

二十粒

水三杯先煮麻黃至二杯去沫入諸藥同煮
至八分溫服覆取微汗不啜粥未汗再服一

日夜可三服

此方麻杏從表以發表。桂甘從肌以達表。不
啜粥者。恐其逗留麻黃之性。發汗太過也。

升麻葛根湯

錢仲陽

治陽明傷寒中風。頭疼身痛。發熱惡寒。無汗。
口渴。目痛。鼻乾。不得臥。及陽明發斑。欲出不
出。寒暄不時。人多疫疾。

升麻 三錢

葛根

白芍

各二錢

炙草

一錢

加薑煎

愚以此方葛根可用三四錢、升麻止用一錢、許如川芎、白芷、紫蘓、黃芩、石膏之類、俱可加入。

此方非傷寒論。陽明證之正方也。但就表證而論。陽明以肌肉爲表。與太陽不同。故取葛根以清肌肉之熱爲君。亦不啻粥者。恐胃得補而增熱也。

按陽明證內經以身熱目疼鼻乾不得臥爲提綱仲景以胃家實爲提綱前聖後聖立說不同或從宋人用升麻葛根湯是宗內經經氣之傳以爲治也但葛根非陽明正藥以其宣肌絡除大熱取陽明主肌肉而蒸蒸發熱之義也傷寒論入手有用桂枝湯麻黃湯法却無用葛根法而傳爲白虎證以及承氣證古今之治法一轍也

小柴胡湯

方見下

治少陽病。脇痛目眩耳聾。口苦寒熱往來。嘔吐等症。

此方傷寒論以太陽病邪氣欲從少陽而出。取之以助樞轉也。然正少陽症亦不外此方。蓋以少陽主樞。柴胡爲轉樞之神品。切勿以發汗誣之。

按頭爲諸陽之會。傷寒中風陽證必有頭痛。

經云太陽之脈其直者從巔入絡腦還出列
下項循肩髃由夾脊抵腰中故太陽頭痛腦
痛而連項脊也陽明之脈起於鼻絡於目交
額中故陽明頭痛額痛而連面目也少陽之
脈起於目銳眥上抵頭角下耳後其支者從
耳後入耳中出走耳前故少陽頭痛耳前後
痛上連頭角也

感冒

加味香蘇飲

治四時感冒風寒

紫蘇葉 三錢

香附 二錢 研

陳皮 川芎

蔓荊子

防風

秦艽

荊芥 各一

錢五分

甘草 一錢

加生薑五片、葱白二根、水二杯半、煎八分、溫服、覆取微汗、

如傷風自汗、去葱白、荊芥加大棗二枚、一日

夜作兩服

此方代桂枝湯、麻黃湯、時人喜其平穩、

瘧疾

二陳湯

見下痰飲

平胃散

見傷食

小柴胡湯

治脇痛、口苦、耳聾、咽乾、頭痛、在側、嘔逆、寒熱、往來等症、

柴胡 四錢

人參

黃芩

生薑

炙草

各一

錢五分

大棗

二枚

半夏

洗二錢五分

水四杯煎一杯半去滓再煎至八分溫服日夜作三服

六君子湯

治脾虛痰盛爲溫補之良藥

人參

白朮

茯苓

半夏

各二錢

陳皮

炙草

各一錢

生薑三片棗二枚水煎溫服

補中益氣湯

黃芪

二錢
蜜炙

人參

白朮

當歸

陳皮

甘草

各一錢

川升麻

柴胡

各三分

加薑三片棗二枚水煎

腎氣丸

見下
痰飲

瘟疫

加味香蘇飲

見上
感冒

人參敗毒散

治瘟疫及四時感冒並治噤口惡痢

人參 柴胡 前胡 羌活 獨活

川芎 茯苓 桔梗 枳殼 各一錢五分

甘草 八分

加生薑三片水煎服

若體壯者止用加味香蘇飲去蔓荊子加玉

竹三五錢

藿香正氣散

治外受邪氣、內停飲食、頭痛發熱、或霍亂吐瀉、或時行瘧疾、

藿香 白芷 大腹皮 紫蘇

茯苓 各一錢五分 陳皮 半夏

厚朴 桔梗 甘草 各一錢

加薑棗水煎服

白虎湯 治大熱大渴自汗之症、

石膏 生研八錢 知母 三錢 甘草 一錢 粳米 四錢

水煎服、加人參一錢五分、名人參白虎湯、日夜作三服、

三一承氣湯

治一切裏實之症

大黃

芒硝

厚朴

枳實

各二錢

甘草

三錢

水煎後入芒硝。不如三承氣擇用爲當

防風通聖散

見中風

六味湯

見厥症

四物湯

見婦人

陰虛盜汗症

當歸六黃湯

治陰虛發熱盜汗

當歸 生地 熟地 黃芩 黃連

黃柏 甘草 各一錢 炙黃芪 三錢

水煎服

參附湯

治腎虛不足自汗等症

人參 附子 水煎服

一兩 五錢 製