



瘡瘍經驗全書目錄

第一卷

咽喉說

又說二篇

喉舌諸症或說

凡四十二篇

急喉圖說

單乳蛾圖說

風熱喉症圖說

牙癰圖說

舌微黃圖說

酒毒喉痺圖說

風毒喉痺圖說

風熱喉痺圖說

上腭生瘡圖說

又酒毒喉痺圖說

重舌症圖說

重脣症圖說

口瘡圖說

蓮花舌圖說

陰毒喉癰圖說

纏喉風外症說

積熱喉癰圖說

木舌症圖說

纏喉風內症說

虛牙圖說方一

牙宣圖說方五

啞瘡喉風圖說

弄舌喉風圖說方七

喉腫圖說方一

喉節圖說方一

纏喉風圖說方一

氣癰喉閉圖說方一

噙食喉風圖說方一

喉癰圖說方一

腳根喉風圖說

喉閉圖說方一

喉瘤圖說方六

懸癰圖說方一

鎖喉瘡圖說方一

傷寒喉閉圖說方一

雙蛾風圖說方一

火赤瘡圖說

方一

魚脊瘡圖說

方二

散走流注發圖說

方三

發背兩頭圖說

腎俞發圖說

對心發圖說

方二

蜂窩發圖說

方一

連子發背圖說

方一

上中下三搭手圖說

連珠發圖說

方一

上中下三發背圖說

對臍毒圖說

腰疽圖說

痰注如袋形圖說

方四

暑疔圖說

方六

青疔圖說

白疔圖說

赤疔圖說

黑疔圖說

發背圖說

方一

芝  
麻  
疗  
圖  
說

氣  
疗  
圖  
說

冷  
疗  
圖  
說

魚  
臍  
疗  
圖

方二



卷之二

寒山子

漢卿輯著

圖論方

夫都洪瞻巖  
桐川陳友恭全校



疽 肺

此毒因暑熱炎天受其穢氣并伏熱毒之氣故生此瘡在皮膚之間或生遍身形如木鱉子如鷄頭大若不速治毒氣入囊卽死內服敗毒散加猪苓澤泄當歸黃芪桔梗天花粉荆芥連翹外用閨藥敷之

升麻湯

治肺癰肺疽胸乳間背痛口吐膿血作臭

升麻癰

桔梗

薏苡仁

地榆

黃芩

赤芍

牡丹皮

生甘草

黃芪

貝母

水煎服

虛甚加人參白朮

多服護心散

蠟繫丸

牛黃清心丸



夫肺者五臟之華蓋也此癰因內外兩感風寒所傷及憂思愁慮形寒飲冷以傷肺經遂致成癰身發寒熱兩肢脇腋俱痛口吐膿臭日夜無度喘嗽胸膈滿兼脹睡臥不安已破入風者不治急服枳术桔梗湯

并升麻湯 十六味消化飲 黃芩丸 各進三五服夜服生黃

清心丸  
更有乳香萬應膏貼之

參芪大補湯  
節勞戒氣忘酒絕慾已破收斂瘡口合歡皮白蠟瘡  
咷哎咀每服五錢水煎溫服合歡皮卽黃芪皮也

桔梗湯

桔梗

貝母

當歸

枳殼

肢風

苡仁

玄参

桑皮

蜜炙各一錢

黃芪

二兩五錢

杏仁

百合

甘草

節分各五

姜三片煎服

欬花湯  
嗽而胸消振寒脈數咽乾大渴時出濁唾腥臭臭久吐膿  
如粳米粥壯者乃爲肺癰  
如癰米粥壯者乃爲肺癰

欬花

一兩五錢去梗

甘草

一兩

桔梗

二兩

慧苡仁

一兩右作十劑

水煎服

丙癰有膿敗血腥穢殊甚遂至臍腹冷痛此乃敗膿所致以此祀

祀

祀

祀

祀

祀

祀

祀

白芷

四曲一兩

枯礬一兩

單葉紅蜀葵根

八分如無以蘇木節代之

出生肌

心下其膿漸

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服三十九清米湯空心下其膿漸

出生肌

并疽發



此症發于胸者名曰井疽狀如豆大三四日起若不治必入于腹入腹不療十日當死急服內固清心散可治若內侵傷膜主死無疑治法與發胸發皆同

保內清心散

粉草 升麻 當歸 川芎 黃芪 芍藥  
山梔 乳香 黃芩 羌活 桔梗 天花粉  
青皮 白芷 水煎服

卽服護心散蠟燭丸 務要戒怒

圍藥同煎

瀆心冷瘻



此毒生于心窩初起則心頭如火熱其毒先內瀆心胞方出皮膚  
令人心神恍惚盜汗多出二日皆紅舌如鷄金肯裏外俱熱易治  
若毒發于外冷氣攻心常嘔吐恶心口吐冷痰惡聞食味然氣真  
者死治方于後

辰砂 茯神 遠志 茯苓 人參 乳香 沉香 丁香

卷之二  
本香 蕺香 鼬香 酸棗仁

各等分末之入辰砂末二錢金箔五片全研細燈心薄荷湯下  
內寒散 治穿心冷癟

人參 白朮 白茯 熟地 甘草 苦藥 黃芪 肉桂  
當歸 黃芩酒炒桔梗 防風

水煎服連服十貼次服 黃芩丸護心散常服

試治法

乾姜爲末鷄子清調付如潰爛洗淨瘡口拭乾掺末覺熱如烘生  
肌易愈

六合回生丹 有回生之妙

真鉛粉一兩 輕粉 銀珠 雄黃

亂香菖上

沒藥同前各二

一兩一錢  
二分五厘

右六味各擇真正好者研爲極細末凡治其病先用好苦茶洗淨瘡口軟絹拭乾后剝猪腰子片用藥一二分摻腰上却付患上待腰子發熱如蒸良久取去自此拔去毒氣定減痛苦瘡口出濃不可手擠第二日依前法再付之第三日亦付之惡甚可傳七八九次瘡小只傳一次可愈猪腰子不發熱勿治矣

治痛心胸前有孔久不愈卽漏也胃癰并疽心肝癰心癰之類

鹿茸去毛炙微黃附子炮去鹽花鹽右三味各等分爲末用棗肉去皮核爲丸每服三十九空心酒下亦治腰痛

胃

癰

○此症在內



素問云人病胃腕癰當候胃脈脈沉細者氣逆氣逆者人迎甚盛則熟人迎者胃脈逆而盛熱聚胃口不行故胃爲癰其發塞熱如瘡身皮甲錯或嗽或嘔或吐膿血熱聚胃腕留結爲癰須要知戒連翹升麻湯

沉香

另

乳香

另

甘草

青木香

各三錢

連翹

射干

升麻

羌活

桑寄生

木通

各七錢  
五分

大黃

飲上蒸  
三兩

麝香

二錢右作十劑每劑以粗藥水煎去查入五香

細末溫服以利爲度能折其熱毒之氣

尾角湯

犀角

梔子仁

赤茯苓

赤芍藥

射干

黃芩

大黃

炒熟各二錢

水煎去查入蜜再煎溫服

癰

肝

心



