

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷一百二



南京中醫藥大學圖書館版權所有
1954

詳校官太醫院八品吏目臣黃發

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

證治準繩

外科

內科

明 王肯堂 撰

日內宜連進十數服

授火于銀石器中炒手
使乾急候出搗冷研極

欽定四庫全書

證治準繩

一

右研令勻每服二錢至三錢濃煎甘草湯調下時時細呬要藥常在胸膈間若毒衝心有嘔逆之證大宜

服此

如有寒而嘔逆不宜服此當用辛熱

丹溪云此散菴豆解毒又治石毒味甘入陽明胃性寒能補為君乳香去惡腫入少陰性溫善竄為佐甘草性緩解五金八石及百藥毒為使此方專為服丹石而發疽者設若不因丹石而發疽恐非必用之劑又云內托散性涼治嘔有降火之理

國老膏 治一切癰疽能消腫逐毒使毒不內攻其効不可具述

甘草

大者二斤

右槌碎河水浸一宿揉令漿汁濃去盡筋滓再用絹濾過銀石器內慢火熬成膏用器收之每服一二匙無灰酒或白湯亦可曾服燥藥丹劑者亦解之

本事方每

甘草一斤分作三服溫酒調下今云一二匙恐力少也

牛蒡粥 治瘡腫

用牛蒡根三莖洗淨煮令爛於盆中研令細去筋膜
汁中即下米煮粥鹹淡任性服一碗甚良無忌

解毒散 治癰瘡始覺便宜服

犀角屑 川升麻 川朴硝 赤芍藥 木通

各一

兩石膏 兩玄參 麥門冬 去心甘草 生剉各半兩

右每服四錢水一中盞煎至六分去滓溫服無時

清心內固金粉散 又名金

花散

辰砂 另研 白茯苓 去皮 人參 去蘆 甘草 各七錢半 萊豆粉 四兩研

白豆蔻仁

朴硝

另研各半兩

雄黃

研

腦子

麝香

另研

各二錢半

右以參苓白豆蔻為末入研藥令勻蜜湯調下無時

候此藥專治惡瘡熱盛焮痛作瀉煩躁此藥解毒

內追毒丹 清心解毒散潮

大朱砂

雄黃

各五錢

生麝香

一錢

生犀角

琥珀

已上

並別研細

黑角沈香

各五錢

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十九丸燈心薄荷湯

下 精要云憤鬱不遂志欲之人多犯此疾 三因
云癰疽瘰癧不問虛實寒熱皆由氣鬱而成經云氣
宿於經絡與血俱滯而不行壅結為癰疽不言熱之
所作而後成癰者此乃因喜怒憂思有所鬱而成也
獨勝散 治癰疽皆緣血滯氣凝而致者

香附子

去毛令淨以生薑汁
淹一宿焙乾研極細

右無時以白湯調二錢服之又云疽疾多因怒氣得
之若有此疾必多怒但服香附進食寬氣自有効

丹溪云獨勝散治氣鬱血滯而諸瘡愈後常服半年尤妙此皆施於體實氣鬱之人予見吳兄厚味氣鬱而形實性重年近六十患背疽醫與他藥皆不行惟香附末飲之甚快始終只此一味腫潰恃此以安然此等體實而又病實乃瘥千百而一見者也每思香附經不言有補惟不老湯一方乃言於老人有益用片子薑黃香附子甘草三味而以不老為名且引鍊氣先生與劉君為証夫豈無其故哉蓋於行氣中有補之之理耳天之所

以為天者健而有常也因其不息所以生生無窮正如
芫薺子活血行氣有補陰之妙故名益母胎前產後所
恃者氣血耳胎前無滯產後無虛以其行中有補也夏
枯草治瘰癧亦然

遠志酒 治一切癰疽發背癰毒惡候浸有死血陰毒
在中則不痛傳之即痛有憂怒等氣積而內攻則痛
不可忍傳之即不痛或蘊熱在內熱逼入手不可近
傳之必清涼或氣虛血冷潰而不斂若七情內鬱治

之必愈

遠志

不以多少泔浸
槌去心乾為末

酒一盞調末三錢澄清飲之以滓傳于患處

越鞠丸

治六鬱牙齒作痛口舌生瘡或胸膈痞滿嘔

吐吞酸或腹脹腿酸等症

蒼朮

炒

神麴

炒

香附

山查

山梔

炒

撫芎

麥

芽

炒各
等分

右為末水調麴蘖麵為丸桐子大每服七十丸白湯下

五香散 升降諸氣宣利三焦疎導壅滯發散邪熱治陰陽之氣鬱結不消諸熱蘊毒腫痛結核或似癰癤而非使人頭痛惡心寒熱氣急

木香 丁香 沈香 乳香 藿香

各等分

右剉散每服三錢水一盞半煎食後溫服

補遺謂婦人男子癰疽治法無異惟月閉血虛氣結三證有異耳予謂婦人海滿則行月閉一證固異然婦人情性執着比之男子十倍雖有虛證宜補亦當以執着

為慮向見樓氏婦早寡善飲啖形肥偉性沈毒年六十
六七月間生背疽近正瘡醫遂橫直裂開取血雜以五
香十宣散與酒飲之月餘未嘗議其寡居之鬱酒內之
毒執着之滯時令之熱卒至于平陷淹延兩三月而不
救

忍冬酒 初發便當服此或貧乏中或居鄉僻田夫野
老百發百中

忍冬藤

生取一把以葉入砂盆研爛入酒少許調和得所塗傳四圍中心留一口又取五兩

用木槌搗碎
不犯鐵器

甘草

生剉
一兩

右二味入砂瓶內用水二碗文武火煎至一碗入好酒一大碗煎十數沸去渣分為三服一日連夜進盡病勢重一日夜可二劑

忍冬藤補血如氣虛及寒多人不宜用是故田夫野老百

發百
中也

金銀花湯 治一切癰疽發背疔瘡及喉閉乳蛾等證
金銀花藤葉搗爛取汁半鍾和熱酒半鍾溫服甚者
不過三五服可保無虞

槐花酒 治發背及一切瘡毒不問已成未成但焮痛

者並治之 用槐花四五兩微炒黃乘熱入酒二鍾

煎十餘沸去渣熱服未成者二三服已成者一二服

黃芪湯 治諸瘡退風熱

黃芪

剉

黃芩

去黑心

麥門冬

去心焙

芍藥

甘草

炙剉各一

兩半

生地黃

四兩

半夏

薑製半兩

當歸

切焙

大黃

剉炒

石膏

碎

芍

窮

人參

各一兩

右剉如麻豆每服五錢匕用水一盞半竹葉七片煎

至一盞去滓空心溫服日晚再服

生地黄散

治發癰腫熱毒疼痛心神煩悶

生地黄

二兩

川大黃

剉砂炒

川升麻

地骨皮

當歸

剉微炒

黃芩

木通

赤芍藥

黃芪

玄參

甘

草

生各一兩

赤茯苓

一兩半

右為散每服四錢水一中盞入竹葉二七片煎至六

分去滓不拘時溫服

阿膠飲子

精要

明阿膠

炒如珠

粉草

各一兩

橘紅

半兩

右㕮咀分作三服以水一盞煎七分去滓溫服

牛膠飲 截癰疽惡瘡發險處服之使毒氣不攻于內

牛膠

通明者四兩

用酒一椀入膠內重湯煮熔透攪勻傾出更侵酒隨意飲能飲者以醉為度此方活人甚多

黃礬丸 服過一兩已上無不取効最止疼痛不傷臟腑活人不可勝數