

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷

三十九
四十



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣吳尊變

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

此以學業笑

婦人良方

姪也

三

任正德

壽域

水經

臨送謂

化腹痛腸鳴謂之洞
下利並以五苓散利

八儆次以黃連阿膠水或三黃煎艾湯以安之若瀉黃

明薛已訂

有沫腸鳴腹痛脉沉緊數用戊己丸和之噉腐不食胃
脉沉緊用感應丸下之後調和脾胃若風冷水穀不化
如豆汁用胃風湯寒冷臍下陰冷動泄用理中湯治中
湯伏暑心煩渴瀉水用四苓散傷濕泄瀉小便自利用
不換金正氣散胃苓湯此四證之大畧也仍叅第八卷
第八論主之

愚按米食所傷用六君加穀蘖麵食所傷用六君加
麥蘖肉食所傷用六君加山查若兼寒熱作嘔乃肝

木侮脾土用六君加柴胡生薑煎嘔吐腹痛手足逆
冷乃寒水侮土六君加薑桂不應用錢氏益黃散若
元氣下陷發熱作渴肢體倦怠用補中益氣湯若泄
瀉色黃乃脾土之真色用六君加木香肉果若作嘔
不食腹痛惡寒乃脾土虛寒用六君加木香薑桂若
瀉在五更侵晨飲食少思乃脾腎虛弱五更服四神
丸日間服白朮散如不應或愈而復作或飲食少思
急用八味丸補命門火以生脾土為善不可忽也

附治驗

邊太常側室妊娠泄瀉自用枳朮黃連之類腹悶吐
痰發熱惡寒飲食到口即欲作嘔強匙許即吞酸不
快欲用祛痰理氣余曰此因脾胃傷而痰滯中脘若
治痰氣復傷脾胃矣遂以參朮炮薑為末丸如黍粒
不時含嚥三五丸漸加至三日後日進六君子湯而
尋愈

進士王繳徵之內懷妊泄瀉惡食作嘔余曰脾氣傷

也王君憂之強進米飲余謂飲亦能傷胃且不必強
俟脾胃醒宿滯自化飲食自進不信別用人參養胃
湯飲之吐水酸苦又欲投降火寒藥余曰若然則胃
氣益傷也經云損其脾胃者調其飲食適其寒溫後
不藥果愈

厚朴丸 治洞泄寒中

乾薑炒厚朴

去皮等分

右水拌炒為末水糊丸梧子大每服五十九米飲下

草果散 治虛寒泄瀉腹痛無度

厚朴

薑汁拌炒二兩

肉豆蔻

十箇麵煨

草豆蔻

十箇煨

右每服三錢用薑水煎

附方

附子理中湯

方見二十一卷第八論

理中丸

五苓散

二方見二十一卷第十論

六君子湯

補中益氣湯

二方見二十四卷第六論

錢氏益黃散

方見二十一卷第九論

四神丸

方見八卷第八論

七味白朮散

方見二十一卷第二論

八味丸

方見二十四卷第十一論

妊娠下麻黃水方論第二

論曰妊娠飲食生冷脾胃不能剋化致令心腹疼痛若血分病則色赤氣分病則色白血氣俱病則赤白相雜

若熱乘大腸血虛受惠則成痢也

愚按治痢之法當參前篇其下黃水乃脾土虧損真
色下陷也當升補中氣若黃而兼青乃肝木剋脾土
宜平肝補脾若黃而兼白乃子令母虛須補脾胃若
黃而兼黑是水反侮土矣必溫補脾胃若黃而兼赤
乃心母益子但補中益氣若腸胃虛弱風邪客之用
胃風湯或胎氣不安急補脾胃而自安矣凡安胎之
藥當臨病制宜不必拘用阿膠艾葉之類

附治驗

地官胡成甫之內妊娠久痢自用消導理氣之劑腹
內重墜胎氣不安又用阿膠艾葉之類不應余曰腹
重墜下元氣虛也胎動不安內熱盛也遂用補中益
氣而安又用六君子湯全愈

治妊娠利黃水

厚朴

薑汁炙
二兩

黃連

二兩

肉豆蔻

五箇
連皮

右用水煎徐徐服忌如前

已上六方
並出產寶

治妊娠熱痢

黃連升一黃蘗升一梔子仁二十枚

右用每服五錢水煎嘔加橘皮生薑

治妊娠下痢腹痛小便澀滯

糯米一合當歸炒黃芪各一兩

右用水煎分四服

治臨產下痢用梔子炒為末每服二錢白湯調甚效

附方

胃風湯

方見十二卷第九論

補中益氣湯

二方見二十四卷第六論

妊娠大小便不通方論第三

夫妊娠大小便不通由臟腑之熱所致若大腸熱則大便不通小腸熱則小便不利大小腸俱熱更推其因而藥之

愚按前症若大腸血燥用四物湯加條芩桃仁大腸氣滯用紫蘇飲加杏仁條芩腸胃氣虛用六君子加

紫蘇杏仁肝脾蘊熱用龍膽瀉肝湯心肝虛熱用加
味逍遙散加車前子

附治驗

亞卿李蒲汀側室妊娠大小便不利或用降火理氣
之劑元氣反虛肝脉弦急脾脉遲滯視其面色青黃
不澤余曰此鬱怒所致也用加味歸脾湯為主佐以
加味逍遙散而安

主政王天成之內妊娠痢疾愈後二便不通其家世

醫自用清熱之劑未效余診其脉浮大而瀦此氣血
虛也朝用八珍湯加桃仁杏仁夕用加味道遙散加
車前子而瘥

當歸散 治妊娠因怒肚腹脹痛四肢浮腫氣急作喘
大便難小便澀產門腫

當歸_{五分} 赤茯苓 枳殼_{麩炒} 白芍藥 川芎_{各一錢}

白薑_炮 木香_煨 粉草_{各三分}

右用薑水煎氣弱枳殼減半大便秘加蜜同煎

治妊娠大小便不通腹脹痞悶不思飲食

大黃炒木通

檳榔各一兩

枳殼麤炒三錢訶梨勒四箇去核

半生半煨大腹子三枚

右為末用童便一盞葱白二寸煎六分調服二錢

初虞世治妊娠風氣大便秘澀

枳殼三兩麤炒防風二兩甘草炙一兩

右為末每服一二錢空心用白滾湯調日三服

小品治妊娠小便不利氣急服猪苓散不瘥用甘遂為

末蜜和服豆許微利之未利再服利後仍服猪苓散
猪苓散 治妊娠小便澀痛及胎水猪苓去皮為末白
湯調下錢許加至二錢日三夜二服

又方車前子一兩大黃半兩為末每服三錢蜜湯調

附方

四物湯

四君子湯

二方見二十四卷第六論

紫蘇飲

方見二十四卷第八論