

欽定四庫全書

子部

肘後備急方卷五



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

肘後備急方卷五

晉 葛洪 撰

治癰疽妬乳諸毒腫方第三十六

隱居效方治羊疽瘡有蟲痒

附子八分藜蘆二分末傅之蟲自然出

葛氏療妳發諸癰疽發背及乳方

比災其上百壯

又方熬粢粉令黑雞子白和之塗練上以貼癰小穿練
上作小口泄毒氣燥易之神祕

又方釜底上搗以雞子中黃和塗之加少豉彌良

又方搗黃檗末篩雞子白和厚塗之乾復易差

又方燒鹿角搗末以苦酒和塗之佳

又方於石上水磨鹿角取濁汁塗癰上乾復易隨手消

又方末半夏雞子白和塗之水磨傅並良

又方醋和茱萸若搗薑或小蒜傅之並良

一切惡毒腫

蔓菁根一大握無以龍葵根代之乳頭香一兩光明者黃連一兩宣州者杏仁四十九枚去尖用柳木取三四錢白色者各細剉搗三二百杵團作餅子厚三四分可腫處大小貼之乾復易立散別貼膏藥治瘡處佳
葛氏療癰發數十處方

取牛矢燒搗末以雞子白和塗之乾復易神效

又方用鹿角桂雞屎別搗燒合和雞子白和塗乾復上

又癰已有膿當使壞方

取白雞兩翅羽肢各一枚燒服之即穿姚同

又方吞薏苡子一枚勿多

又方以苦酒和雀矢塗癰頭上如小豆

葛氏若已結癰使聚不更長方

小豆末塗若雞子白和尤佳即差

又方芫花末膠汁和貼上燥復易化為水

若潰後膿血不止急痛

取生白楸葉十重貼上布帛寬縛之

乳腫

桂心甘草各二分烏頭一分炮搗為末和苦酒塗紙覆之膿化為水則神效

葛氏婦女乳癰妬腫

削柳根皮熟搗火溫帛囊貯熨之冷更易大良

又方取研米槌煮令沸絮中覆乳以熨上當用二枚互熨之數十迴止姚云神效

乳癰方

大黃茵草伏龍肝竈下黃土也生薑各二分先以三
物搗篩又合生薑搗以醋和塗乳痛則止極驗劉涓
子不用生薑用乾薑四分分等余比見用鯽魚立驗
此方小品佳

姚氏乳癰

大黃鼠糞濕者黃連各一分二物為末鼠矢更搗以黍
米粥清和傅乳四邊痛即止愈無黍米用粳米並得

又方牛馬矢傳並佳此並消去

小品妬方

黃芩白欬芍藥分等末篩漿服一錢一日五服若右乳結者將左乳汁服左乳結者將右乳汁服散消根姚同此方必愈

姚方搗生地黄傳之熱則易小豆亦佳

又云二三百衆療不差但堅紫色者

用前柳根皮法云熬令溫熨腫一宿愈

凡乳汁不得洩內結名妬乳乃急於癰

徐玉療乳中癰癰起痛方

大黃黃連各三兩水五升煮取一升二合分三服得
下即愈

葛氏卒毒腫起急痛方

蕪菁根大者削去上皮熟搗苦酒和如泥煮三沸急
攪之出傳腫帛裹上日再三易用子亦良

又方燒牛矢末苦酒和傳上乾復易

又方水和石灰封上又苦酒磨升麻若青木香或紫檀
以磨傅上良

又方取水中萍子草熟搗以傅上

又已入腹者

麝香薰陸香青木香雞舌香各一兩以水四升煮取
二升分為再服

若惡核腫結不肯散者

吳茱萸小蒜分等合搗傅之單蒜亦得

又方搗鯽魚以傅之

若風腫多痒按之隨手起或隱癬方

但令痛以手摩捋抑按日數度自消

又方以苦酒磨桂若獨活數傅之良

身體頭面忽有暴腫處如吹方

巴豆三十枚連皮碎水五升煮取三升去滓綿沾以

拭腫上趁手消勿近口

皮肉卒腫起狹長赤痛名偏

鹿角五兩白斂一兩牡蠣四兩附子一兩搗篩和苦酒塗帛上燥復易

小品癰結腫堅如石或如大核色不變或作石癰不消
鹿角八兩燒作灰白斂二兩麤理黃色磨石一斤燒
令赤三物搗作末以苦酒和泥厚塗癰上燥更塗取
消止內服連翹湯下之姚方云燒石令極赤內五升
苦酒中復燒又內苦酒中令減半止搗石和藥先用
所餘苦酒不足添上用

姚方若發腫至堅而有根者名曰石癰

當上灸百壯石子當碎出不出者可益壯癰疽瘤石
癰結筋癰癰皆不可就針角針角者少有不及禍者
也

又癰未潰方

茵草末和雞子白塗紙令厚貼上燥復易得痛自差
癰腫振欬不可振方

大黃搗篩以苦酒和貼腫上燥易不過三即差減不

復作膿自消除甚神驗也

癰腫未成膿

取牛耳垢封之即愈

若惡肉不盡者食肉藥食去以膏塗之則愈食肉方

取白炭灰荻灰等分煎令如膏此不宜預作十日則歇
并可與去黑子此大毒若用效驗本方用法

凡癰腫用

枯蔓根赤小豆皆當內苦酒中五宿出熬之畢搗為

散以苦酒和塗紙上貼腫驗

隱居效方消癰腫

白歛二分藜蘆一分為末酒和如泥貼上日三大良
疽瘡骨出

黃連牡蠣各二分為末先鹽酒洗後傅

葛氏忽得燂疽著手足肩累累如米豆刮汁出急療之
熬蕪菁熟搗裏以展轉其上日夜勿止

若發疽於十指端及色赤黑甚難療宜按大方非單方

所及

若骨疽積年一捏一汁出不差

熬米膠粘勃瘡上乃破生鯉魚以搗之如炊頃刮視
有小蟲出更洗傅藥蟲盡則便止差

姚方云燍疽者肉中忽生一黥子如豆粟劇者如梅李
大或赤或黑或白或青其脈有核核有深根應心少久
四面悉腫疱黯紫黑色能爛壞筋骨毒入臟腑殺人
南方人名為揄著毒