

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷十三



南京中医药大学图书馆版权所有

大正四年

證治準繩卷十三

準繩

證治準繩

明 王肯堂 撰

無勞責惟覺困倦若滯

一財不怨或腹或止或腹血相雜或腸垢或無糟粕或

大正四年

證治準繩

一

糟粕相雜雖有痛不痛之異然皆裏急後重逼迫惱人
潔古論曰藏府瀉利其證多種大抵從風濕熱論之是
知寒少熱多寒則不能久也故曰暴泄非陰久泄非陽
論云春宜緩形形緩動則肝木乃榮反靜密則是行秋
令金能制木風氣內歲夏至則火盛而金去獨火木旺
而脾土損矣輕則飧泄身熱脉洪穀不能化重則下利
膿血稠粘裏急後重故曰諸泄稠粘皆屬於火經曰溲
而便膿血知氣行而血止也宜大黃湯下之是為重劑

黃芩芍藥湯是為輕劑是實則泄其子木能自虛而脾
土實矣故經曰春傷於風夏為飧泄此逆四時之氣人
所自為也

此一節熱泄
所謂滯下也

有自太陰脾經受濕而為水泄

虛滑身重微滿不知穀味假令春宜益黃散補之夏宜
泄之法云宜補宜泄宜和宜止和則芍藥湯止則訶子
湯久則防變而為膿血是脾經傳受於腎謂之賊邪故
難愈也若先利而後滑謂之微邪故易安也此皆脾土
受濕天之所為也雖聖智不能逃口食味鼻食氣從鼻

而入留積於脾而為水泄也

此一節濕泄所謂泄瀉也

有厥陰經動

下利不止其脉沉而遲手足厥逆膿血稠粘此為難治

宜麻黃湯小續命湯汗之法云謂有表邪縮於內當散

表邪而自愈

此一節風泄所謂久泄也

有暴下無聲身冷自汗小便

清利大便不禁氣難布息脉微嘔吐急以重藥溫之漿

水散是也

此一節寒泄所謂暴泄也

故法曰後重者宜下腹痛者宜

和身重者宜除濕脉弦者去風膿血稠粘者以重藥竭

之身冷自汗者以毒藥溫之風邪內縮者宜汗之則愈

驚漉為利宜溫之而已又曰在表者發之在裏者下之
在上者湧之在下者竭之身表熱者內疏之小便澀者
分利之又曰盛者和之去者送之過者止之兵法曰避
其來銳擊其惰歸此之謂也 凡病泄而惡寒太陰傳
少陰為土來尅水也用除濕白朮茯苓安脾芍藥桂枝
黃連破血火邪不能勝水太陰經不能傳少陰而反助
火邪上乘肺經而痢必白膿也加當歸芍藥之類是已
又裏急後重脉大而洪實為裏實證而痛甚是有物

結墜也宜下之若脉浮大慎不可下 雖裏急後重脉

沉細而弱者謂寒邪在內而氣散也可溫養而自安

裏急後重閉者大腸氣不宣通也宜加檳榔木香宣通

其氣若四肢慵倦小便少或不利大便走沉困飲食減

少宜調胃去濕白朮芍藥茯苓三味水煎服白朮除脾

胃之濕芍藥除胃之濕熱四肢困倦茯苓能通水道走

濕 如發熱惡寒腹不痛加黃芩為主如未見膿而惡

寒乃太陰欲傳少陰也加黃連為主桂枝佐之如腹痛

甚加當歸倍芍藥如見血加黃連為主桂枝當歸佐之
如煩燥或先便白膿後血或發熱或惡寒非黃連不
能止上部血也如惡寒脉沉先血後便非地榆不能除
下部血也如惡寒脉沉或腰痛或臍下痛非黃芩不能
除中部血也如便膿血相雜而脉浮大慎勿以大黃下
之下之必死謂氣不竭也而陽無所收凡陰陽不和惟
以分陰陽之法治之 又曰暴泄非陰久泄非陽有熱
者脉疾身動聲亮暴注下迫此陽也寒者脉沉而細身

因鼻息微者薑附湯主之身重不舉朮附湯主之渴
引飲者是熱在膈上水多入則自胸膈入胃中胃本無
熱因不勝其水胃受水攻故水穀一時下此證當灸大
椎三五壯立已乃督脉瀉也如用藥使車前子雷丸白
朮茯苓之類五苓散亦可 又有寒泄者大腹滿而泄
又有鶩溏者是寒泄也鶩者鴨也大便如水其中有少
結糞者是也如此者當用天麻附子乾薑之類 又法
曰泄有虛實寒熱虛則無力不及拈衣未便已泄出謂

不能禁固也實則數至圜而不便俗云虛坐努責是也
裏急後重皆依前法進退大承氣湯主之 太陽病為

挾熱痢涼膈散主之

表證誤下因而下利不止為挾熱利

陽明為痼瘕

進退大承氣湯主之

太陰濕勝濡瀉不可下而可溫

四逆湯主之

少陰蟄風不動禁固可瀉赤石脂丸乾

薑湯主之

厥陰風泄以風治宜小續命湯消風湯主

之

少陽風氣自動大柴胡湯主之

胃泄飲食不化

色黃

承氣湯

脾泄腹脹滿泄注食即嘔吐逆

建中理中湯

大腸泄食已窘迫大便色白腸鳴切痛

乾薑附子湯

小腸

泄洩而便膿血少腹痛

承氣湯

大瘕泄裏急後重數至

圜而不能便莖中痛

五泄之病胃小腸大瘕三證皆

以清涼飲子主之其泄自止厥陰證加甘草以緩之少

陰證裏急後重加大黃又有太陰陽明二證當進退大

承氣湯主之太陰證不能食是也當先補而後泄之乃

進藥法也先煎厚朴半兩製水煎二三服後未已謂有

宿食未消又加枳實二錢同煎二三服泄又未已如稍

進食尚有熱毒又加大黃三錢推過泄止住藥如泄未
已為腸胃有久塵垢滑粘加芒硝半合宿垢去盡則愈
也陽明證能食是也當先泄而後補謂退藥法也先用
大承氣湯五錢水煎服如利過泄未止去芒硝後稍熱
退減大黃一半再煎兩服如熱氣雖已其人必腹滿又
減去大黃與枳實厚朴湯又煎三兩服如腹滿退泄亦
自愈後服厚朴湯數服則已 按進退承氣法須審之
脉證的知有積熱及形病俱實而後可下此已上雖出

潔古家珍東垣活法機要而多出於劉河間保命集之
文故其用藥於疏蕩為多觀者會其意毋泥其辭可矣
東垣云胃氣和平飲食入胃精氣則輸於脾上歸於
肺行於百脉而養榮衛也若飲食一傷起居不時損其
胃氣則上升精華之氣反下降是為飧泄久則太陰傳
少陰而為腸澼假令傷寒冷飲食臍滿而脹傳為飧泄
者宜溫熱之劑以消導之傷濕熱之物而成膿血者宜
苦寒之劑以內疏之風邪下陷者升舉之濕氣內盛者

分利之裏急者下之後重者調之腹痛者和之洞泄腸
鳴無力不及拈衣其脉細微而弱者溫之收之膿血稠
粘數至圓而不能使其脉洪大而有力者下之寒之大
抵治病當求其所因察何氣之勝取相尅之藥平之隨
其所利而利之以平為期此治之大法也瀉利久不止
或暴下者皆太陰受病不可離甘草芍藥若不受濕則
不利故須用白朮是以聖人立法若四時下利於芍藥
白朮內春加防風夏加黃芩秋加厚朴冬加桂附然更

詳外證寒熱處之如裏急後重須加大黃如身困倦須用白朮若自汗逆冷氣息微加桂附以溫之如或後重膿血稠粘雖在盛冬於溫藥內亦加大黃

診 胃脉虛則泄 脉滑按之虛絕者其人必下利

肺脉小甚為泄

小者氣血皆虛

腎脉小甚為洞泄

小者氣血皆少腎主

閉藏今氣血皆少無以閉藏故泄

尺寒脉細謂之後泄

尺膚寒其

脉小者泄少氣 下利脉沉弦者下重 下利寸口反

浮數尺中自濇者必清膿 溲病若腹大而泄者脉當

細微而濇反緊大而滑者死 泄而脉大者難治 病
泄脉洪大是逆也 泄注脉緩時小結者生浮大數者
死 下利脉大為不止 下利日十餘行脉反實者死
大便赤辨飧泄脉小者手足寒難已飧泄脉小手足
溫易已 腹鳴而滿四肢清泄其脉大是逆也如是者
不過十五日死矣 腹大脹四末清脫形泄甚是逆也
如是者不及一時死矣 下利手足厥冷無脉者灸之
不溫若脉不還反微喘者死 下利後脉絕手足厥冷

晬時脉還手足溫者生脉不還者死 病者痿黃燥而

不渴胸中寒而利不止者死 假令下利寸口關上尺

中悉不見脉然尺中時一小見脉再舉頭者腎氣也若

見損脉來為難治 下利如魚腦者半死半生 下利

如塵腐色者死 純血者死 如屋漏汁者死 下利

如竹筒注者不可治 脉細皮寒氣少泄利而後飲食

不入此謂五虛不治若用參朮膏早救之亦有生者

下則泄瀉上則吐痰皆不已為上下俱脫死