

欽定四庫全書

子部

仁齋直指卷二十四



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

仁齋直指卷二十四

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

癰疹風

癰疹風論

風氣挾熱起於湊理皮膚不腫不疼發為瘙癢謂之癰
疹此風熱之浮淺者也其亦有寒暑濕之氣行焉風熱
在表天時炎暄而燥氣乘之則為赤疹風熱在表天時

寒涼而冷氣折之則為白疹赤者遇涼清而後消白者
遇溫暖而後滅然則用藥加減可無權度於此哉其有
浴後湊風與夫汗出解脫而得之者隐隐微黃似赤似
白凝滯於肌肉之間而四體為之重着此風熱之挾濕
外證又可推矣如其不知寒暑濕之所由生概以療風
熱等輩索之按圖殆恐痰嗽嘔渴雜證交攻由癰疹而
變為瘡疹

癰疹證治

天麻散治風熱癰疹

天麻

川芎

川升麻

半夏

製各
三錢

防風

細辛

羌活

荊芥穗

蟬殼

去腎
足

甘草

焙各
二錢

右細剉每服二錢薑三片井水煎服挾寒者加官桂

挾暑者加柴胡黃芩挾濕者加茯苓蒼朮

加味羌活散癰疹通用

羌活

前胡

各半兩

人參

北梗

川芎

茯苓

天麻

枳殼

製

甘草

炙各二錢半

蟬殼

去頭足二錢

腦荷

一錢半

右末每挑二大錢七薑錢三片煎服

消風散治癰疹瘙癢

方見頭風門

川芎茶調散治風熱癰疹

方見頭風門

胡麻散治風熱癰疹

方見歷節門

人參羌活散治風熱癰疹瘙癢

方見眼目門

惺惺散

桔梗

細辛

人參

茯苓

白朮

瓜蒌根

甘草

炙等分

右末入薄荷煎要和氣添薑錢可夾和人參羌活散

治癰疹亦治瘡疹

羌活散治癰疹

白僵蚕

直者去紫焙
盡絲令黃

右末好茶清入此薑汁調下

傳藥

明礬

朴硝為末井水調雞羽掃傳

又方

赤小豆 荊芥穗晒為末雞子清調薄傳

又方朱黛散撲傳

方見丹
毒門

洗方蚕沙新水煎密室溫洗

胡麻散治風氣挾熱癰疹瘙癢

胡麻子

十二兩

苦參

荊芥穗

何首烏

各八兩

威靈仙

防風

石菖蒲

牛旁子

炒

菊花

蔓荊子

蒺藜

炒去刺

甘草

炙各六兩

右末每服二錢食後薄荷湯點服或好茶清亦得

丹疹並不得喫醋

附諸方

陽毒升麻湯癰在面傷寒一二日或吐下後變或陽毒
腰背痛煩悶不安面赤狂言見鬼下痢脉浮大咽痛

人參

黃芩

麝香

犀角

甘草

各二錢五分

升麻

半兩

右咬咀水煎取飲半盞刻許再進溫覆手足得汗出
解

玄參升麻湯癰在身治汗下吐後毒不散表虛裏實發
於外甚則煩燥譫妄

玄參

升麻

甘草

各等分

右㕮咀水煎服

陽毒梔子湯治傷寒壯熱百節疼痛而發癰

升麻

梔子仁

黃芩

芍藥

石膏

知母

杏仁

柴胡

甘草

各等分

右為粗末每五錢入薑五片豉百粒煎服

消毒犀角飲子治癰及癰疹

牛旁子 六錢

荊芥

防風 各三錢

甘草 一錢

右咬咀水煎服

解毒防風湯治癰及癰疹癢痛

防風 一兩

地骨皮

黃耆

芍藥

荊芥

枳殼

牛旁子 各半兩

右為粗末每四五錢水煎服

調中湯治內傷外感而發陰癰

蒼朮一錢半

陳皮

砂仁

藿香

芍藥炒

甘草炙

桔梗

半夏

白芷

羌活

枳殼各一錢

川芎五分

麻黃

桂枝各五分

右咬咀薑三片水煎服

丹毒

丹毒方論

丹之為候由熱毒之氣搏於榮血而風乘之所以赤浮肌肉而為之走注也然丹有五丹不特色赤或青或黃或白或黑是血熱風毒有盛有衰元冷挾熱故其色變易又不同焉要之諸瘡皆屬於心心為血之主血為熱之媒古人以丹命名蓋謂心應火色尚赤端冷揆元夫既心家血熱所致風以動之於是遊走而遍體也蔓衍而不歇則爛肌自四肢而入腹入腎則殺人惟初生於

胷腹然後流散於四肢者易愈

丹毒證治

藍葉散治諸丹發熱赤腫

白芷

柴胡

知母

杏仁

去皮

川芎

赤芍藥

生地黄

川升麻

乾葛

生甘草

各一分

爛石膏

梔子仁

各半分

藍葉

日乾一分

右剉細每一錢半新水煎服熟甚加黃芩玄參煎服
防已散治諸丹

漢防已

三錢

川升麻

黃芩

犀角

黃耆

川芎

各一分

朴硝

一錢

右剉每一錢半新水入少蜜并竹葉煎

朱黛散解丹熱諸毒

青黛

土朱

各一分

軟滑石

荊芥穗

各半分

右為末每一錢半蜜水調下兼與撲身

人參羌活散

方見眼目門

惺惺散

方見癰疹門

夾和用竹葉煎湯

調下治諸丹

諸丹熱證加黃芩玄參冷證加黃耆白芷

疎風解毒散亦治丹毒

方見諸惡瘡門

傳方

紫浮萍一椀 中等活地龍七條研細傳