

內科秘錄

八

內科秘錄卷之八

目錄

黃疸 附圖

肝腫 附圖

積聚 附圖

疝

鼓脹 附圖

目錄
 卷一
 卷二
 卷三
 卷四
 卷五
 卷六
 卷七
 卷八
 卷九
 卷十
 卷十一
 卷十二
 卷十三
 卷十四
 卷十五
 卷十六
 卷十七
 卷十八
 卷十九
 卷二十
 卷二十一
 卷二十二
 卷二十三
 卷二十四
 卷二十五
 卷二十六
 卷二十七
 卷二十八
 卷二十九
 卷三十
 卷三十一
 卷三十二
 卷三十三
 卷三十四
 卷三十五
 卷三十六
 卷三十七
 卷三十八
 卷三十九
 卷四十
 卷四十一
 卷四十二
 卷四十三
 卷四十四
 卷四十五
 卷四十六
 卷四十七
 卷四十八
 卷四十九
 卷五十
 卷五十一
 卷五十二
 卷五十三
 卷五十四
 卷五十五
 卷五十六
 卷五十七
 卷五十八
 卷五十九
 卷六十
 卷六十一
 卷六十二
 卷六十三
 卷六十四
 卷六十五
 卷六十六
 卷六十七
 卷六十八
 卷六十九
 卷七十
 卷七十一
 卷七十二
 卷七十三
 卷七十四
 卷七十五
 卷七十六
 卷七十七
 卷七十八
 卷七十九
 卷八十
 卷八十一
 卷八十二
 卷八十三
 卷八十四
 卷八十五
 卷八十六
 卷八十七
 卷八十八
 卷八十九
 卷九十
 卷九十一
 卷九十二
 卷九十三
 卷九十四
 卷九十五
 卷九十六
 卷九十七
 卷九十八
 卷九十九
 卷一百

内科秘録卷之八

水戸 棗軒本間救和卿 著

黄疸

疸

瘰

胎黄

黄

急黄

黄疸ハ素靈難經金匱等ニ出テ、古今ノ通稱トス又
單ニ疸ト云フ又瘰ト云フ瘰ハ本消瘰瘰瘡等

ノ瘡ニシテ熱ノ一ナリ黄疸ノ一ニ用フルハ瘡瘡
同音ニテ通用シタルナリ此病黄疸ノ一名ニテ濟
タル一ナリ金匱ニ黄疸黒瘡酒瘡穀瘡女勞瘡ノ五
證ヲ舉タレ氏治術ニ益ナシ亦枝蔓ノ弊ヲ免カレ
ス八瘡九瘡三十六黃等ノ名目ニ至テハ究竟^{ヒツキヤム}其病
因ヲ講究セス徒ニ其形狀ノ異同ヲ見テ種種ノ名
ヲ立テ浩博ニ誇ルノミ都テ無用ニ屬ス

傷寒或ハ食傷等ニテ黄疸ヲ發スルハ之ヲ發黃ト謂
フ兼證ニシテ真ノ黄疸ト自ラ異ナリ治シ易キ者
ナリ

病因ヲ三因方ニ生黃瓜ヲ食シテ致スト云ヒ海上方
ニ誤テ鼠糞ヲ食ヒ之ヲ得ルト云フハ妄誕ト謂ツ
ヘシ或ハ脾ハ土ニ配シ土ノ色ハ黃色ユエ瘀熱脾
胃ニ在ル寸ハ發黃スルト云ヒ或ハ瘀熱脾胃ニ鬱
滯薰蒸シテ發黃スルハ麴米ノ蒸罨シテ黃衣ヲ生
スルカ如シト云フノ類ハ傷寒論ノ瘀熱在裡身必
發黃スト云フ文ニ本キタル說ナレ氏仲景ノ原意
ヲ失シ牽強傳會ニ屬ス此病洋說ヨウセツヲ得テ頗詳明ヲ
覺ユ黃疸ハ膽病ニシテ發黃ハ卽チ膽汁ナリ膽ハ
膽汁ヲ肝ニ受ケ之ヲ腸ニ灌キテ飲食ヲ消化スル

ナリ其色黄其味苦フシテ熊膽鯉膽等ニ異ナラス
 人身ヲ解剖スルニ腸ノ黄色ニ見ユルモ又大便ノ
 黄色ナルモ嘔シテ黄水ヲ吐クモ皆膽汁ナリ若シ
 膽汁ノ通路閉塞スル寸ハ肝ヘ逆退シ肝ヨリ又血
 脈ヘ逆流シテ總身ヘ發黄スルナリ其閉塞ノ因ハ
 肝膽ノ鬱熱及ヒ瘀衝或ハ衰弱等ヨリ發スルナリ
 仲景ノ瘀熱在裡身必發黄スト云ヒタルハ實驗ノ
 言ユエ洋說ニ暗合セリ獨張介賓此ニ氣力付キテ
 景岳全書ニ膽黄ノ一證ヲ舉ゲテ曰ク膽黄證凡大
 驚大恐及鬪毆傷者皆有之嘗見有虎狼之驚突然喪

膽而病黃者其病則驟有酷吏之遭或過害之慮恐怖
不已而病黃者其病則徐如南北朝齊永明十一年有
大學生魏準者因惶懼而死舉體皆青時人以為膽破
卽此之類又嘗見有鬪毆之後日漸病黃者因傷膽而
然其證無火無濕其人則昏沈困倦其色則正黃如染
凡此數證皆因傷膽蓋膽傷則膽氣敗而膽液泄故為
此證此說亦洋說ニ符合シテ卓見ト謂ツヘシ

初發ハ微ニ惡寒スレト發熱ヲ覺ヘス但心下痞鞭シ
テ爽快ナラス飲食モ平生ノ如クニシテ何病ト知
レヌトアリ之ヲ明窓ノ前ニ出シテ見ル寸ハ必ス

白晴黄^{キハ}ミテ梔子^{シチナレ}色ニナリ小便モ黄色ニシテ梔子

黄^{キハタ}蘗等ノ煎汁ノ如クニナリ居ルモノナリ第一早

ク發黄スルハ白晴ト小便ナリ次ハ胸上ニ發シ漸

漸ニ總身ニ及フモノナリ病一段加フル寸ハ心中

懊懣トシテ右ノ脇下急脹シ之ヲ按スレハ苦痛ニ

堪ヘス默默トシテ飲食ヲ欲セス或ハ日晡微ニ潮

熱ヲ發シ或ハ總身瘙痒シテ疹^{ツツ}ヲ發スルカ如ク目

眇モ黄ミ津唾^{ツツ}モ黄色ニナリテ苦ク皮膚ヲ擦破ス

レハ黄水出テ汗モ黄色ニシテ衣ヲ染ムルニ至リ

小便赤濁ニシテ皂莢汁ノ如クニナリ大便多クハ

黒クシテ漆ノ如ク墨ノ如ク或ハ灰白ニナリテ平
生ノ便色ニ非ス臭氣モ平生ノ便臭ニ非ス又一段
加フル寸ハ右ノ脇下硬腫シテ癥癖積聚ノ如クニ
ナリ其根菱ハ脇内ニ在リテ肋骨ノ下ヘハ指尖ユビサキヲ
少シモ容ル、一能ハス愈イユ飲食ヲ思ハス或ハ嘔吐
或ハ黒水ヲ吐キ或ハ目昏身體羸瘦シテ脈モ沉微
ニナリ面目及ヒ身體共ニ黃色濃クナリテ煙薰クモホリタ
ルヤウニ鰐黒ニナリ皮膚枯燥シテ黃屑ヲ落シ小
便益不利ニナリ總身浮腫シ腹モ脹滿シテ鼓脹ノ
如クニナリ飲食ハ勿論ノ一藥モ飲メヌヤウニナ

リテ死ス黄疸ニテ死スル者ハ多クハ水腫ニナル
モノナリ稀ニハ水腫ニナラス但羸瘦シテ死スル
モアレハ一概ニ論スヘカラス

此病壯年ノ者ハ治シ易ク老人ハ治シ難シ六十歳以
上ハ必死ト為スヘシ壯年ノ者ハ一時ノ閉塞ユエ
開通シ易シ老人ハ肝膽ノ二臓衰弱シテ自ラ閉塞
スルモノナレハ何程藥用シテモ衰弱ハ回復セス
閉塞モ亦開通スル一能ハスシテ遂ニ鬼簿ヲ免カ
レス凡ソ老衰ヨリ起ル疾病ハ老衰カ病因ユエ治
シ難シ食道ノ衰弱シテ膈噎ヲ發シ膀胱ノ衰弱シ

テ小便閉或ハ小便失禁ヲ患ヒ遂ニ死地ニ墜ルノ
類ニ同シ

急黄ハ卽チ急黄疸ニシテ隋唐ノ頃ヨリ諸醫籍ニ見

ユ其候迅速ニシテ急疫ニ疑似シキ者ナレハ誤テ

混スヘカラス蓋シ膽汁ノ通路卒ニ^{ニツカ}炊腫壅閉シテ

膽汁ノ逆流スルナルヘシ其證卒然トシテ一二時

ノ間ニ白睛胸脇及ヒ小便等一齊ニ黄色ニ變シ心

中懊懣脇下急脹煩熱身重煩躁不寐譫語妄言スル

ヲ發狂ノ如クニシテ須臾モ安靜ナラス口舌乾燥

煩渴引飲脈モ浮緊ニシテ甚急劇ナル者ナリ此證

少壯老大俱ニ難治ト為ス尤希有ノ病ニシテ予カ
歴觀スル所僅僅數人ノミナレ氏皆死シテ回春ヲ
得ル者無シ

胎黃ハ小兒初生ノ發黃ナリ大人ノ黃疸ト同フシテ
白睛及總身黃色ニナリ大便ハ黃色ヲ減シ或ハ灰
白或ハ黒クナルモアリ乳汁ヲ好ク飲ミ外ニ滯ノ
無キハ治スルコト有レ氏多クハ治シ難シ若シ撮
口吐乳及脇下癖疾等ヲ併病スル者ハ必死ト為ス
黃疸ノ者夜ハ勿論晝モ暗室ニテハ認メ難シ明窓ニ
就テ熟視スヘシ疫ノ發黃ハ永ク床蓐ニ卧シ病室

モ幽暗ユエ先醫ノ氣ノ付カス居ルヲ多シ後ニ診
シ發黃ナルヲ告テ人ヲ驚服セシメタルヲ少カ
ラス脇下ノ塊癰ハ肝膽ノ閉塞シタルナリ黒水ヲ
吐クハ膽汁ノ腐敗シタルナリ大便黑色ナルモ亦
膽汁ノ腐敗ニ因ル或ハ灰色ニ變シ或ハ臭氣ノ異
ルハ膽汁ノ注クヲ少キナリ故ニ通路漸開通シテ
膽汁本路ヘ復スル寸ハ小便ノ色白クナリ大便ハ
黃色ニ復スルナリ黃疸ヲ診シテ小便ノ色ヲ視ル
トハ人人心得テ居レ氏大便ノ色ヲ視ル者無シ金
匱ニ大便色正黒ト云々又大便必黒ト云々消石礬

石散ノ方後ニ病從大小便去小便正黃大便正黑是候也ト見ユ二千年前ヨリ大便ヲ查看シタルト見ヘタリ昔賢ノ心ヲ用フルト感服スヘキナリ發黃ノ黑便ハ瘟疫等ノ黑便ト自ラ異ルモノナリ前文ニモ云フ通り大便膽汁ヲ失スル寸ハ灰色ニ變シ腐敗スルキハ黑色ニ變スルモノト見ユ膽汁閉塞シテ身體ヘ逆流スルモ尚ヲ餘瀝ノ腸ヘ注クモノナルヘシ膽汁稀薄ナレハ鮮黃色ナリ稠厚ナレハ深綠色ナリ又凝滯乾固スル寸ハ純黑色ニ變スルモノナリ黃疸ノ小便ハ泡沫マテ黃ミ紙ヲモ

深ムヘシ大黃黃芩黃連梔子黃蘗等ノ藥ヲ服シテ
小便ノ黃色ニナルハ泡沫ハ白キモノナリ又服藥
ニテ黃色ニナルハ服後ノミニテ時ヲ移ス寸ハ常
ノ便色ニ復スルモノナリ尿色ノ赤フシテ皂莢汁
ノ如キハ黃色ノ濃クナリタルニテ水ヲ和シテ薄
クスレハ鮮黃色ニナルナリ身痒ハ膽汁ニ感シタ
ルニテ人ノ稟賦ニ因リ痒ト不痒トアリ猶漆液シニ
感シ或ハ松脂マツノニ感スルカ如シ

治法初發小便不利ニシテ發黃スルハ茵陳五苓散ニ
宜シ心下痞鞭スル者ハ小柴胡湯加茵陳ヲ與フヘ

シ脇下急脹或ハ鞭満シテ塊癖ヲ成ス者ハ大柴胡湯・茵陳蒿湯ヲ撰用スヘシ黄疸ヘハ將軍劑ヲ要藥トス攻下ノ勢^{ハツ}ニテ閉塞自ラ開通スル者ナリ若シ將軍ノミニテ藥力及ハサル寸ハ大黃硝石湯ヲ與フヘシ若シ下劑ニテ動カス者ハ吐方ニ宜シ瓜蒂吐酒石・吐根ノ類ヲ其證ノ緩急ニ應シ撰用スヘシ吐下ニ方ヲ交用スレ尺寸効ヲ奏セズ塊癖愈大ニナリ面目烟薰色ニ變シ黒疸ト成ル者ハ正傳ノ當歸白朮散神驗アリ此方予カ家ニテ歷驗スル一既ニ八世ニ及ヒ今此方ニテ奇驗ヲ得ル一多シ諸藥