

中國近代  
中醫藥  
期刊彙編

第二輯

14

醫學雜誌

明巴樂書  
卷之三


中國近代  
中醫藥  
期刊彙編

第二輯

14

醫學雜誌

上海辭書出版社



南京中医药大学图书馆版权所有

# 目 錄

醫學雜誌 第六十三期	.....
醫學雜誌 第六十四期	.....
醫學雜誌 第六十五期	.....
醫學雜誌 第六十六期	.....
醫學雜誌 第六十七期	.....
醫學雜誌 第六十八期	.....
醫學雜誌 第六十九期	.....
醫學雜誌 第七十期	.....

中華郵政認爲新政特准掛號

民國二十一年二月出版

中山醫山改西進太原研市究會

醫學雜誌

第六十三期

### △本會鳴謝▼

本會前承楊達夫先生惠贈靈素氣化新論五色診鈎玄醫學

新論各三部內贈陳理事賓卿各一部又承張壽甫先生惠贈

衷中參西錄四期六期各二部

內贈時理串逸人各一部

又承張山雷先生惠贈本會陳

時二理事脉學正義錢仲陽幼

科箋疏難經注各一部

彙荷寵錫名篇珍如拱璧謹此

以鳴

謝忱

### 本會緊要啟事

#### 時逸人啟事一

○……○一至五十四期。每  
……價目……期實售一角五分。  
○……○外加郵力一分半。

五十五期起。每期實售二角

五分。外加郵力二分半。預

訂全年。一元五角。外加郵

力一角五分。

#### 時逸人啟事三

鄙人前年在滬所組織之國醫講習所。十八年冬。即舉行結束。嗣聞上海有中國醫藥講習所之名目。其內容組織。實與鄙人絲毫無涉。恐遠道未明真像。特再鄭重

再版補印。閱者如缺少第五、第七、兩期者。請向本會文書股補購可也。

○……○一至五十四期。每

……價目……期實售一角五分。  
○……○外加郵力一分半。

五十五期起。每期實售二角

五分。外加郵力二分半。預

訂全年。一元五角。外加郵

力一角五分。

函賜教、關於鄙人負責事件。請逕寄上列地址。以免轉折遺誤。  
此啓。

#### 時逸人啓事二

本會雜誌。出版已經十載。

鄙人現住山西太原市精營東  
二道街四十二號外埠同志惠

聲明。

# 醫學雜誌六十三期目次

特載

研究鼠疫之我見

時逸人

診斷  
脈話 繼

醫藥學說

詐盲辨別法  
妊娠之鑑定

時代性病論翼

袁復初

藥物

中醫基礎學

葉勁秋

茶葉之醫療作用

陳賓卿

傷寒溫病瘟疫辯

馮 騞

巴豆之研究  
儉廬藥話

陳航慈

生理

沈仲圭

葉勁秋

葉勁秋

醫學

靈素生理新論續六十期楊如侯遺著

呂子厚

四時病症全書

陸廷珍遺著

沈仲圭

衛生

鮑東藩

肺癰  
肺痿

張治河

生理衛生

呂子厚

四時病症全書

張治河

病理

鮑東藩

肺癰  
肺痿

張治河

病理學續六十期

呂子厚

四時病症全書

張治河

醫學雜誌

第六十三期 目 次

葡萄疫之研究

張澤霖

星期徵稿選刊

吳廣生

霍亂常識

丁叔廉

方案

吳廣生

瘍科學續六十期許氏原本邵氏錄存

沈仲圭

中國古醫謂熱病皆傷寒之類西醫謂傷寒爲

增訂腳氣芻言

周小農

小腸壞熱症東醫謂傷寒爲腸寒扶斯試攷證

醫藥鱗爪

沈仲圭

命名之義及發病症狀中有無訛誤分別述其

醫案

張山雷

原委

張文元

醫案平議續

張鶴石

中國藥物學說有入肺者有入肝者有入氣分

桃嶺園醫案

沈仰慈

有入血分有補腎補脾之別試以科學方法說

產後肝風肺炎治驗說

陳賓卿

明其原委並糾正其差誤

記胃出血案

丁叔廉

張文元

流行性時疫治驗案

陳蓮峯

必效，真濟世之慈航也，今已出版至六期

胆汁性青尿下消案

前三期合編兩元三角

，其四期前已售完，今又增廣重印，爰將

來件

敬告全國中西醫界書

吳廣生

各期定期，詳列於下，以便郵買

五期兩元

六期壹元六角

增廣四期壹元六角

增廣四期壹元六角

致中央國醫館籌備委員會提議改善組織

一次買五部者外贈一部

分買單期然亦者

買全書者價七元

郵買者不加郵費



## 特載

### 研究鼠疫之我見

(此稿已載於五十一至五十三各期病理欄中近因本省臨縣一帶鼠疫傳染甚烈特增加意見附載於此)

時逸人

(一) 略史 鼠疫。西人名爲黑死病。日本譯其音爲百斯篤。其疫之發源地。爲印度及熱帶地方。繼傳及歐洲。至前清乾隆間。傳至中國。因此疫發生。鼠先感受。故名鼠疫。同治光緒時代。雲南鼠疫大作。斯時西人始知此疫。即百斯篤回匪亂時。流行尤盛。漸延至東京灣、北海、各地。光緒九年。愈傳愈廣。各處咸遭波及。光緒二十年。廣東省垣。鼠疫發生。頗爲猛烈。其死亡達至六萬之譜。由香港而汕頭。而廈門。而福州。勢若燎原。嗣後香港無歲不有。旋復延及台灣。然此僅及熱帶地方。至光緒二十五年。牛莊。會有鼠疫發生。宣統季世。滿州、贊東三省寒帶之區。亦有是疫。民國紀元。上海城廂內外。亦有鼠疫流行。民國七年。山西發生此疫。甚爲猛烈。幸防禦有方。未致蔓延。現在寒帶各地。雖漸稀減。而熱帶仍繼續侵襲。近年以來陝西鼠疫流行甚厲。晉省亦遭波及。吾儕忝列醫界。責任所關。謹貢獻研究所得之意見如左。

(二) 譲候 初期。惡寒發熱。頭痛而暈。精神頽敗。昏昏欲睡。咽喉腫痛乾燥。舌乾無津。胸部煩悶如畱蒜狀。氣逆乾咳。頸部腺腫。或腋下、胯下。亦有腺腫。內熱重者。但熱不寒。面赤氣粗。亦有協熱便瀉者。二期。肺燥愈甚。身熱口渴。喉痛漸劇。腺腫漸大。咳逆氣喘。胸悶而痛。或痰中帶血。或吐紫血。或鼻衄。或發癰疹。

## 第六十三期 研究鼠疫之我見

二

三期。肺已發炎。液枯唇焦。舌燥開裂。氣喘不得臥。嘔吐淡紅。或腐爛血水。或有吐血衄血。吐青黃水。及大便下穢濁物者。四期。疫毒內陷。身熱反去。腺腫反消。疫疹自化。胸痛、及喉痛反緩。惟吐膿血。聲瘡耳。聾。目無神光。或陷塌。鼻鼾如拽鋸。精神恍惚。此爲肺臟已壞。

按凡中醫指爲病在氣分。西醫謂爲肺炎性。亦有直入血分。血液凝滯。面色青黃。血不於外。四肢厥冷。血凝於內。身現紫斑。腹膨氣悶。西醫則謂爲敗血性。凡氣分受病毒之侵襲。終必傳入血分。故當參合研究。

之。腺腫。俗名結核。淋巴停滯。則白而軟。血液凝結。則紫而堅。皆爲鼠疫必有之現象。西醫將肺炎性。敗血性。腺腫性。三綱並立。專泥解剖之實際。不明氣分血分之源流。宜其不能於治療上得完善之方法。

(三)病理 鼠疫之種類。據西醫實質之攷察。爲肺炎性。腺腫性。敗血性之三種。其肺炎性。以咳嗽吐痰。痰中帶血。呼吸困難爲主。腺腫性。以全身之淋巴腺。如頸腺。腋腺。股腺。窩腺等部。之紅赤腫痛爲主。敗血性。(又名血毒性)。以皮膚及粘膜常常出血爲主。中醫方面之觀察。以鼠疫之感受。起點在氣分。終必傳入血分。故肺炎疫。死後解剖上所見。血液中必含爲毒菌。是肺炎性與敗血性。在病理上。不過有先後之分耳。至於腺體腫脹堅硬。又爲必有之事實。則腺腫名義。能否成立。尙待商榷。若夫惡寒發熱。頭痛如劈。心煩口渴。脈搏絃數。或作嘔吐。意識蒙蔽。昏睡譏妄。脾藏腫大。頸項腋下脇骨間之腺體。起劇烈之腫

脹灼熱疼痛。皆爲必有之規狀。惟其病毒傳入血液。侵犯心藏。使心力衰弱。與傷暑症之脈虛心煩。其意相同。故脈轉沉細如絲。即爲疫毒侵犯心藏唯一之確據。間有初得脈洪數者。乃其最輕之症。疫邪之傳襲。必以口鼻爲道路。肺熱重者。肺藏先病。內熱重者。凝結於內爲腺腫。血管破裂則出血。因疫毒之氣。具腐蝕之性。能使心藏。麻痺。肺藏潰爛。脾胃腫瘍。嘔吐血水。或咳吐膿血。侵入神經系。故意識昏蒙。侵入淋巴液。故腺體腫脹。此鼠疫病理之大概。在醫學古書中。亦有與此相類者。如千金方曰。「惡核病者。肉中忽有核粒。大如梅李核。皮肉慘痛。壯熱惡寒。與諸瘡根瘰癧、結筋相似。其瘡根瘰癧。因瘡而生。故發緩而無毒。惡核病猝然而起。有毒。若不治。入腹煩悶殺人。皆由冬受溫風。至春夏有暴寒相搏。氣結成此毒也云云。」觀此論。所謂惡核症狀。實即鼠疫之病症。其所謂冬受溫風。至春夏有暴寒相搏。實即指非時之氣。而爲疫癘之原因。于此可知鼠疫之病。唐時已有。特名稱之不同耳。

病理附翼 按克潛氏云。中鼠疫者。初則倦怠拘束。亦有驟起。即惡寒發熱。脈數異常。及毒入脈絡。則眼珠發紅。兩膝間及兩腋窩頸項等處。發爲腫脹。由腫脹至內潰爛時。恒有熱極而狂。由病榻奔出室外者。毒入血分。則嘔吐出血。兩便下血。或痰中帶血。此証以曾有肺病。及曾患梅毒者。爲最易死亡。蓋一則肺部早損。一則營分不清。疫毒一入。遂無從抵抗。以致於潰敗。病人在染疫發熱之後。經過關節腫脹。能得大汗而解。是爲佳象。顯見毒已融化外出。正氣尙能抵抗。若腫脹歷久不退。漸至量迷。則其毒漫延。難以挽救。死後凋身發黑。血分全潰。故謂黑死病也。

## 第六十三期 研究鼠疫之我見

四

(四)診斷 一曰當審其脈象也。凡時令病證。感冒初起。其脈浮躁。經過三五日後。內熱重者。其脈或洪或數。淋巴液停。往來寒熱者。其脈則絃。皆有一定之可徵。惟鼠疫身雖發熱。而脈則或沉或伏。或微細。或代止。或模糊不清。或緊急而亂。不但微細。且兼遲象。(間有初得脈洪數者。乃鼠疫之輕症。)遇此脈象。可用黃豆或黑豆令生嚼之外。感症則腥。鼠疫症則甜。且脈象之大可異者。一日之間。有時沉重。有時清爽。診脈于沉重時期。則敗象畢現。診脈於清爽時期。則脈象又順。如出兩人。頗難下斷語也。二曰初病即昏迷也。時令病症。必三五日後。方有譫語、搐搦。及熱深厥甚、昏厥等症。惟鼠疫一得病。即人事昏迷。或多沉睡。或夜寐發驚。或譫語如狂。或目珠忽然不順。或面白如紙。或面黑如炭。一言而決之曰。總有昏昏沉沉氣象。且雜症發熱輕而緩。鼠疫發熱重而急。此可以意會而得者。尤可異者。人雖昏迷。遇清醒時。又極清醒。令人難以摸捉。與他種發熱漸漸而來。實有分別。

三曰當察看身體也。凡鼠疫之朝病暮死。不及延醫。尚可委之天命。至於三日五日方死者。於核未發時。不誤作他病。未嘗無法調治。中醫治病。半憑診脈。半憑問症。手足胸腹。未曾驗看。不免簡略。凡鼠疫症。核雖未起。亦藏在皮肉之內。凡察看發熱症候。心有疑難者。必將其兩脇、胸腹、及手嶺足嶺。用力按之間。有生癰上者。不按不知。若有長圓形。隱在皮肉內者。約一二日即行將核發出。累試不爽。至其辨別之法。核之發現處。如頸部腋部、胯部、大膀、大腿處。未發見核之前。則其處必較週身之熱更甚。此之謂局所更熱也。傷寒表熱。甚腹內不甚熱。且無胸悶欲嘔之症。見于未發寒熱之前。雖伏邪溫熱。由裏達表。亦無局所更熱之別。似宜以胸悶頭暈咽阻爲報信誌。

之使。惡寒內熱。夜熱氣粗。爲第二辨別局所之特別熱。爲第三鐵證。

(五) 治法 初起在氣分。身發寒熱。咽喉腫痛。咽乾舌燥。脈微神昏者。用辟穀驅毒飲。或用清芳辟疫湯。送下解毒萬病丹。如寒熱無汗者。參用麻杏石甘湯法。如協熱下利。熱結旁流。或痞滿腹痛。大便祕結者。參用承氣湯法。口渴喉痛。腺腫漸大。胸悶氣喘。吐血嘔血。身發癰疹者。用清瘟敗毒飲。加牛蒡、大青葉、杏仁、只壳。喘不得臥者。參用葶苈大棗瀉肺湯法。腹痛腸腫者。參用大黃牡丹皮湯法。若竹葉石膏湯。及麥門冬湯。皆可供清熱生津輔助之用。其神糊氣喘。面赤如醉。用葦莖湯。送下紫雪丹一錢。或牛黃膏一錢。在血分。壯熱神迷。形如尸厥。面青肢厥。身發青紫色癰。痛如被杖。唇紫舌燥。用加減血府逐瘀湯。如腺腫紫赤灼熱。疔瘡癰疹者。用加味解毒活血湯。如腺體腫大。疼痛劇烈者。用王孟英治結核方。合神犀丹。外用經驗塗核散。

### (六) 處方

辟穀驅毒飲 見辨症求真

西牛黃八分人中黃三錢石菖蒲三錢忍冬蕊五錢野玉  
研冲

金錢半靛葉錢半水煎溫服

清芳辟疫湯加味 原方載洄溪醫案方

鮮蘆根一兩鮮茅根一兩鮮薄荷三錢鮮青蒿三錢佩蘭

葉三錢 石菖蒲三錢 鮮桑葉三錢 杭菊花三錢 未卜

汁一兩水煎溫服 送下解毒萬病丹一錢  
沖

解毒萬病丹 方載蘭台軌範

雄黃精五錢山慈姑二兩川文蛤一兩千金霜二兩紅芽大戟一錢當門子三錢飛辰砂三錢右七味各研

細末 米粥爲丸每丸約重一錢

第六十三期 研究風疫之我見

六

麻杏石甘湯

麻黃一錢生石膏五錢生草一錢杏仁三錢

調胃承氣湯

大黃二錢生草一錢芒硝  
錢半冲

清瘟敗毒散 余師愚方

生石膏一兩酒黃芩三錢粉丹皮三錢苦桔梗錢半真犀

角錢半赤芍藥二錢小生地三錢白知母三錢炒山梔

三錢青連翹三錢炒川連錢半大玄參三錢生甘草一錢

鮮竹葉五錢

大棗瀉肺湯

苦夢歷二錢黑大棗四錢

大黃牡丹皮湯

生大黃二錢粉丹皮三錢桃仁泥三錢冬瓜仁三錢芒

硝  
錢半

竹葉石羔湯

天葵三錢鮮藍根五錢

鮮竹葉五錢生石膏五錢大麥冬三錢北沙參三錢製半夏錢半生甘草八分粳米三錢方中去竹葉石羔

即麥門冬湯

葦莖湯 金匱方

葦莖三錢苡仁三錢桃仁二錢冬瓜仁三錢

紫雪丹 方載和濟局方 藥品製法太繁著

名大藥鋪有製成出售

牛黃膏 劉河間傷寒六書方

西牛黃二錢廣玉金三錢梅片五分辰砂二錢丹皮

三錢生草一錢

其研細末每服一錢水調成膏服之日服二次  
加減血府逐瘀湯 方載遇安齋證治叢錄

青蒿三錢桃仁三錢赤芍三錢生草一錢大黃二錢紫花地丁三錢王不留行三錢丹皮三錢小薊三錢紫背

蟬褪一兩皂角刺一兩殼蚕一兩滑石粉五錢先煎代水

加味解毒活血湯 鼠疫約編

醫

桃仁泥八錢川紅花五錢當歸尾三錢赤芍三錢銀花八錢丹皮三錢生草一錢玄參三錢小生地三錢連翹八錢

錢

連翹一錢玄參三錢小生地三錢

王孟英治結核方 方載王氏醫案

銀花二兩蒲公英二兩皂角刺錢半生草節錢半

嘔者去甘草加竹茹一兩大便祕加大黃三錢身熱

甚加生石羔三錢送服神犀丹一片如核不消用

藏紅花二錢煎湯送服真熊膽二分若白泡疔去

皂刺加白菊花一兩兼黑痘用神犀丹解毒萬病

丹間服

神犀丹照原方分量減至二十分之一溫熱論方

犀角尖三錢條黃芩三錢銀花八錢大玄參三錢石膏

蒲三錢大生地八錢連翹八錢花粉三錢紫草三錢淡豆

豉四錢金汁八錢

第六十三期 特 載

七

右藥各生晒研末。忌用火炒用瑩白金汁蒸豆豉生地。搗成膏和藥末爲片。每片重三錢。每用一片。微溫開水化服。日服二次。小兒減半。如無金汁。用人中黃四錢亦可。

經驗塗核散

辰砂 明雄黃 生大黃 紫花地丁 各五錢 冰片 蟬酥各二錢 山慈姑 番木鼈各八錢 右藥各研細末。貯磁瓶內。蠟封。每用一兩。如意油調敷。鄭肖岩云。凡小兒不能服藥。於結核四面。先以輕針微刺。再塗此藥尤妙。

(七)附列經驗各方

吳子存經驗方

生大黃 炒川朴 炒只實 芒硝 真犀角  
翎羊角 川黃連 黃芩 車前子 滑石粉  
牛蒡子 連翹 桃仁泥 川紅花 紫花地丁

## 第六十三期 研究鼠疫之我見

八

紫草 紫背天葵 粉丹皮 忍冬藤 知母

經驗化核散 約編  
山慈姑二錢 青黛二錢 生卷柏一錢 浙貝母三錢 赤小豆二錢 共研末香油調敷

上列各藥均可隨症選用少則三五錢重則一兩八錢不必遲疑

鼠疫毒核消毒散 鼠疫約編

蒲公英二錢 柏樹葉二錢 浮萍一錢 雄黃二錢 上梅片五分 共研末和勻白密和敷或用梅花點舌丹調旱煙膏(俗名敷之)

銀花三錢連翹三錢玄參三錢桔梗二錢殼桑三錢 板藍根五錢 生草 錢半 馬勃三錢 牛蒡二錢 薄荷葉錢半 射干五錢 蘆根一兩 同煎

鼠疫驗方 鼠疫約編

大青葉三錢 青黛二錢 黃芩三錢 花粉三錢 人中黃三錢

紫草三錢 連翹三錢 忍冬藤三錢 炒山梔三錢 水煎溫服

應驗疫證方 鼠疫約編

紫花地丁三錢 紫背天葵三錢 甘草節二錢 象貝二錢 生

誌

大黃二錢 山甲片三錢 忍冬藤二錢 牙皂錢半 絲瓜絲三錢 藏紅花一錢 白菊花三錢 熊胆(五分冲)

水煎溫服

沖

醫 學

生大黃五錢 生草五錢 生牡蠣八錢 瓜萎仁五錢 連翹三錢

善消鼠疫結核方 朱鉢文傳

煎服甚效

周氏驗方

鮮菖蒲三錢 芒硝二錢 山慈姑一錢 人中黃三錢 生大二錢 繼隨子一錢 生石膏五錢 車前子三錢 細木通二錢 犀角尖三錢

另加米卜汁八兩 西黃五分 射香五厘 分二次或三四次沖服

通絡活血湯 加減

同上

藏紅花一錢 粉丹皮三錢 紫草三錢 天仙藤三錢 犀角尖二錢 鮮生地五錢 絲瓜絡三錢 絡石藤三錢 雞血藤三錢

水煎服連服三劑有效

## 醫藥學說



時代性病論翼

袁復初

年來患流行性腦脊髓膜炎者。項背相望。此與肝鬱。心悸。神經過敏。同屬時代性病。肝鬱云何。迷走中樞多受觸覺刺戟也。心悸云何。視神經狀多受觸覺刺覺也。神經過敏云何。大腦巔頂多受觸覺刺戟也。其主要之原因。一曰。宇宙運行中之氣候變化。二曰。兩性遺傳中之血統特質。故屬天人相對原理。民二十一年秋日袁復初稿。

天人相對原理。見仁見智。因觀察法而異。同一電波之作用也。於皮爲觸覺。於目爲視覺。於耳爲聽覺。本篇所論。則以音律爲主。

攝音與胃絡 人在先天性時。爲膠質結晶。系其形爲圓。其機爲立。在後天時化爲表皮。系之磁場成腦脊反射機。所謂九竅三百六十五絡也。九竅即大腦人形。雖主調節反射機。名曰立之又立。亦曰乾父絡者。脊髓反射云也。主應觸覺刺戟。謂之三子。主運動者。曰長男與肝血。主分泌者。曰中男與腎水。主營養者。曰少男與胃氣。胃絡即迷走自律系。主節心臟搏動。名曰三焦。亦名「之道」。上通視神經牀。以應觸覺刺戟。此屬事之道也。中通心臟磁場。以營物質代謝。此指物之道也。下通脊髓營血。以應地球運動。此