

欽定四庫全書

子部

醫門法律卷六



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

醫門法律卷六

中風門諸方

侯氏黑散

治大風四肢煩重心中惡寒不足者外

臺治風癲方論見前法中然以菊花為君亦恐

風邪乘虛進入心竅故也

菊花

四十

白朮

十

細辛

三

茯苓

三

牡蠣

三

桔梗

八

南昌喻昌撰

防風分十人參分三礬石分三黃芩分三當歸分三乾薑分三芍

窮分三桂枝分三

右十四味杵為散酒服方寸匕日三服初服二
十日用溫酒調服禁一切實肉大蒜常宜冷食
六十日止即藥積在腹中不下也熱食即下矣
冷食自能助藥力

二風引湯 除熱癰痢方論見前法中蓋風者外司厥
陰內屬肝木上隸手經下隸足經中見少陽相

火所以風自內發者由火熱而生也風生必害
中土土主四肢土病則四末不用聚液成痰癰
瘕者以風火挾痰注於四支故也觀金匱此方
可見非退火則風必不熄非填竅則風復生風
火一熾則五神無主故其用藥如此之周到也

大黃

乾薑

龍骨

各四兩

桂枝

三兩

甘草

牡蠣

各二

兩滑石

石膏

寒水石

赤石脂

白石脂

紫石英

各六兩

右十二味杵麤節以韋囊盛之取三指撮井花
水三升煮三沸溫服一升治大人風引少小驚
癇瘈瘲日數十發醫所不療除熱方 巢氏用
此方治脚氣

三愈風丹 治諸風證偏正頭痛

防風通聖散四物湯黃連解毒湯各一料加

羌活 細辛 甘菊花 天麻 獨活 薄荷

何首烏

各一兩

右為細末煉蜜丸如彈子大每服一九細嚼茶清下不拘時服

按外風與身中之火熱相合以陽從陽必上攻於頭然風火盛榮血必虧故其藥如是也

^四胃風湯 治虛風證能食手足麻木牙關急搐目內

蠕睞胃風面腫

升麻

白芷

各一錢二分

麻黃

葛根

各一錢

當歸

蒼

朮

甘草

炙

柴胡

羌活

藁本

黃柏

草豈

菟 蔓荊子

各五分

右水二盞薑三片棗一枚煎一盞去滓服

按風入胃中何以反能食蓋風生其熱即內經

痺成為消中之理也方中但去其風不去其熱

者以熱必隨風外解不必加治耳

^五薏苡仁湯 治中風手足沅注疼痛麻痺不仁難以

屈伸

薏苡仁

三錢

當歸

芍藥

各一錢二分

麻黃

五分

官桂

五分

蒼

木

米泔水浸到甘草一
炒一錢五分

右水二盞生薑七片煎八分去渣溫服食前下

自汗減麻黃有熱減官桂

按此為風濕相搏關節不利之證故用藥如是也

六排風湯

治風虛冷濕邪氣入藏狂言妄語精神錯

亂及五臟風發等證

防風

白朮

當歸

芍藥

肉桂

杏仁

川

芎

白鮮皮

甘草

炙各一錢

麻黃

茯苓

獨活

各三

錢

右作二服每服水二盞薑三片煎七分去渣服

按虛風冷濕雖已入臟其治法必先宣之使從

外散故用藥如是也

七人參補氣湯

治手指麻木

人參 黃芪

各二錢

升麻

柴胡

芍藥

生甘草

炙甘草

五味子

各五分

右水一盞煎至五分食遠臨睡服渣再煎

按諸陽起於指手指麻木風已見端宜亟補其氣以禦外入之風故用此為綢繆計也

八舒筋保安散 治左癱右瘓筋脈拘攣身體不遂脚

腿少力乾濕脚氣及濕滯經絡久不能去宣導

諸氣

木瓜_{兩五} 萆薢 五靈脂 牛膝_{酒浸} 續斷 白僵蠶

炒松節 白芍藥 烏藥 天麻 威靈仙 黃

芪 當歸 防風 虎骨

酒炙各一兩

右用無灰酒一斗浸上藥二十七日緊封扎日
足取藥焙乾搗為細末每服二錢用浸藥酒調
下酒盡用米湯調下

按此治風濕搏結於筋脈之間凝滯不散阻遏
正氣不得通行故用藥如是也

九
解風散 治風成寒熱頭目昏眩肢體疼痛手足麻
痺上高壅滯

人參

兩半

麻黃

兩二

川芎

獨活

細辛

甘草

兩各一

右為細末每服五錢水盞半生薑五片薄荷葉
少許煎八分不拘時服

按風成為寒熱乃風入胃中而釀榮衛之偏勝
第四方胃風湯正驅胃風使從外解之藥此因
風入既久胃氣致虛故以人參為君臣以麻黃
川芎佐以獨活細辛使以甘草而和其榮衛乃
可收其外解之功也若夫久風成為飡泄則風

已入於裏又當用人參為君桂枝白朮為臣茯苓甘草為佐使而驅其風於內此表裏之權衡內經之旨要也本方雖用風成寒熱四字漫無著落今并及之

十搜風順氣丸 治風燥便秘因致氣閉不行暫時用之以疎風潤燥順氣殊不可少本方條下過於誇大謂久服百病皆除老者還少豈理也哉然又云孕婦勿服如服藥覺藏府微痛以羊肚肺

羹補之則其藥有偏峻不可久服明矣

車前子一兩半 白檳榔 火麻子微炒 牛膝酒浸 郁李

仁湯炮去皮另研 兔絲子製 乾山藥各二兩 枳壳炒 防風

獨活各一兩 大黃五錢半生半熟

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九酒

茶米飲任下空心臨卧各一服去腸風宿滯并

腸風下血

十桂枝湯 治風從外來入客於絡留而不去此方主

之

桂枝

芍藥

甘草

生薑

各三錢

大棗

二枚

右用水盞半微火煎八分溫服須臾啜熱稀粥以助藥力溫覆令一時許遍身熱熱微似有汗者益佳詳見尚論太陽上篇

按此方為中風一證羣方之祖不但風中入絡即中經中府中藏藥中皆當加入本方以風從外入者究竟必驅從外出故也後人競用續命

湯為加減此方置之不錄未免得流忘源矣又
沉源流俱失者哉

二十小續命湯 治中風不省人事漸覺半身不遂口眼

歪斜手足戰掉語言蹇澀肢體麻痺精神昏亂
頭目眩暈痰火并多筋脈拘急不能屈伸骨節
煩疼不得轉側諸風服之皆驗脚氣緩弱久服
得瘥久病風人每遇天色陰晦節候變易預宜
服之以防暗啞

防風 桂心 黃芩 杏仁去皮芍藥 甘草

川芎 麻黃去節人參各一錢四分防己二錢大附子炮七分

右㕮咀作二貼每貼水盞半薑五片棗一枚煎

八分服

精神恍惚加茯神遠志 骨節煩疼有熱者去

附子倍芍藥無熱者倍官桂附子 心煩多驚

加犀角 嘔逆腹脹加半夏倍人參 煩躁大

便澀去附子倍芍藥加竹瀝 藏寒下利去防