

欽定四庫全書

子部

續名醫類案卷四十六至
八



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

續名醫類集 卷四十一

續名醫類案 卷四 木
小兒痘毒

治一切
 腫腹
 疔瘡
 癰疽
 疔瘡
 癰疽
 疔瘡
 癰疽

錢塘魏之琇撰

發久不愈黃瘦面浮

人參白朮茯苓甘草

柴胡黃芩猪苓澤瀉

分於五日或三元八

節天月德要安普護福生除開破日修合酒煮麴糊
九麻子大陳米湯下

一兒病瘡醫用截瘡藥內有砒丹三截之遂成疔瘡其
父懊恨前藥之誤萬用平瘡養脾丸治瘡集聖丸治
疔調理一月而愈

一兒病瘡一日一發萬用家傳斬鬼丹截之止三日後
一發再截之俱三四日又發其父怪而問之時六七
月棗熟疑其必啖生棗故止而復發也問之果然乃

禁之先用胃苓丸調理三日更以斬鬼截之遂愈五
月五日午時用黃丹研獨頭大蒜研如泥同杵衆手
為丸隨人大小發日五更取長流水面東下

汪氏子七歲病瘧三年諸醫不效萬視其外候面色黃
白山根帶青腹大而堅此久瘧成癖癖為潮熱當與
補脾消癖瘧熱自除恨無九肋鱉甲耳汪求得之因
立一方用人參白朮青皮陳皮三稜莪朮木香砂仁
當歸川芎黃連柴胡鱉為末神麴糊丸炒米煎水日

三服調理五十餘日而安

李氏女七歲先患外感後變瘧因用截藥變作痢至冬痢雖止瘧益甚萬視其外候大骨高起大肉陷下髮稀目陷面黃鼻燥不思飲食唯啖蓮肉乃內傷脾虛疴勞症也醫皆謂不可治萬云可治也至春必愈用集聖丸一料次年二月果安

王氏子病瘧三日一發用胃苓丸合小柴胡湯方作丸服之初三日一發又間日一發後一日一發初發於

午後漸移於辰刻問曰連日服藥瘧發轉頻何也曰
此瘧將退之漸也蓋瘧三日一發者邪氣深難已一
日一發者瘧氣淺易愈午後發者邪在陰分難已午
前發者邪在陽分易愈今自三日移至一日自陰分
移至陽分故云將退之漸也時有丁醫聞其說笑曰
那得許多議論吾有秘方治瘧如神遂求治之不知
其所用何物自此仍三日一發發以酉時至次日已
後始退萬仍為調理一月而愈

孫文垣治丁氏子纔二歲患瘡母上壅咳嗽每午後發熱至子丑時乃退終日啼哭不止鵞口白屑神氣大弱又痘後遍身瘡疥未愈諸醫有灸之者有割之者有以膏藥貼之者種種施之不應孫曰乳下嬰孩臟腑脆薄不可亂攻亂補參芪足以增其欬灸割適以驚其神安能取效教以白朮鱉甲各一錢五分青蒿麥芽陳皮各八分烏梅一個貝母知母各六分甘草三分八帖全愈

水鑑仙人治百日兒瘡歌云瘡是邪風寒熱攻直須術
治免成空常山刻作人形狀釘在孩兒生氣宮如金
生人金生在巳即釘巳上木生人釘亥上火生人釘
寅上水生人釘申上也常山乃截瘡之藥

樵書
初編

萬密齋外孫未周歲因傷食發間日瘡在子丑時發則搗
咬牙呻喚大便黃綠努而出以口吮母口得乳即止
瘡後汗出心下跳腹中鳴頂微熱未十日成疳矣面
色眊白顙陷髮疎見漸羸瘦此先受暑濕暑則為瘡

濕則為痰又傷飲食脾土衰而肝木旺瘧曰食瘧瘧
曰食瘧用加減當歸龍薈丸加味參苓白朮散其母
服四物湯加柴胡升麻麥冬木通酒苓桔梗各五分
薄荷七分燈草水煎服而愈

一兒病瘧醫以柴苓湯投之二三日不效乃用平瘧養脾
丸而愈一女先驚後瘧瘧久成瘧用集聖丸調理一
月而安一兒先瘧後驚用調元湯琥珀抱龍而痊
一兒久瘧成癖因癖生熱或三五日一發發則餘日不

止常在申酉時但不寒顫又微惡寒即發熱熱亦不甚發過不渴不頭痛用消癖丸平瘧養脾丸間服半年而愈

馬元儀治金氏子寒熱如瘧兩脉弦虛無力脉弦為風發脉虛為氣少正虛則外風得襲入乃為寒熱不當與氣實有餘者同治乃用補正散邪一法用人參桂枝乾薑肉桂半夏廣皮炙草等調理數日而安

小兒痢

萬密齋姪七歲久痢不已為製九劑治之九者緩也以
治久病也用錢氏異功散合香連丸為主加猪苓澤
瀉車前子以利其小便神麴麥芽以消其積滯訶子
肉豆蔻炒乾薑以止痢合之曰和中丸約二兩許服
之未盡而痢止此為家秘治久痢不止方也

汪某年六十生一子三歲病痢醫下之太過脾胃受傷
中氣下陷又一醫以豆蔻香連合粟殼等止之痢益
甚後重而少物萬視之曰老年之子胎稟已弱下之

太過而下陷法當舉之陳莖未盡劫澁之劑亦不可
用也乃以錢氏異功散加香連歸芍山藥蓮肉神麴
糊丸服之旬日痢止元氣未復也令前藥調之適有
人曰吾有阿魏治痢甚效即以五分作丸五粒令兒
服之此不可服也汪曰今早服一九飯後服一九服
後熟睡未醒萬曰痢止矣何必服藥此藥太峻元氣
被傷恐非正睡也試呼之應推之不知入視白眼張
露氣已絕矣詳記之以為輕妄用藥之戒

耳聾久吾兒周歲餘因乳少粥飯成積又多麪食致積痢
先水瀉後濃血時已斷乳飲食少進睡不閉目肛如
竹筒指紋已過命關症極重乃用清熱消積等藥以
茶匙緩緩灌灌覺精神極困時另以人參麥冬煎湯
少少與之以保元氣如是數日痢漸止但其肉削加
柴調養半年始復舊

小兒痢疾

萬密齋治孫撫軍女五月病痢至七月未愈萬至病亟

矣用人參茯苓甘草當歸白芍黃苓車前陳皮各等
分炒乾薑少許煎服畧差五日大安孫問諸醫皆用
木香黃連今乃不用所用皆非治痢之藥而效者何
也曰此乃河間黃苓芍藥湯方也所謂調其氣則後
重除養其血而痢止之法也

祝道士子長七歲病痢半年不愈萬與一方用人參白
朮茯苓甘草黃芪桔梗木香黃連訶子肉豆蔻車前
炒乾薑澤瀉神麴當歸麥芽白芍為末水麵丸米飲

下一月而安名和中丸

一女十歲患痢久不止脉洪數或曰下痢脉宜小今脉洪數恐難治萬曰無妨玉函經曰欲識童男并童女決在寸關并尺裡自然緊數甚分明都緣未喪精華氣此童女脉宜如是胃氣尚強不久自愈果數日痢漸止

張縣尹女半歲病赤白痢甚苦萬用黃連一錢木香五分石蓮肉五分陳皮七分炒乾薑二分為末神麴丸

黍米大陳米湯下而安

張景岳治都閩錢旭陽長男年及兩周季夏間以生果傷脾先瀉後痢自善醫知其生冷所傷乃與參朮薑桂溫脾等藥不效漸至唇生瘡乃謀之張曰此兒明為生冷所傷而不利溫藥奈何張曰此因瀉傷陰兼之辛辣遽入而虛火上炎耳非易以附子不能令火歸元也因用二劑而唇口瘡痛咽腫倍甚外見於頭面之間病更劇復詢曰用藥不投如此豈真因濕生