

新刊增補萬病回春原本卷六

義集

婦人科

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

同邑後學周亮登元龍校

脈經曰寸關調如故而尺脈絕不至者月水不利當患小腹引腰痛氣滯上攻胸臆也。寸口脈浮而弱浮則為虛弱則無血。尺脈來而斷絕者月水不利。尺脈滑血氣實婦人經脈不利。

肝脈沉主月水不利腰痛

少陰脈弱而微微則血少

脈來至狀如琴弦若小腹痛主月

利孔竅生瘡

胃脈澹少陰脈微而遲微則無精

則陰中寒澹則血不來此為居經

三月一來

少陰脈滑而數者陰中生瘡

少陰脈數則氣淋陰中生瘡

少陰脈弦者白腸必挺核

少陰脉浮而動浮則為虛動則為痛婦人則漏下

婦人生死脉訣

脉經曰婦人漏下赤白且下血數升脉急數者死遲者生

婦人漏下赤白不休脉小虛滑者生大緊實數者死

婦人新生乳子脉沉小滑者生實大弦急者死

婦人疝瘕積聚脉弦急者生虛弱者死

婦人生產因中風寒熱病喘鳴而肩息脉實而浮緩者生小急者死

婦人生產之後寸口脉焱疾不調者死沉細附骨不絕者生

金瘡在陰處出血不絕陰脉不能至陽者死接陽而復出者生

懷孕六七月脉實大牢強弦急者生若沉而細者死

丹溪曰產前脉細小產後脉洪數者死又曰產前當洪數既生而洪數如

故豈得不死 此亦大槩言之亦有洪數而生者

調經

婦人諸病者多是氣盛而血虛也

○調氣養血湯 專治婦人室女血氣不和胎前產後諸病蓋婦人以血

為主殊不知血氣先不調然後血脉不順即生諸病

香附米

炒錢 烏藥 一錢

砂仁 一錢

當歸

川芎

熟地黃

姜汁浸炒各一錢

白芍 酒炒

甘草

右剉一劑生薑夾煎

服或凡或散皆可○氣痛加吳茱萸○痰盛加二陳湯全服

婦人經水或前或後或多或少或踰不來或一月兩來者俱是不調之故

○千金調經散 治婦人經水不調或曾經小產或帶下三十六病腹痛

口乾或發熱小腹痛急手足煩熱大腑不調時時泄血經水不調懷孕

當歸

川芎

白芍 酒炒各一錢

人參

阿膠 炒

牡丹皮

肉桂 各一錢

吳茱萸 炒一錢

麥門冬 去心

半夏 姜製各一錢五分

甘草 五分

右剉一劑生姜煎服

經水先期而來者血虛有熱也

治當補血清熱經自準也

當歸 一錢

川芎 五分

白芍 酒炒八分

生地黃 一錢

阿膠 炒五分

艾葉三分 條茶一錢

香附一錢 甘草三分

經水過期不來作痛者血虛有寒也 治當溫 經養血痛自止也

當歸一錢 川芎五分 白芍一錢 熟地黃一錢 桃仁二十箇去

紅花三分 香附一錢 肉桂五分 蓬朮一錢 蘇木一錢

木通八分 甘草五分 右剉一劑水煎空心溫服

經水將來作痛者血實氣滯也 腹中陣陣作痛乍作乍止氣血俱塞治當

當歸 川芎 白芍 生地黃 黃連

香附 桃仁 去皮尖 玄胡索 牡丹皮 莪朮 各等分

紅花 減半 右剉一劑水煎空心溫服發熱加柴胡黃芩

經行着氣作心腹腰脅疼痛者乃瘀血也 治當順氣消瘀痛自止也

當歸 川芎 白芍 生地黃 桃仁 去皮尖

紅花 玄胡索 莪朮 青皮 各等分 右剉一劑水煎溫服

經水過期而來紫黑成塊者氣鬱血滯也 治當調經順經白準也



紅花 牡丹皮 青皮 香附 玄胡索 當歸 川芎

白芍 生地黄 桃仁去皮尖 甘草 右剉一劑水煎服

經水過期而來色淡者痰多也 治當活血化痰經自調也

當歸 川芎 白芍 生地黄 陳皮

半夏姜炒 白茯苓去皮 甘草各等分 右剉一劑生姜三片水煎服

經水過期而來作痛者血虛有熱也 治當生血清熱痛自止也

當歸 川芎 白芍酒炒 生地黄 牡丹皮 桃仁去皮尖 紅花

木香 玄胡索 香附 甘草 右剉水煎溫服

經水過多久不止者成血崩也 治當涼血補血經自正也

當歸 川芎 白芍酒炒 生地黄 白朮 荆芥

條芩 阿膠炒 白茯苓皮不 山梔 地榆 香附

甘草 右剉水煎空心服久不止者加茅根汁磨墨同服

經水行後作痛氣血虛也 治當調養氣血痛自止也

當歸 川芎 白芍酒炒 熟地黄 人參

白朮 去苦

乾姜 炒

甘草

右剉一劑姜棗煎服

經水去多久不止發腫滿者是脾經血虛也

治當補血健脾利小便消也

當歸

川芎

白芍

木香

熟地黃

茯苓

白朮

砂仁

大腹皮

陳皮

厚朴

姜汁炒 蘇子

豬苓

木通

香附

玄胡索

牛膝 去苦

甘草

右剉一劑水煎溫服

經水月久不行發腫者是瘀血滲入脾經也

治當活血健脾行氣腫自消也

當歸

川芎

白芍

桃仁 去皮

紅朮

牡丹皮

乾姜

肉桂

厚朴

枳殼 麩炒

木香

香附

牛膝 去苦

玄胡索

右剉一劑水煎服

經水月久不行腹脇有塊作疼者是血結癥瘕也

治當調經止痛塊漸消也

當歸

川芎

砂仁

木香

小茴

乳香

枳殼

厚朴 姜炒

桃仁

紅花 牡丹皮

肉桂

香附

玄胡索

牛膝 去苦

右剉一劑水煎溫服

錯經妄行於口鼻者是火載血上氣之亂也治當滋陰降火順氣調經

乃成虛法也

當歸

川芎

白芍

生地黃

山梔

牡丹皮

阿膠

犀角

白茯苓去皮

麥門冬去心

陳皮

黃芩

右剉一劑水煎服

經行身痛麻痺寒熱頭疼者乃觸經感冒也

加減五積散

治婦人遇經行時沿身疼痛手足痺麻或生寒熱頭痛

目眩等症

依本方去乾姜加羌活獨活牛膝姜棗煎服

方見中寒

經水不調或腹痛白帶或淋瀝不止或肌瘦香此血氣俱虛也

大補經湯

治婦人氣血虛弱血海寒冷經水不調或時心腹疼痛或

下白帶如魚腦髓或似米泔色錯亂不分信期每月淋瀝不止面色痿

黃四肢無力頭目眩暈肌骸羸瘦

當歸酒洗

白芍酒洗

香附各六

川芎

熟地黃各二

白朮去芦

白茯苓

黃芪

陳皮

玄胡索各四

人參

砂仁

阿膠炒

沉香另研

小茴酒炒

吳茱萸炒

肉桂

粉甘各三分

右到一劑姜棗煎服

經驗調經湯

治婦人經水或前或後或多或少

當歸

熟地黃

香附各一分

白芍酒炒

吳茱萸炒

大腹皮

紫荆皮

肉蓯蓉各一分

川芎

條芩各七分

粉草五分

右到一劑生姜三片棗一枚水煎待經至之日服起

一日一劑服至四劑而止經即對

艾附暖宮丸

治婦人經水不調小腹時痛赤白帶下子宮虛寒

南香附米一斤

四兩醋浸四兩酒浸

四兩湯浸

四兩童便浸

北艾葉

焙乾湯瀉去灰

當歸

川芎

白芍酒炒

熟地黃

各一兩

玄胡索子炒

甘草半斤

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服七八十丸空心米湯下酒亦可

調經八物丸

養血調經如期除赤白帶久服立孕

當歸

酒洗

南芎

鹽湯浸

白芍

酒炒

熟地黃

白茯苓

去皮

白米

米泔浸

橘皮

益湯洗

牡丹皮

酒炒

條芩

酒炒

玄胡索

酒炒

右爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服八九十九空心淡鹽湯下寒月經
婦人晡熱肢體瘦倦食少無味月經不行或鼻衄或血崩半載矣或用
順氣清熱等劑不應更加寒熱且時欲作嘔余以爲鬱怒虛損脾胃濕
火錯經妄行而然耳遂朝用補中益氣湯夕用六味丸各數劑半載而
痊 方見柳益

一婦人經行遇怒其經即止甚則口噤筋攣鼻衄頭痛痰氣搐搦瞳子上

視此肝火熾盛以小柴胡湯加熟地黃山梔鉤藤而愈

一婦人多怒經行旬餘方止後淋瀝無期肌體瘦口乾內熱盜汗如洗

口脯熱甚皆由肝脾虧損無以生發元氣用補中益氣湯加茯神遠志

酸棗仁麥門五味牡丹皮龍眼肉治之即痊 方見補益

一婦人經行感冒風邪書則安靜夜則譫語此熱入血室也用小柴胡湯

方見傷寒加生地黃治之頓安但內熱頭暈用補中益氣 方見補益加

蔓荊子而愈後因怒惱寒熱譫語胸脇脹痛小便頓數月經先期此肝

火血熱妄行用加味逍遙加生 方見婦人虛勞而愈

經閉

婦人壯盛經閉者此血寔氣滯宜專攻也

○通經丸 治經閉不通

玃貓二十個 糯米炒 大黃 五錢 桃仁 四十

右為末酒糊為丸如梧桐子大空心酒下五七丸甚者十五丸如血枯

經閉者四物湯送下

○通經甘露丸 治婦人經血不通崩漏腸風赤白帶下血氣五淋產後

積血男女五勞七傷及小兒骨蒸勞熱夫婦陰血陽精不調諸疾神效

大黃

四兩用頭紅花四兩入水煎汁浸一日不用紅花四兩車便人
鹽二錢浸一日取出晒乾不用龜便四兩用好酒浸一日分
切并如杏材大晒乾入巴豆去皮三十五粒同炒黃色去巴
豆不用四兩用當歸四兩入淡醋浸一日晒乾不用當歸

右四分共合一處入南木香二兩百草霜五錢共為細末以當歸醋經

花水煮米糊為丸如梧桐子每服三十四丸空心温酒下

○反經丸 治婦人經閉不通不論新久

乳香

沒藥

孩兒茶

巴豆去殼

葱白五

班貓 五個 右為末其搗為丸綿裹三層繫放筒上將線繫住送入陰

戶內三四寸許俟一炷香時經水即下

○一粒仙丹 治婦人乾血勞並赤白帶下種子如神

巴豆 一百二十個去殼用新磚一鬼將豆紙包放磚上搥去油令淨如燻白方好

穿山甲 五錢油煎過為末 皂莢 一兩剉相皮火炮為末 苦葶 末一大黃 末一兩

右合一處以東煮去皮核丸藥如彈子大用綿繭張開裹藥在內穿入

三甘竹筒上頭後仍留繫二三寸餘挽一轉不令藥氣出外用時先以

溫水洗陰內令潔淨拭乾却以葱汁浸濕藥頭送入子宮極深處整一

日一夜取出藥不用此藥用後少聞耳冷氣下行發寒發熱如傷寒之

狀不怕飲食任意食用無妨半日即通或鮮血或死血一切惡物悉下

忌生冷發物自此子宮和暖而交媾則有孕矣

婦人虛弱經閉者此血脈枯渴宜補經白通也

○通經調氣湯 治婦人經閉虛弱者

當歸 酒洗 川芎 白芍 酒炒 生地黄 酒浸 香附 童便炒

會甫高丙可奪 卷集 經閉

牡丹皮入錢

柴胡六錢 黃柏六錢

知母酒童便炒入錢

黃芩六錢

牛膝去苳酒洗八錢

桃仁

紅花二錢

石劉作十劑水煎空心一服臨卧一服

○牡丹皮湯

治室女經閉咳嗽發熱

柴胡

黃芩各七

牡丹皮一錢

當歸一錢

白芍

生地黃

陳皮

白朮

香附各一錢

甘草四分

右劉一劑水煎服

○養真湯

一婦人經閉不通臍下一塊已經三載顏色如故百藥無功服此數劑經行又投數服而塊消矣

服此數劑經行又投數服而塊消矣

當歸酒洗

川芎

白芍酒炒

益母草

香附酒醋米泔炒

熟地黃姜汁炒

山茱萸去核

白茯苓去皮

梔子炒

小茴酒炒

陳皮各等分

右劉六劑水煎服盡經通後此作丸服

○六味地黃丸治婦女經閉發熱或咳嗽等症

方見補益依木方加桃仁

婦人半虛半實經閉者宜攻補兼施也○通經湯治婦女經閉不行

當歸

川芎

白芍

生地黃

大黃

宮桂

厚朴

枳殼

枳實

黃芩

蘇木

紅花

烏梅

右剉一劑姜棗煎服

○調經養血丸 治婦女經脈不行或不調或前或後赤白帶下久不成

孕服此有孕任服

香附

十二兩酒醋盪湯童便各浸三日取出炒

當歸

酒洗

白芍

酒炒各

川芎

一兩

生地黄

酒洗二兩

茯苓

去皮

白芷

一兩

牡丹皮

酒洗二兩

乾姜

炒一兩

肉桂

一兩

紅花

一兩

桃仁

泡去皮一兩

玄胡索

六錢

沒藥

二兩

半夏

香油炒一兩

阿膠

蛤粉炒成珠一兩

小茴

炒三分

莪朮

煨醋炒五分

甘草

炙五分

右為末醋糊丸每服八十九空心白湯黃酒任下

婦女經閉有積塊者宜養血破積也

○四物調經湯 治婦女或十五六歲經脈不行日夜生寒熱手足麻痺

飲食少進頭痛惡心嘔吐腹中忽然結一塊冲動痛者宜此快食生冷

傷感而致也

當歸

酒洗

川芎

白芍

酒炒

柴胡

枳殼

去穰麩炒

枳殼

各八分

黃芩

八分

熟地黄

酒浸

陳皮

莪朮

醋炒

三稜

醋炒

白朮

去苦

白芷

小茴

鹽水炒

玄胡索

各五分

香附

童便炒一分

香附

童便炒一分

香附

童便炒一分

青皮 麩炒

砂仁

紅花

甘草 各四分

右剉一劑生姜三片葱白三根水煎溫服。若有塊不通須與調經丸間服。遍身疼痛加羌活獨活。咳嗽加杏仁五味子 各五分。肚痛加炒乾漆 七分。瘧疾加草果常山。泄瀉去枳殼加肉蔻。調經丸

陳皮

白木 去茸

厚朴 姜汁炒

小茴香 炒

艾葉 去筋各一兩

香附 醋炒 五兩

三稜 煨醋炒

莪朮 煨醋炒

砂仁

白芷

牛膝 去苳酒洗

玄胡索 各一兩

粉草

琥珀 各五錢 另研入

枳殼 去皮炒一兩

右為末醋打糊為丸如梧桐子大每服八九十九丸米湯下酒亦可苦肚

痛加蒼朮去白朮

婦人經通之後宜調理之劑也。加減四物湯加香附陳皮之類 補益

滋陰百補丸 治女人勞傷氣血不足陰陽不和乍寒乍熱心腹疼痛

不思飲食疴羸之力 香附 湯童便各浸四分 製酒醋盪 益母草 八兩

當歸 六兩 酒浸

熟地 酒洗

白朮 去苳

人參 去皮

茯苓 去步

玄胡索各二兩 白芍三兩 甘草兩 川芎四兩 右為末煉密丸如

桐子大每服六十九空心病砂湯下或酒醋白滾水任下

婦人胃氣素弱為吳母吐血咳嗽盜汗發熱經水三月不行余以為悲

則傷肺思則傷脾遂朝服補中益氣湯方見補益加桔梗貝母知母夕

用歸脾湯方見健忘送六味丸而愈方見補益

婦人久患瘧瘧作則經不行形虛脉大頭痛懶食大便泄瀉小便淋瀝

口乾唇裂內熱腹脹蓋由久瘧正氣已虛陰火獨旺用補中益氣湯治

之尋愈惟不時頭痛乃加蔓荊子而痛止兼用味地黃丸而經行方覬

魏憲副龍夫人患逆經吐血不止子珍六脉微瀯有力此血虛火盛也以

四物去熟地用生地共一兩加酒蒸大黃一兩同煎入童便服之服後

血止經通矣

魏憲副龍夫人患經閉人皆擬有孕乃七八箇月漸覺黃瘦腹中左右有

塊如鼓發熱面赤不思飲食余診六脉微瀯此血枯氣鬱也以四物湯

加香附牡丹皮白朮之類十數服又加桃仁紅花又數服方與四炒根

經閉 血崩

殺丸不三四服打下血塊若許始愈

血崩 脈帶下崩中脈多浮動虛遲者生寔數者重

崩漏者有新久虛寔之不同也

初起屬寔熱者宜解毒也

黃連 黃芩 黃柏 生地黄 蒲黃 右剉一劑水煎空心服

○治婦人血崩每四十以上悲哀太甚則心悶急肺燥舉焦而上焦不運

血熱而流 行先以黃連解毒湯後以涼膈散合四物湯調治効

稍久屬虛熱者宜養血而清火也

○溫清散 治婦人經脈不佳或如豆汁五色相雜面色痿黃時腹刺痛

寒熱往來崩漏不止 當歸 白芍 熟地黄 川芎 黃連

黃芩 黃柏 梔子各二 右剉一劑水煎空心服

日久屬虛寒者宜溫 益母湯 治婦人血崩

當歸 川芎 白芍 酒炒 熟地黄 姜汁 條芩