

欽定古今圖書集成博物彙編藥部典

第四百六十三卷目錄

醫部彙考四百四十三

小兒諸症門一

錢二小兒腹瀉五臟內外諸症治法

假極傷風咳嗽微瀉治法

張從政傷風事親方

方賢奇效良方

魯伯嗣學聖童百問

張三錫華龍六覽

薛信古今醫鑑

薛氏保嬰秘要

王肯堂證治準繩

醫部彙考四百四十三卷

小兒衛生微論方

小兒諸症門一

朱錄二小兒腹瀉

凡小兒在內日睡腹瀉利青白膿稀瘦弱疳在

外鼻下赤爛眼淚耳或鼓膜生瘡鼻瘡用前奇散

諸瘡用白粉散

疳疳一名瘡用白臘送服或滾血而瘡用地黃丸



心疳面黃頭赤身微壯熱用安神丸

脾疳一名肥疳體黃瘦削皮膚乾澀面有瘡疥腹大

嗜土用益黃散

疳疳一名瘡疳收膿潰爛遍身生瘡疥有以濕地用

地黃丸

肺疳一名氣瘡喘嗽氣促口鼻生瘡用益黃散

若患潮熱當先補肝後瀉心若妄以硝黃諸藥利之

若患癆瘵當清痰若誤以豆豉礬砂下之又傷寒候下

皆能成疳疳初病者為熱疳用黃連丸久病者為冷

疳疳用木香丸冷熱相兼者用如聖丸津液短少者用

白朮散凡此因大病脾胃虧損內亡津液所致當因

脾胃為主而早為施治則不致敗證也

按疳證或補食大早或嗜食甘肥或服峻瀉之

藥重亡津液虛火熾盛或因寒賦或乳母厚味七

情致之各當調治其內

若口舌微爛身微壯熱額赤赤或作腫痛腹痛

煩悶或寒熱間作渴飲水便赤赤汗潮熱虛驚

此心經內外疳也用安神丸之類主之

若鼻外生瘡眼目赤爛肢體煩燥兩耳前後項側

缺盆兩腋結核或小腹內積主草陰囊萎丸腫瀉

小便不調或出白津或咬指甲搖頭目白腹瀉

疳疳明長日壯大者筋口乾下血此肝經內外疳

也用地黃丸主之

若頭不生髮或生瘡瘡或髮成穗或人中口吻赤

爛膿痛此逆乳食不化口乾渴下瀉下脫臭小便

白濁或合目昏聩惡聞木音此脾經內外疳也用

肥兒丸主之

若鼻外生瘡咽喉不利頸痛齒痛咳嗽痰熱皮膚

皺縮久伸少氣鼻鼻出涕紅目黃小便頻數此

肺經內外疳也用地黃清肺散主之

若惡熱吐瀉手足逆冷寒熱在來清泄肚痛口臭

作瀉瀉瀉瀉瀉小熱而身生瘡疥耳生瘡或出水或

食自此此疳經內外疳也用地黃丸主之凡疳為

上攻或毒少升為惡毒毒少為走馬疳疳多毒難

黃散服瘰癧丸輕則不脫腐腐腐腐腐可治重

則牙關閉結惡煩煩煩煩

世傳方又云有無毒等疳十一證

金倪維權原機啟微

深疳為害之病

衝氣少而氣氣聚之也元氣微而飲食傷之也外

內傷而或成之也父母以其神弱而致深多不為

父母以其惡風邪故遂更不釋衣父母以其數

故飼後強食之父母以其或瀉邪故乳後更飲之

有惡風而為父母者又不審其寒熱飲食也故寒而

不為覆暑而不能涼飲而不至渴食而不及飽而小

兒由元虧故抱疾而不能自食故外來內傷因循積

積而或成疳也渴而易飽能食而腹脹下利作驚

疳疳不遠不治遂生疳疳疳疳疳疳疳疳疳疳

如潮入而膿流黃枯閉目何則為風氣下走也為陰

氣反上也治法當如陰陽虛大論曰清得上下

通除上下截清濁發理通除除五臟清陽實四肢

濁除歸六腑各逐其原不反其常是其治也當作升

陽降陰之利使去濕濕濁主之升麻龍腦散飲于主

之此藥非專於目升治已上數證然勿後復則危也

最長病在肝身熱尿乾手足清冷其病在腎身焦皮
 溼大便乾結其病在肺結口癰其病在脾乾渴其病在
 胃乾渴五帝也
 府渴者臟中風有疝氣加之乳母忌食五辛酒麪炙
 燥使見心肺熱然則渴渴飲水乳食不進夜則渴
 止是也
 府渴者毛傷得白蠟上膏故壯熱腸鳴渴上精和是
 也勿用熱藥止之
 疝病有快受風寒暑濕或熱不調或停積宿滯水
 穀不聚於下惡解是也
 疝癰脹者虛中有積其毒氣交併故令壯熱癰脹由
 是腫脹受濕故令頭面即手足清冷是也法當野積消
 疝勞者熱然往來五心煩燥手足心及背脊熱而發
 瘡癰汗骨蒸熱喘喘仲是也或渴而復渴飲水不覺食
 肚硬如石面皮如銀斷不可治
 無辜疝者腹後項邊有核如彈丸按之轉動軟而不
 疼其間有蟲如米粉不連破之則蟲蟲熱氣散散淫
 食膿膿以致肢體癱瘓便利膿血壯熱癰脹頭暈目
 高是也針刺破用膏藥貼或針濕兒衣露下膚下高
 為漏落羽所汚兒者此衣蟲入皮中亦致無辜之疾
 兒衣已爛須微火烘之其若手足極細項小皆由肌
 熱體瘦腹大臍突黃瘦或生瘰癧是為丁癰虛
 熱往來頭骨分開其黃赤最煩渴燥是為諸瘡皆
 因脾胃大虛不能消化水致以致精神減損以藥
 其血氣故肌肉癰瘰瘰氣不足復為風冷所傷使形
 骨枯瘰亦有胎中受毒臟弱血少致之此皆無辜疝

傷損類之疾病而至此不幾殆故宜肥兒丸大黃膏
 丸五疳丸胡黃連丸至聖丸茯苓丸大癰丸地黃丸
 十全丹香薷丸九疳丸消食丸龍甲丸下蟲丸集聖
 丸黃雞卵丸等藥及早治之方為全美
 又有疳傷久則腸胃受濕停之狀如孤惡傷寒前條
 之證或以走馬疳名蓋齒腐腐爛腐爛受熱疳疳氣
 道奔上焦故以走馬為喻初作口氣名曰臭息大畢
 齒黑變則爛爛然血湧出曰宜藥甚者齒腐脫落治
 之之法用銀絲生細絲細研入麝少許合和擦齒如
 無蜘蛛用其殼亦可
 虛癰
 仲陽云虛癰者脾胃不和不能乳食致使肌膚瘦弱
 亦因大病或吐瀉後脾胃尚弱不能消化飲食也有
 冷者時時下利唇口青白有熱者身熱溫壯腹內微
 黃此冷熱虛癰也冷者不香丸之夏月不可服如
 有此證則少服之熱者胡黃連主之冬月不可服如
 有此證則少服之傷寒後虛癰者竹葉湯主之常服
 四君子湯異功散參苓白朮散之劑皆可服也橫連
 丸九服丸肥養肥兒丸
 虞博醫學正傳
 內經曰飲食肥令人內熱飲食甘令人中滿蓋其病
 因肥甘所致故向名曰疳疳者大癰瘰中之乳子與四
 五臟之孩兒疳疳未起胃氣未全而氣尚未充也
 父母不能調助惟疳疳是孤憤之受遂令志食肥甘
 與夫瓜果生冷及一切辛酸調和之味初雖養食漸
 成積滯肥因以致身熱體瘦面色萎黃或肚大青筋

最痛瀉利而諸疳之證作矣錢仲陽曰小兒病疳多
 因大病後或吐瀉後以藥下之致脾胃虛損津液
 而成蓋此證實由愚醫之所害耳斯言也特一端耳
 未可悉以為然其所謂謂大病吐瀉甚非飲食之所致
 與夫仲陽為兒醫之祖豈不審如其所論諸疳疳證
 治法班班可考學者不可不察如疳在肝則服瀉疳
 法當補肝地黃丸主之疳在心則面頰赤身微壯熱
 法當補心安神丸主之疳在脾則體黃腹大飲食不
 土法當補脾益黃散主之疳在肺則氣喘口鼻生瘡
 亦當補肺益黃散主之此虛者隨其母也疳在腎則
 極瘦而身生瘡疥法當補腎地黃丸主之骨疳喜臥
 冷地當服疳疳地黃丸內疳疳則脾腹膨脹色無常
 或沫疳疳疳而腹弱此疳證也宜服不香丸外疳鼻
 下赤癰自鼻與有瘰不結癰邊日面生瘡用治瘰
 癰散散白粉散等藥法曰諸疳皆因木蠱而補其
 母則子自安假今日中滿是心虛虛熱也肝為心
 之母宜先補肝肝實而後復心心得母氣則平而
 潮熱愈矣餘皆倣此大抵疳病皆寒冷熱肥瘦而治
 其初病者為肥熱疳久病者為瘦冷疳疳疳疳疳
 九熱則當用胡黃連丸冷熱疳疳疳疳疳疳疳疳
 惟小兒之癰癰癰癰癰癰癰癰癰癰癰癰癰癰
 疳證為兒醫者當以功效之心為心而善調之母經
 巨體為為治法以絕人之禍爾幸甚
 張三錫筆端六要
 疳疳
 小兒肥甘志意養不進生冷油膩傷脾胃積物
 助大因循積滯成疳疳疳疳疳疳疳疳疳疳疳

下泄腹脹身乾作嘔醫難久不治脾弱肝旺肝火
自燄其竅遂成目盲多生醫難雖閉不能開雖淚如
糊久而難流乃中州弱而清陽不升肝火熾而濁陰
不降所致當升清降濁以白朮人參補脾胃為君
柴胡根枳實上藥理脾為臣蒼朮茯苓澤瀉麥冬降
濁為佐佐法毫刺升麻川芎薄荷諸風藥勝濕為使
乃正治妙法

小兒肝經濕熱內其上下攻於目眼腫脹九味蘆薈
丸妙藥脾虛癆瘵瘦弱不食者開胃脫兒九瘰除胸
有相火壽者心虛少與六味地黃丸
諸信古今壽鑑

諸疳

夫諸疳者謂肥甘飲食之所致也治宜理脾胃消積
化蟲清熱止瀉生肌以肥兒丸疳積餅為主此二方
不問諸疳冷熱服之最效大抵疳之為病皆因過食
飲食於脾家一臟有積不治疳之餘蘊而成五疳之
疾何謂五疳心肝脾肺腎也如疳在心則面赤口乾
肝牙疳好口舌生瘡身熱體瘦以安神丸主之疳在
脾則面黃腎臟遮睛搖頭多淚頭佳髮豎前骨
膈熱弱以補肝脾主之疳在肺則面黃身熱腹脹
肚大好食泥土水穀不消泄下酸臭因脾減食肌瘦
以養胃散主之疳在肝則面白咳嗽喘逆口鼻生瘡
咽乾不利壯熱惡寒鼻流清涕以清肺湯口鼻生瘡
腎則面黑肌肉瘦而體生癭身熱尿渾手足冰冷口
鼻乾渴以地黃丸主之

諸疳

小兒諸疳皆因疳積疳積損或用藥過傷不能得
化乳食內亡津液虛火妄動或乳母六淫七情飲食
起居失宜致兒為患五臟之疳不同當各分辯其證
雖多要不出於土臟治法疳疳用肥兒丸以生腎心
疳疳用安神丸以治心異功散以補脾脾疳用四味肥
兒丸以治肝五疳功散以生土肺疳用清肺散以
治肺益氣散以生金腎疳用肥兒丸大蘆薈丸走馬
疳散通散散疳疳丸若作渴渴刺刺疳疳等類
當詳多方論而治之至者較也因脾胃津液乾涸
而致在小兒為五疳在大人為五勞總以調補胃氣
為主

疳積
大抵多因乳哺失節脾家有傷元氣下陷或乳母飲
食七情所致小便如泔或泔或大便如泥者用四味肥兒
丸積滯黃者用四君子湯加黃連木香香日久
不復或黃瘦或腹中痛者用六君子湯加木香芍藥
若小便不利大便燥結者服此落身下疳疳用肥兒
丸仍善乳兒飲食七情主之

疳蟲者九蟲之一也長以許至五六寸者因蟲積虛
弱及食甘肥而動其動則腹中攻痛或作或輟口吐
涎水黃心則用使君子丸之類下之使吐蟲云吐
水不心痛者胃冷也吐沫心痛者蟲痛也與痢相似

疳疳

疳疳有過傷寒五六日間有下痢以冷藥下之太過致
脾胃虛而津液少即使引飲不止而生熱也然氣內
耗肌肉外消體弱相于惡瘧諸端亦成疳疳又有吐
瀉久病或醫妄下之其惡甚其津液煩躁小能成疳
也

小兒痼癖由乳食不消伏在腹中半生涼生熱飲水不
止或喘而嗽與癰熱相類若不早治必成勞瘵以其
有癖則令兒不食致脾胃虛而熱故引飲也飲
多即滿腹脾胃胃津液不能傳化水穀其脈沉細
蓋不能飲食致脾胃虛四肢不舉諸邪遂生羸瘦
而成疳疳

兒童二歲以下其病為疳疳二十歲以上其病為癰
疳疳癰皆由乳食不消致之同出而異名也
何者小兒氣弱癰癰則易傷乳哺飲食一或失常
不為疳者鮮矣疳疳乳食不調甘肥無節而作也或

嬰幼乳乳諸病太早耗傷氣則疳之類生或二歲
時後食乳稍多過飽無則疳以得或食甘肥
粘膩生冷鹹酸以滯中貽疳因成或乳母寒厥
失理飲食失常喜飲厚粉即與兒乳則疳因母患
氣而入此非病家不能謂之過乎疳皆脾胃受病
內無津液而作也若因吐瀉之後妄施吐下津液虛
竭得之者有因潮熱大下利無禁約胃中焦保得之
者有因傷寒裏證冷嘔太過湯引水費變而生熱熱
氣未散復於他病得之者又有病瘵寒熱骨下痛硬
或者不能漸與消磨遂以峻攻決津液變傷得之
者此非疳者輕重壞之過乎

肝疳亦名風肝亦名筋疳其證白膜遮睛肝疳渴血
而眼白青微腫痛極頭目眩注遍身合面而
臥面色青黃髮疎頭焦骨痛熱汗身瘡瘡腹中積
聚下利頻多久而不愈瘵其瘦瘦目生肢黃髮際左
脇多青或白筋微黃利來水或如苔色
心疳亦名驚疳面黃瘦身壯熱口內生瘡身壯
熱吐乳無常類赤面黃唇暗煩滿驚心口燥口舌生
瘡痢久不愈下膿膿有瘡涎或口虛驚小便赤
瀝五心皆熱或牙疳口舌飲冷不渴伏脈于地
脾疳亦名食疳其證脾疳食不消胃弱多吐腹多筋
脈痛風氣阻乳食不消心腹脹滿多喘欬逆面黃
黃黃立毛焦形枯力劣弱難臥水穀不消口鼻昇
乾情慮不悅受暗閉胃不和利多酸臭受食冷
物引飲無度身而俱黃髮稀作穗頭大項小腹軟弱
弱間或腹瀉肌瘦口微黃涼夜熱不思乳食錢氏云
疳疳即脾疳也身瘦虛黃乾而有瘡其候不一種種

異端今略舉之目灌或生白膜赤身乾黃或黑唇
臥冷地或食泥土上有疥疥面黃青白黃沫水刺也變
易腹滿身耳鼻皆有瘡髮紫作穗頭大項細極瘦微
水皆其證也

此言脾疳證候多與餘疳相混蓋疳為脾經本病
因惡寒之

肺疳亦名氣疳其證氣喘口鼻生瘡瘡嗽氣逆皮毛
乾焦饑渴多喘咽喉不利按唇咬甲壯熱憎寒痔邊
赤瘰癧內氣聚乳食漸稀大腸不調頻泄利糞中
米出皮上粟生鼻下赤爛手足枯細口有腥氣右腮
見口

腎疳亦名急疳又名付疳其證腎疳瘦瘦有瘡赤
痔疳瘡臥冷地諸爪黑脫骨消瘦齒齦生瘡寒熱作
時口鼻乾燥熱如火脚冷如冰水逆涎增乳食減
少瀉利頻併下部間張肛門不收疳瘡瘡通兩耳內
外生瘡脚如鵝膝頭縫不合或未能行牙齒生遲其
縫異端傳作走馬疳之類又有小兒久患腎疳內虛
不食其者天柱骨倒治法當用錢氏地黃丸加驅疳
等劑仍與貼項項強若不識諸疳之五候非也天柱
骨倒凡有二三種有吐瀉日久驚弱成者有肝體伏熱
而赤腎熱變者有傷寒不化及發寒成者皆風
邪入肝以致筋絡舒他吐瀉者當謂胃氣肝熱者隨
輕重以涼肝滋潤與強筋貼項惟傷寒天柱骨倒者難
療

莊氏 十四候

第一候黃腫血目漸瘦是冷熱疳
第二候細細壯高胃弱生愛吃泥上酸膩日久通

身黃痔瘡吐瀉下痢腹內疼痛是脾疳

第三候身下赤爛愛抓膿血痛是肺疳因眼瞇
熱物或病疳所損心脾加之陰氣足以服寒冷藥過
多便上熱下冷漸漸昏沉日夜微喘

第四候皮虛軟面無血色身上生瘰癧心煩

第五候毛髮稀疏鼻生瘡是肺疳

第六候頭生瘡毛髮焦是肝疳

第七候牙齦黃赤不定是腎疳

第八候頭髮焦乾鼻下瘡是肺疳

第九候咬指甲毛髮作穗四肢沉重是心疳

第十候壯上筋生齒齒性是骨疳

第十一候齒齦斷鼻面無顏色心不思食是胃疳又
名口疳

第十二候吐逆腹脹是胃疳又名肝疳

第十三候愛合面臥多睡如醉腹脹氣急盡是因胃
寒生因如此腹內有蟲是心脾疳

第十四候鼻內乾痛口中臭氣齒根有鮮血是肝疳

第十五候細細壯高胃弱壯上有青脈是脾疳

第十六候非時生瘡愛咬冷水是熱疳

第十七候皮膚上生數子黃中木出是脾冷疳

第十八候氣喘腹脹及口乾是心胃疳

第十九候愛驚生毛髮乾黃是脾胃疳

第二十候按脊脊根及咬指甲愛飲水是肝疳疳

第二十一候多寒熱愛臥不覺是胃熱疳

第二十二候愛飲水眼目不開是肝疳

第二十三候臥體或熱或涼皆渴無時是急疳

散諸壯九省府誌之藥

痘症

其候面帶青黃色身現壯形髮髮脫身熱壯中微痛此因痘毒而傳為此候治之先用勻氣散解毒散調理二日後下黃金丹取下痘種再下勻氣散解毒散補之重服壯九即愈
王欲云痘氣理脈漸結先調胃氣後與取虛積藥大服指藥

痘毒

先用寶金丹取下痘種後用勻氣散香連散乳香散理理止痛服保赤丸
石便經云痘因不傷飲食或食乳致熱腹中有片子或如錫子又加三指大所以作潰敗如精毛髮硬而無光或青黃色目多灰視當分水穀乃煩溫

和藥和氣即論若熱則作癰而充瀉而多食為患痘症最難藥瀉而少食為冷痘症溫藥
盛氣

盛氣

母氣不足則氣虛肉痿

小兒最難養生肌膚者為脾胃不和不能飲食故血氣衰其不能榮於肌膚也其熱者即溫壯身熱肌肉微黃其決冷者即時時下痢每口青白

小兒經諸大新或驚或傷或受涼或受暑而腹脹或吐利或泄瀉或身熱或身冷之後氣虛不能消化穀氣以壯身體虛氣也

要當審其形名察其見驗如面赤多啼心之虛虛也面青白則肝之虛虛也其前後腹下下結後肝經虛

火也頸間內裏結核食積虛熱也面黃赤滿脾之虛虛也面白氣喘肺之虛虛也目睛多白眼之虛虛也仍番相照而察之又寒熱二證不可不辨若腹脹滿利清白不渴喜熱此屬寒證雖在夏月有木香丸身熱諸藥高利其黃作渴喜冷此屬熱證雖在冬月宜胡黃連九皆拾時從證之治法也

痘瘡

小兒丁癸者由哺食過度而脾胃弱不能磨消故也哺食不消則水漿之積損損無以榮其氣血致肌肉消瘠其腹大頸小黃瘦是也若久不差則變或數載傷傷咳嗽瘰癧一名丁癸三種大體相似料重立言也

凡小兒或因吐而瀉久不差或病退不能行膝大膝小號曰丁癸七歲以下號曰癰風十五以下名曰癰風蓋此症是風冷傷於脾胃所致其治法也
痘瘡丁癸辨證云小兒腹大如有筋脈即曰癰風如無青筋乃名丁癸是因過飽傷食而得之

丁癸者亦久積成瘕之證若因飲食過飽傷脾胃脾胃虛不能磨化飲食飲食漸減無以生其氣血面白包極潮熱往來腹大而多青筋手足如餅顛顛開腹

腫小而身黃瘦先投萬應丸次參苓白朮散早服一服藥養胃氣及醒開腹進食後下烏犀丸三粒至五粒助消化食此即迎毒之法而投脾散散沉香柳枝丸木香枝丸丸次第調理有渴渴服補千金

青柳枝丸木香枝丸丸次第調理有渴渴服補千金青柳枝丸木香枝丸丸次第調理有渴渴服補千金青服或用烏犀丸略下二三行勻氣散止確有寒熱往來染飲食主下脾散投南星散散有餘熱參茸

神枝煎湯調二服散有蟲下史君下九斯疾使之非一劑一夕然變市之法亦須斟酌令其下復飲亦速放則變久丸鴉道下對雞野甘甜生毒物宜忌之

喘露

喘露者因乳哺不消脾胃虛弱不能食血氣減損乳而不榮胃虛既吸苦熱則之喘露也宜醫者進食丸
喘露者亦由乳哺不消損於脾胃脾胃弱而飲食減形客虛則則肺之氣不能宣通胃間有積滯之喘露此候也丁癸相去不遠但食多吐逆氣喘虛冷而泄瀉無異者有藥治法同前丁癸治法惟加藥

湯服之
痘醫李綱曰
十二無辜此證
太早 乾口 木舌 惡露 重舌 周唇紫
喘氣 喘口 重舌 乳瀉 龜背 背熱
反指

心指者若驚悸常只眼木少食辛味耳邊有青脈舌上有黑點者不治
肝指者目赤而多眵下多唾沫眼眼者不治
脾指者腹大青筋目無血色人中平下刺不止者不治

肺指者咳嗽氣急渴白牙身生黑斑者不治
腎指者髮黃酸淚水不注小便如粉汁黃黑有瘡皆出耳乾癢者不治

小兒衛生總微論方
五疳

小兒疳積諸症難症五疳之說為當其證候外則傳變不同內則悉屬五臟一曰肝疳其候搖頭揉目白膜遮睛遍身多汗晝夜不安腹中瀉瀉黃黃髮焦頭焦面黃無熱而積聚下積積多日漸黃瘦二曰脾疳其候面黃肌瘦赤面黃心胃弱腹煩脹滿口舌生瘡涎升多驚下疳瘰癧血神彩衰三曰肺疳其候腹大如鼓上多前胸喘促氣粗心腹壅脹多喘咳嗽水穀不消胃口乾澀好食泥土情色不樂情明好睡刺多酸臭肌肉內消形枯力劣甚則大肉陷下四曰肺疳其候咳嗽氣逆皮毛焦落咽乾不利採鼻咬甲口鼻生瘡腹內氣脹乳食不進六腸不調此疳不常作寒熱黃中米出渴下白甘五曰腎疳其候上熱下冷寒熱時作齒斷生瘡目焦腦熱手足逆冷吐瀉泄下部生腫脫肛不收夜啼驚哭漸成困重其則高黃乃敗小兒疳疳乃與大勞瘵相似故亦名疳勞大勞者因肝臟虛損精氣枯小兒疳者因脾臟虛損津液消亡病久相傳至五臟皆損也夫人勞其骨節而氣耗小兒疳疳腹脹而神驚以其病之始也其臟之氣受不同故也至於傳入五臟皆損則一也故五臟者經言一損於皮毛皮聚毛落肺也二損於肌肉肌肉消瘦飲食不為肌肉脾也三損於血脈血脈虛少不能養於臟腑心也四損於筋筋不能自收肝也五損於骨骨瘦不能起於牀骨也病極則大肉陷下高骨敗壞以至死矣凡小兒有疾多是上下所壞小兒臟腑虛弱易虛易實一切諸病流行轉下拉脾胃虛弱津液內耗皆能成疳且如爛熱日中時發者是胃脾虛心氣實也

之內發其熱法當先清其肝肝為心之肝實而後清心心不得清則平而熱熱乃金體見熱熱妄謂其實以大黃牙痛等藥利之利既多而不能止則津液內亡上滿於肺也又如瘧疾發作寒熱代木骨下利而後復發法當用麥散清之瘧見有瘧便以巴豆硝砂散瘧瘧下之下既多而津液耗則瘧成疳也又如傷寒五六日之後有下證因以冷藥下之太過致脾胃虛而津液耗即變為疳也又如熱下之太過熱氣內耗於津液流而外消而變為他邪相下證變百端亦因成疳也又如疳積久津液耗亡亦能成疳又如小兒食肥甘初者因傷食積則發熱發熱津液內耗亦作疳疳疳初也也豐濟存云肥甘之過積聚疳實乃謂受父母諸病皆能成疳也疳之候腹滿多困或生白膿瘡口淡白身色黃瘦食肥土生米甚臥冷地亦難強強則泄瀉白黃赤痢瘰癧血脈瀰瀰咳耳鼻生瘡髮稀作髮頭大項細肚大黃前腳手垂難舉飲食漸減骨重形劣是疳者其證也本因脾虛津耗久則傷及成疳者則為瘦弱瘰癧者則為瘰癧瘰癧又富難認冷熱疳疳疳者乃因食肥甘積聚生熱而作或多病於初也治用黃連丸其瘦冷疳者乃因轉下瀉利生冷而作或多病於久也用木香丸通治冷熱疳疳疳用如是凡小兒之病必重難治冷熱不可妄行轉下恐傷生肌也若病初之脾虛津少發渴飲者常生胃中津液而錢氏白朮散服

疳疳強則不能為害若臟腑虛弱則陰虛而對而生焉故將此別立三卷之名一曰疳疳又曰長蟲居胃脈之間動則令兒吐青白沫或吐清水心腹刺痛者蟲其心者即死二曰蟻蟲居胃之動則動為痔瘻腫痛瘻亦如蟲三曰白蟲居腸胃之動則動損人持氣令腹刺痛者更有一蟲形若細絲或如馬尾故俗呼馬尾蟲此蟲不在九竅之數或云飲食中誤服酒髮所授亦居胃中動則令兒腹中攪動發痛不可忍受小兒蟲動者多病於諸病之外蓋因臟腑虛弱故也患疳者吐瀉者尤甚治法用藥每於月初四五日間在疳疳疳服之至日午前服即瘳下大後以平調藥一兩服和之不可多也

虛蟲
小兒虛蟲者由諸病之後或誤行轉藥或吐而利數脾胃虛弱不能傳化穀氣飲食不入肌膚消瘦乃成虛蟲也

薛已曰愚按前證當以本方為主佐以四君子加
無黃脾胃虛甚者以四君子加無黃為主以前丸
爲佐

如聖丸

治冷熱痢

胡黃連 川黃連 白無黃炒各二兩五錢
真麝香五分另研 乾蝦蟆五箇酒浸拌青
史君子肉一兩

右爲末以蠟燭膏拌丸麻子大每服一二十九煎
人參湯下

薛已曰愚按前之爲患乃肝脾虛熱津液乾涸之
證前方乃專於治痢清熱之劑若脾胃虛弱者當
佐以六君子湯調補脾胃使邪氣退庶可收全功
也

蘭香散

治鼻疳赤爛 銅青 輕粉各五分
蘭香葉二錢燒灰

右爲末乾貼

白粉散

治諸疳瘡 海螵蛸二分 白芨一分 輕粉一分
右爲末先用藥水洗拭乾貼

薛已曰按前方治表之藥尚未愈用四味兜兒
丸以治其內

四味兜兒丸

治嘔吐不食腹脹成疳或作瀉不止食積脾弱日
生雲口舌生瘡牙根腐爛身熱壯熱身生瘡

小便活白膿大赤痢一切痢證
黃連炒 蘼蕪炒 神麝 麥芽炒各等分
右爲末糊丸梧子大每服一二十九空心白滾
湯下

蟾蜍丸

治無辜疳瘡一服瘡盡再服一服痢止三服萬病
愈

蟾蜍一枚夏月清渠中取喉大不曉不鳴身多蟻者
右取裏類一杓置桶中以尿浸之却將蟾蟄跌死
投與蛆食一晝夜用布包裹蛆蟄急流中宿取
出瓦上焙乾爲末麝香一字糯米飯丸麻子大
每服三十九丸飲下其效如神

燕翼散

治蟲動口內流涎

白燕翼 乾漆炒各等分

右爲末每服五六分米飲下
安蟲散

治蟲動心痛

胡椒炒黃 檳榔 川樛子 鶴虱各二錢
枯白礬二錢五分

右爲末每服五六分時米飲調下

薛已曰按蟲動之因多屬胃氣虛弱或開飲食氣
味而動前二方乃化蟲之劑若因脾胃虛弱者須
當調補中氣

大黃黃湯

治小兒脾弱少食發熱作瀉大便不調髮黃脫落
面黃瘦黃鼻下生瘡能乳嚙土等證

蕪蕪 山梗各五分 黃藥 甘草 黃連
防風各一分 麝香 羌活 柴胡各二分
白朮 茯苓 當歸各四分
右作 劑水煎

王肯堂曰前方治黃熱已甚爲熱爲濕當小便不
知今反利者知黃色爲濕脾經中人熱變黃脫落
知勝脫胃但受土邪乃濕熱之證耳下作瘡者土
逆行營氣伏火也龍氣者胃中有熱故也喜食土
者胃氣不足也面色黑者爲寒爲瀉大便青黑寒
褐色血黑色熱蓄血中問黃色腸胃有熱治法當
滋陰潤燥內除寒熱外收津液

秘旨補脾湯

治久病面黃肌瘦瘦瘦牙目微頰髮稀少誤藥所致
人參 白朮各一錢 白芍酒炒 白茯苓八分
陳皮 川芎各六分 炙甘草 黃芪蜜炙
當歸各四分酒洗

右每服二三錢食水煎

大黃煎

治小兒無辜因經癰癰或煩乾黃變或乍痢乍瘧
諸狀多者

大黃九兩細枝新實者老微切但不中用削去皮洗
節爲散以好米醋三升和置丸於大鍋內浮湯
上煮火慢燉候至成膏可置凡疳瘡中

右三歲兒一服七九粒十歲大日再服以下出青赤
膿爲度若不下或下少稍加丸若下多又須減
之病重者七八劑方盡根此藥性下宿膿不令兒
利也須禁食毒物乳母亦禁之一次水香一兩半

疳積黃連丸

小兒疳積連注通身瘡疥或潮熱肚脹作渴
豬肚一箇洗淨去黃連五兩切碎水和納入肚中縫
定放在五升糠米上蒸爛

右石白湯干研或入少飯同杵丸每服一
十九丸茶飲下仍服調血清心之藥佐之蓋小兒之
病不出於疳則由於熱常須識此

天麻丸

治小兒肝風疳積
青黛 黃連 天麻 五寶脂去石 夜明砂炒
用芎藭 蘆薈各一錢 龍腦草酒拌炒焦

防風 蟬蛻各一錢半 全蠍二箇 麝香少許
乾綿頭二錢炙

爲末猪膽汁浸糕丸如麻子大每服十九薄荷湯
下

一草散

治小兒疳積腹痛并赤眼腫痛
甘草 龍腦草酒炒 當歸 細辛各一錢

爲末三歲兒一錢水半盞砂炒少許煎三分食後
服

生熟地黃散

治小兒疳積腹脹開合不開蓋明畏日或生內障
生地黃一兩 熟地黃一兩 麥門冬去心半兩

當歸 枳殼米泔洗炒 防風 杏仁 甘草
赤芍藥各二錢半

爲末每服三錢黑豆七粒煎豆豉去粗服之
茯苓煨湯

治小兒易後而泄瘦瘠腹脹不利作驚聲目病
生醫建閉不開路淚如糊久而膿流俗謂之疳毒
眼

人參一分 柴胡四分 白朮 茯苓 蓮荷
炙草 蔓荊子 枳殼各二分 澤瀉分半
前胡 蒼朮 獨活 川芎各二分 羌活三分半

作一服水一盞煎至七分去滓稍熱服
右方爲小兒寒暑不調而膿成此證夫寒暑飲食
不節皆能傷脾胃脾胃陰虛之會元也故清湯

下而不升滯陰上而不降今以白朮人參先補脾
胃爲君柴胡甘草枳殼輔上藥補脾胃爲臣蒼朮

燥濕茯苓澤瀉導滯通陰下降爲佐然後以羌活獨
活防風蔓荊子前胡川芎澤瀉諸辛風藥以勝濕

引清陽上升爲使此正治神效之方也
升麻龍腦草飲子

升麻一錢 麻黃一錢半 炙草 穀精草
蛇退 鬱金各半錢 黃芩 羌活 龍腦草
青砂粉各三錢

爲細末每服一錢熱茶清濃調服
右方君以升麻足陽明胃足太陰脾也臣以羌活

麻黃風能勝濕也佐以甘草承和上下穀精草明
目退翳蛇退主小兒驚癇等疾使以青砂粉治疳

止利川芎金精血能調草藥眼中毒疾黃芩除上
熱目內赤連火炒妙如龍腦草性已苦寒熱重之

則又過於寒也
胡黃連丸

治疳病

胡黃連半錢去果糖 阿魏一錢半酢煮去肉橫
神鹽炒去食積 黃連各二錢半炒去熱積
麝香四釐

右爲末猪膽汁丸如黍米大每服一十九白湯
下

大肥兒丸

治脾胃飲食少思肌肉消瘦肚大頸細髮稀成瘰
項間結核發熱作渴精神倦怠便去酸臭愛食泥

土或口鼻頭瘡或肚兒青筋齒齙下痢便白五疳
即四味肥兒丸加乾糖一兩藥丸五錢

雄黃一錢另研 鬱金三錢 巴豆霜一錢
共爲末米糊丸如粟大

痰涎壅塞竹葉湯下
積滯茴香湯下

纏綿風白水化開此痰
蟲痛苦楝子根白皮湯下

瘰癧虎丹

治一切疳癪下痢證候全備及無辜疳毒如邪病
者

乾雄雞皮一箇微炒 蝸牛殼 藿香根 綻花
錢黃 麝香各一分 龍腦半分

右各爲末米醋煮糯米大每用粥麻湯下十
九日三服取效
肥兒丸

治疳多因飲食肉太早或患臟腑胃虛寒諸般

疳化蟲治黃瘦肚急泄瀉可常服之退疳熱

黃連局方加肉豆蔻 陳皮去白局方用木香

神蘇局方有史君子 麥芽各一兩局方加按不

白藥黃牛兩局方用檳榔 川樛子一兩去核炒

右為末神蘇局丸麻子大每服三十九粒空心米飲

吞下

又

三棱 蓬朮 川樛子 龍膽 黃連各四錢

柴胡 地骨皮各半兩 枳殼麩炒 麥芽

當歸各三錢 白藥麩一錢 蘆薈 木香各一錢

右為末神蘇局丸麻子大每服三十九粒空心米飲下

胡黃連丸

治嬰兒一切疳疾及一切虛弱他藥無功此藥極

效

胡黃連 川黃連 蘆薈 肉豆蔻煨 桂心

人參 珠砂 麝香 史君子 木香 鈞藤

龍齒 白茯苓各等分 右為末取猪膽兩枚製汁和末令勻却入瓷內

盛之以繩扎定湯煮半日取出切破瓷子更入瓦

若子二錢微炒黃丹一錢二味別研如粉入前藥

和勻搗五百杵為丸如紫豆大但是疳與痢用第

飲下五七丸功者三九不喫粥飲乳頭令吻能治

一十二種疳痢及無羣疳之證功效非常

吳希先疳方

治一切疳

三棱煨 蓬朮煨 神蘇炒 麥芽炒各半兩

青皮 陳皮 烏梅肉 蘇合仁 胡黃連

百草霜 雷丸各三錢 元胡索 甘草各二錢

巴豆霜 右為末合了先用一兩入巴豆五十粒丸麻子大

每服五七丸米湯下大小以意增減加川樛子史

君子亦可

地黃丸

治腎疳

熟地黃八錢 赤茯苓 山茱萸肉 當歸

川樛肉 丹皮 山藥 澤瀉 史君子各三錢

右為末蜜丸如桐子大每服三九溫水化下

生熟地黃湯

治疳眼閉合不開內有淚落

生地黃 熟地黃各半兩 川芎 赤茯苓

和麩炒 杏仁水浸去皮 川黃連 半夏麩

天麻 地骨皮 甘草炙 當歸各一錢半

右到碎每服二錢薑三片黑豆十五粒水一盞煎

至六分空心溫服

疳積丸

治疳極妙

山樛子青者多用 香附子 烏藥 紫金皮

砂仁 生薑各等分

右為末山樛子生用搗碎成末糊丸桐子大米

飲下三五十丸大人小兒皆可服

疳疳散

治疳

蘆薈 川黃連各一錢 瓜蒂 猪牙皂角

煨 連衣各半兩 麝香少許

右末吹入鼻內嚏出可瘳

疳疳丸

治五疳熱肚腹發熱

胡黃連 五靈脂

右為末煨猪膽汁九麻子大每服十五丸米飲下

五疳熱慎勿用大黃黃本

五疳良方

川黃連 蘇合仁 神蘇炒 麥芽炒 陳皮

木香 蝦蟇灰各一兩 史君子三十個煨去殼

生肉豆蔻二箇 雞心橫斷二箇 麝香一字

右為細末雄猪膽二個取汁入好酒打清糊桐丸

芥子大每服十五丸米飲下

茯苓丸

治心疳與驚疳

茯苓 蘆薈 琥珀煨 黃連淨 赤茯苓

釣藤皮 連志肉置製焙乾 蝦蟇灰各二錢

石白礬一錢 麝香少許

右為末粟米丸麻子大每服十九粒薄荷湯下

神效換乳丸

治小兒胃疳肌瘦潮熱盜汗飲食易傷臟腑不調

泄瀉精拍不化頭大腹急

川黃連炒 鹽甲酒炙 肉豆蔻煨 史君子

神蘇炒 麥芽炒各半兩 鼠麝香另研半錢

阿膠一錢半

右為末細糊丸如芥子大米湯下鹽大小加減

地黃清肺湯

治肺癆疳積咳嗽氣逆多喘壯熱惡寒

桑白皮炒半兩 紫蘇 前胡 防風 赤茯苓

黃芩 天門冬去心 當歸 連翹 桔梗

生地黃 麥甘草各一錢五分

右剉每服一錢水煎食後服

重胎丸

治界有食疳

白豆蔻 麥芽炒 五靈脂 細砂仁 蓬木根

青皮 史君子 橘紅 蝦蟇炙各二錢

右為末糊丸每服十丸每服十九丸米湯下

下蟲丸

治疳積諸蟲

苦楝根皮酒洗焙 綠砂仁 木香 蘇黃焙

桃仁 檳榔各二錢 鴨虱炒 輕粉各半錢

乾蝦蟇炙各三錢 史君子二十箇微取肉

右為末飛羅網九麻子大每服二十丸天明清肉

汁下

治骨節痠痛勞加當歸川黃連各二錢半

龍腦丸

治腦疳熱餅香

龍腦草 川升麻 苦楝根皮 赤茯苓 蘆香

防風 油髮炙各一錢 青黛 黃連等各二錢

右為末指麝香汁浸研九麻子大每服二十丸薄荷

湯下食後仍以蘆香末入鼻

香冠丸

治疳瀉

黃連三錢炒 生肉豆蔻 木香 訶子煨

砂仁 茯苓各一錢

右為末糊丸每服十丸每服十五丸食前米飲下

木香丸

治疳積冷熱不調五色雜下裏急後重

黃連淨二錢 木香 紫厚朴薑汁炒 砂仁

夜明砂隔紙炒各二錢 訶子肉一錢半

右為末梗米飯九麻子大每服十五丸乾艾葉生

薑煎湯食前服

利九子

治疳疔腫脹

黃連子炒一兩 陳皮 青皮去白 檳榔

黑牽牛取淨半生半炒 五靈脂 赤茯苓

蓬木煨各半兩 木香一錢半

右為末糊丸如薤豆大每服十五丸黃蘇葉白

湯送下

黃芩湯

治疳疔咳嗽不足虛汗骨蒸潮而復瀉乳食遲遲

而不化

黃芩蜜炙 當歸 川芎 白芍藥 生地黃

蝦蟇去足炙焦 鹽中研炙焦各二錢 人參

白茯苓 陳皮 半夏麴 柴胡 史君子

甘草炙各一錢

右剉散每服二錢薑棗煎食前服

龍血酒

治疳勞

白薑炙 柴胡 川芎各一兩 人參半兩

史君子一兩 胡黃連 川黃連各一兩

右用龍血一盞炙焦更一兩拌和 黃連淹一宿

次早砂乾搗出炭灰煎血只用一連同餘藥末

米飯糊九麻子大每服二十丸食前服

訶蟻丸

治無事諸疳一服虛熱退二服煩渴止三服瀉痢

住

蟾蜍一枚夏月漬菜中取腹大不跳不鳴其身土

瘰癧者 胡黃連一錢

右取蠶豆一粒置桶中以尿浸之桶上蓋紙不與

蟲走却將蟾蜍打破頓在蟲中任其蟲食一日

一夜次以新布袋包裹定置之盆流水中浸一宿取

出瓦上焙乾其為末人磨一字研勻搗微糊丸麻

子大每服二十丸米飲下

君村丸

治小兒諸疳小便白濁久則黃瘦不長肌肉

史君子煨 厚朴炙 黃連各一兩 木香三錢

右為末糊丸如小豆大三歲二十九丸米湯下三五

服效

紫霜丸

治小兒因母復胎致有痰涎氣喘白痰喘

代諸石散研七次 赤石脂研末各一兩

杏仁去皮尖 巴霜去油各五十枚

右先將杏仁巴霜入乳鉢內細研如膏却入代諸

石脂末研勻以湯浸蒸餅為丸如粟米大一錢服

五丸米飲吞下二百內兒三九丸下更五

量其虛實加減減利為度此藥兼治驚風痰厥

下不致虛人

益黃散

治小兒吐瀉脾虛不食水穀不化困倦方少滑腸

夜起并疳虛泄并治涎唾流出

陳皮一兩 丁香二錢 一用木香 訶子炮去核

青皮去穢 甘草炙各半兩

右為末每服二錢水一盞煎三分食前服

消乳丸

砂仁 橘皮 三棱炒 蓬木炒 神麝炒

麥芽炒各半兩 香附炒一兩

右為末麵糊丸麻子大食後白湯送下

認諸湯

治小兒因乳母復受胎孕令兒漸漸消瘦骨立毛

豎黃成瘰癧名曰懸痼此方大效

龍腦草 釣藤鈎 柴胡 黃芩 白芍藥

茯苓 生甘草各半兩 蜈蚣一枚去翅足炙

大黃根二錢半

右剉散每服二錢水一盞煎半盞服之以漸加服

得利即止

直指方加防風麥門冬以導心熱黃芩減半北棗

煎服去燒蜈蚣亦可

十全丹

治丁癰瘡

青皮 陳皮 川芎 五靈脂 蓬木 白豆蔻

檳榔 盧薔各半兩 史君子焙 蝦蟇炙

水香各三錢

右為末豬膽汁浸麝香丸麻子大每二十丸來飲

有熱清肝湯下

又

治丁癰瘡

檳榔 枳殼炒 青皮 陳皮 三棱煨

蓬木煨 砂仁炒各半兩 丁香二錢五分

木香二錢 香附一兩炒

右為末神麝糊生黍米大空心食前下一百丸

消食丸

治小兒乳哺飲食取冷過度冷氣積於脾胃胃為

水穀之海脾氣磨而消之胃氣調和則乳哺消化

脾胃於冷則宿食不消此藥寬中快氣消乳食正

頭香

縮砂仁 橘皮 三棱煨 蓬木煨 神麝炒

麥芽炒各五錢 香附炒一兩

右為末麝香糊丸麻子大食後白湯送下二十丸

龍耳丸

治小兒無辜疳腹中痞氣四肢羸弱

龜甲酥炙炙令黃去裙襖 黃連 枳殼炒

夜明沙微炒各一兩 訶梨粉二枚 生一熟

麝香一字 蠟虎一枚微炙

右為末煉蜜丸如棗豆大每以粥飲下五九日三

服量兒大小加減服之

蓬羅丸

治小兒疳積勞熱潮熱盜汗瘦弱腹急面黃食不

生肌肉日夜啼多渴少食

黃連二兩 檳榔 蓬薔各半兩 柴胡 秦艽

知母 丹參 史君子去殼一兩

右為末黃連一雙斤餘鹽之專以火麻子何

之至五日後去毛令淨於背上升孔去腸肚淨拭

乾令前藥入雞腹內以線縫之小瓶先以黑豆鋪

乾底厚二寸安雞在瓶中西旁將黑豆圍裹上以

黑豆蓋之自日出至晚低溫冷取雞淨肉研和

得所如硬入酒麝糊同藥末為丸如小豆大二歲

二十九以意加減米湯下無時如十五歲以溫酒

送下忌食豬肉雞鵝肉

黃雞煎丸

柴胡 知母 秦艽 川棟炒 宣連各一兩

胡連 蘆薈 砂仁 蓬木 檳榔 丹參

川芎 神麝 麥芽炒 青皮 五靈脂各半兩

史君子肉一兩半 水銀粉一錢 麻子五兩

黑豆五升

右藥依前方修合

梅雨丸

治小兒諸疳積渴飲水不止

龍腦草 定粉 烏梅肉炒 黃連各等分

右為末煉蜜丸每服一十九丸溫水送下

竹葉湯

治傷寒裏虛及諸煩不安

石膏二兩 半夏四錢 人參 甘草各二錢

麥門冬六錢

右剉散每服一錢水一盞青竹葉生薑各四片梗

米七十粒同煎

極加竹葉生薑

四君子湯