

欽定四庫全書

子部

醫壘元戎卷七



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院八品吏目臣黃發

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

醫壘元戎卷七

明 王好古 撰

太陰證 先足經從湯液 後手經從襍例

仲景理中例

仲景理中湯

主治 傷寒論 方經

并

人參 白朮 乾薑 甘草

後本經加減八法 鍾氏派乾薑為溫中丸 仲景

甘草乾薑湯 仲景治霍亂改理中丸活人枳實理

中丸 局方消飲丸 理中湯去人參加茯苓為調

中丸亦為調中湯 並見陰陽論 桂枝湯解表四逆湯

溫裏 仲景加桂為人參桂枝湯 活人加青陳皮

治胞膈病名和中湯 許學士蜜和此六味為補脾

丸 虛則補其母未有子富而母貧者也

脾者太陰濕土脾不足陰濕之劑以補之如何用乾
薑白朮以燥之是反泄濕也如何是補脾 海藏云

黃芪湯加減陰證論與四物各半湯補氣血本方言
丸不及湯海藏云大便溲者宜湯大便結者宜丸以
其腸胃燥濕不同也 如何仲景用丸以治霍亂泄
瀉理中去參加朴為和中湯

衍義云今人使理中湯倉卒之間多不効者何也是
不知仲景之意為必效之藥蓋用藥之人自有差殊
耳如治胸痺心下痞堅氣結胸滿脅下逆氣搶心理
中湯主之人參白朮乾薑甘草四物等共十二兩水

八升煮取三升每服一升三服以和為度或作丸須
雞子黃大皆可奇效今人使一丸如楊梅許服之病
既不去乃曰藥不神非藥之罪用藥之罪也今引以
為例他可效此然年高及素虛人當逐宜加減甘草
飲冷傷胃吐血以理中湯理治中脘分利陰陽安
定血脉只用本方並無血藥在王氏易簡條下楊氏
飲冷瀉血服對金散止亦理中脘分利陰陽安定血
脉之意也飲冷酒過多啖炙煖熱食發衄者理中湯

一料加川芎一兩服之平昔素不飲冷者梔子黃芩
湯之類 海藏云楊師三朝三大醉至醒發大渴飲
冷水三巨杯次又飲冰茶三碗後病便鮮血四次約
一盆先以吳茱萸丸翌日又與平胃五苓各半散三
大服血止復白痢又與神應丸四服白痢乃止其安
如故或問曰何為不用黃連之類以解毒所用者濕
熱之劑予曰若用寒藥其疾大變難療寒毒內傷復
用寒藥非其治也況血為寒所凝浸入大腸間而便

下得溫乃行所以用濕熱其血自止經云治本病必求其本此之謂也胃既溫其血不凝而自行各守其鄉也

衍義云有一男子暑月患血痢醫妄用以涼藥逆治專用黃連阿膠木香治之此藥始感便治則可今病久腸虛理不可服踰旬不幾至委頓故曰理當別藥知是論之誠在醫之通變矣循經則萬無一失引此為例餘皆倣此 海藏云暑月久血痢不用黃連陰在

內也

王氏易簡理中湯

治脾胃不和飲食減少短氣虛羸而復嘔逆或大病
之後胸中有寒時喜咳唾霍亂之後氣虛未禁熱藥
並宜服之

人參

一兩

乾薑

一兩

白朮

一兩

甘草

一兩

右呖咀每服四錢水一盞煎至六分服為寒氣濕氣
所中者加附子一兩名附子理中湯霍亂吐瀉者加

橘紅青橘各一兩名治中湯乾霍亂心腹作痛先以鹽湯少許頓服候吐出令透即進此藥

嘔吐者於治中湯內加丁香半夏一兩每服生薑十片煎泄瀉者加橘紅茯苓各一兩名補中湯

溏泄不已者於補中湯內更加附子二兩不喜飲水穀不化者再加硝砂仁一兩共成八味 若霍亂吐

下心腹作痛手足逆冷於本方中去白朮加熟附子名四順湯若傷寒結胸先以桔梗枳殼等分煎服不

愈者及諸吐利後胸痞欲絕心膈高起急痛手不可
近者加枳實茯苓各一兩名枳實理中湯 若渴者
再於枳實理中湯內加桔萸根一兩 一法霍亂後
轉筋者理中湯加火煨石膏一兩 一臍上築者腎
氣動也去朮加官桂一兩半醫恐燥故去朮恐作奔
豚故加官桂 悸多者加茯苓一兩 渴欲飲水者
添加朮半兩 若寒者添加乾薑半兩 腹滿去朮
加附子一兩 一法治飲酒過多及啖炙煖熱食發

為鼻衄加川芎一两 一法專治傷胃吐血以此藥
能理中脘分利陰陽安定血脉只用本方 中附子
毒者亦用本方 或止用甘草乾薑等分煎服仍以
烏豈煎湯解之

韓氏溫中篇

夫傷寒病之說始自皇帝以開其端由至於仲景方
陳其條目自後膚淺之學莫知其數立言者云病在
表可發汗病在裏可下之或云不可汗不可下即未

嘗有溫中之說仲景傷寒論傷寒例云尺寸俱沉細
太陰受病也尺寸俱沉少陰受病也尺寸俱微緩厥
陰受病也又辨太陰證云太陰病脉浮可發汗宜桂
枝湯又自利不渴宜四逆湯又腹滿時痛桂枝芍藥
湯辨少陰證云始得之發熱脉沉麻黃細辛附子湯
又少陰病二三日麻黃附子甘草湯又少陰病身體
痛手足寒骨節痛脉沉附子湯又少陰病吐利手足
厥逆冷煩燥欲死吳茱萸湯又少陰病脉沉急溫之

宜四逆湯今舉仲景論中數條最是治三陰之良法
於今世用之尚有未盡證者愚嘗校量自至和初歲
迄於今三十餘年不以歲之太過不及每夏至以前
有病傷寒人十中七八兩手脉俱沉細數多是胸隔
滿悶或嘔逆或氣寒或腹鳴或腹痛與仲景三陰病
之說脉理同而證不同因茲豈敢妄投仲景治三陰
病藥醫者方見脉沉及胸滿便投藥下之往往不救
嘗斟酌仲景理中丸與服之其病勢輕者即胸中便

快病勢重者半日許滿悶依然或有病人脉沉細遲
投仲景四逆湯溫之多藥力大熱後必發煩躁因校
量此形證今別立方以治之多得病不可不傳焉

病人但两手脉沉細數或有力或無力或關脉短及
力小胸膈塞閉氣短不能相接者便可隨脉證投溫
中藥以治之

病人两手脉沉遲或緊或緩皆為胸中寒也若寸脉
短及力小於關尺者此是陰盛陽虛也或胸膈滿悶

腹中脹痛身體拘急手足逆冷宜急溫之若立春以後至清明以前宜溫中湯主之清明以後至芒種以前宜橘皮湯主之芒種以後立秋以前宜七物理中丸主之

溫中湯方

舶上丁香皮

一兩

乾薑

炮二分

白朮

二分

陳橘皮

二分

丁香

二分

厚朴

薑炙去粗皮一兩

右咬咀每服二錢水一盞入葱白三寸荊芥五穗煎

至七分去滓熱服如三兩服未快尚手足逆冷嘔吐
更加舶上丁香皮二分乾薑二分炮

橘皮湯 七物理中湯 厚朴丸 白朮湯

橘葉湯 以上五方並見韓氏微旨及陰證論

仲景七物厚朴湯

厚朴 半斤 甘草 二兩 大黃 二兩 大枳實 五枚

生薑 二兩 大棗 十枚 桂 二兩

右水一斗煎取四升去滓溫服八合日三嘔者加半