

欽定四庫全書

子部

金匱鈞玄卷三



南京中医药大学图书馆版权所

詳校官太醫院八品吏目員黃發

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

金匱鈎玄

元 朱震亨 撰



經水經候通期而作疼者

經水不通則血無所歸而

經作疼來而作疼者血實

虛中有熱所以作疼

加黃連

林仁

香附

黃連

過期乃血少也

川芎 當歸 帶人參白朮與痰藥

過期紫黑色有塊血熱也必作痛

四物湯加 黃連 香附

淡色過期者乃痰多也

二陳湯加 川芎 當歸

紫色成塊者乃是熱也四物湯加黃連之類

痰多占住血海地位因而下多者目必漸昏肥人如

此

南星 蒼朮 香附 川芎 作丸服

肥人不及日數而多者痰多血虛有熱前方加黃連

白朮若血枯經閉者四物湯加桃仁紅花

軀肥脂滿經閉者導痰湯加芎連不可服地黃泥鬲

故也如用以生薑汁炒

血崩

崩之為病乃血之大下豈可為寒但血去後其人必

金匱要略 卷三
虛當大補氣血

東垣有治法但不言熱其主於寒學者宜再思之

急則治其標白芷湯調百草霜

甚者棕櫚皮灰後用四物湯加乾薑調理

因勞者用參芪帶升補藥

因寒者加乾薑 因熱者加黃芩參芪

崩過多者先服五靈脂末一服當分寒熱五靈脂能

行能止婦人血崩用白芷香附為丸

白帶用椒目末又用白芷末

一方用生狗頭骨燒灰存性或酒調服或入藥服之
又方用五靈脂半生半熟為末以酒調服

氣虛血虛者皆於四物湯加人參黃芪

漏下乃熱而虛者四物湯加黃連

帶下赤白 赤屬血 白屬氣 主治燥濕為先

帶漏俱是胃中痰積流下滲入膀胱宜升無人知此

肥人多是濕痰

海石 半夏 南星 蒼朮 川芎 椿皮

黃柏

瘦人帶病如有帶者是熱也

黃柏 滑石 川芎 椿皮 海石

甚者上必用吐以提其氣下用二陳湯加蒼朮白朮
仍用丸子 一本作瓦龍子

又云赤白帶皆屬於熱出於大腸小腸之分

一方黃荆子炒焦為末米飲湯下治白帶亦治心痛

羅先生治法或十棗湯或神祐丸或玉燭散皆可用
不可峻攻實者可用此法虛則不宜

血虛者加減四物湯

氣虛者以參术陳皮間與之

濕甚者用固腸丸

相火動者於諸藥中加少炒柏

滑者加龍骨赤石脂

滯者加葵花性燥者加黃連

寒月少入薑附臨機應變必須斷厚味

又方用

良薑 茵藥 黃柏二錢各燒灰 入椿樹皮末一兩半

右為末粥為丸每服三四十丸

痰氣帶下者

蒼术 香附 滑石 蛤粉 半夏 紫芩

婦人上有頭風鼻涕下有白帶

南星 蒼术 黃柏炒 滑石 半夏 川芎

辛夷 牡蠣粉 炒 茯苓

白帶無痛風

半夏 茯苓 川芎 陳皮 甘草 蒼朮
浸炒

南星 牛膝
酒洗黃柏
乾炒

子嗣

肥盛婦人不能孕育者以其身中脂膜閉塞子宮而致經事不能行可用導痰湯之類

瘦怯婦人不能孕育者以子宮無血精氣不聚故也

可用四物湯養血養陰等藥

產前胎動

孕婦人因火動胎逆上作喘者急用條黃芩香附之
類將條芩更於水中沉取重者用之

固胎

地黃半錢人參一錢白芍各一錢白术一錢川芎半錢

歸身尾一錢半陳皮一錢甘草二錢糯米十四粒

黃連些少黃柏些少桑上羊兒藤七葉完者

右㕮咀煎湯服之

血虛不安者用阿膠 痛者縮砂行氣故也
一切病不可表

惡阻 從痰治

戴云惡阻者謂婦人有孕惡心阻其飲食者是也

肥者有痰瘦者有熱多用二陳湯

或白术為末水丸隨所好或湯或水下

婦人懷妊愛物乃一藏之虛假如肝藏虛其肝氣止

能生胎無餘物也

血塊死血食積痰飲成塊在兩脇動作腹鳴嘈雜肢

暈身熱時作時止

黃連

一兩一半用茱萸炒去茱萸一半益智炒去益智

山梔

半兩炒

台芎

半兩重便浸

蘿蔔子

一兩半炒

山查

一兩

三稜

青皮

神麃

各半兩

莪术

半兩用米醋煮

桃仁

半兩留尖去皮

白芥子

一兩半炒

瓦龍子

消血塊

為末作

丸子服之

一婦人血塊如盤有孕難服峻削

香附

四兩
醋煮 桃仁一兩去皮尖

海石

二兩
醋煮

白术一兩為末

神麴為丸

束胎

束胎丸第八箇月服

黃芩

酒炒夏用一兩秋用七錢半冬用半兩

茯苓

七錢半

陳皮

二兩
忌火

白术

二兩
粥為丸

束胎散即達生散

人參半錢陳皮半錢白术 白芍 歸身尾各一錢

甘草炙二錢大腹皮三錢紫蘇半錢

或加枳殼砂仁作一貼入青葱五葉黃楊木葉稍十
箇煎待於八九箇月服十數貼甚得力或夏加黃
芩冬不必加春加川芎或有別證以意消息

第九箇月服

黃芩一兩酒炒宜熱藥不宜涼藥怯弱人減半
白术一兩枳殼七錢炒

滑石七錢半臨月十日前小便多時減此一味

右為末粥為丸如梧桐子大每服三十丸空心熱
湯下不可多恐損元氣

安胎

白术 黄芩 炒麵 粥為丸

黃芩安胎乃上中二焦藥能降火下行

縮砂安胎治痛行氣故也

益母草即茺蔚子治產前產後諸病能行血養血難

產作膏 地黃膏 牛膝膏