

痘疹經驗集

下

痘疹經驗集卷三目錄

面部吉凶圖

十二經絡

驗出痘之由

看痘法

一日至三日看法

四日至六日看法

七日至九日看法

十日至十二日看法

首尾看法

惡症不治訣

看痘訣

痘形面圖說

部位論

異痘四種

胭脂塗法

油胭脂法

升天散

二抱鼻

三鎖口

四鎖項

腎經吉凶辨

活血散

水楊柳湯

又詳附異痘三十五症

悶痘

蛇皮

麩皮

壘黍

鐵葉

蚊咬

蚤跡

覆釜

托腮

板黃

鵝口

蛛蛛

泡母

鎖喉

蚕佈

垂珠

破黃

白虎唇

蟻窠

通幽散

四聖膏

萍痕

插臂

駢脇

毡背

雙鎖口

外鎖口

鵝頭

鱗坐

絕穀

鋪胸

圍臍

掛腿

單鎖口

魚嘔嘴

舌尖黑點

青遮口角

治痘雜症十五種

夾班丹

元參升麻湯

夾麻疹

倒靨

痘癢

肉脹

參歸湯

發疔

四聖膏

痘癰

大連翹飲

三豆散

臭爛

生肌散

衄血

髮灰散

清肺湯

水泡

口瘡

清上飲

參麥清補湯

赴筵散

失音

千金內托散

喉腫

利喉湯

玉頤匙

蒼木

目疾

清毒撥雲湯

又治痘後障翳

防小兒痘疹入





痘疹經驗集卷三

古桃韓文博配坤氏輯

元孫雲綺校字

驗出痘之由

呵欠頓悶煩燥口渴臥而驚悸手足稍冷面燥腮赤身似  
戰動重則謔語作搐口舌燥絞舌咬唇舌舒昏沉不省人  
事又發熱一日至三日睡時多驚醒時多戰焦燥啼哭見  
此數者必爲出痘無疑用藥卽將水飛硃砂五分併以升

解散去升麻徐服一劑如大便泄出硃砂有痰涎之狀其毒解矣而痘出必快。

看痘法

初必先以紅帖疊爲紙捲香油浸燃之斜照膚內看其虛實稀稠。

一日至三日看法

此時心氣用事用藥宜清心勻氣利小便帶發散解痘毒至兩日之後急求退熱退至三日須望嚏噴早來使毒盡

發皮膚之上。頭面稀眼無者輕。亦有稠多而顆粒明朗。色道鮮明者吉。雖用藥不過三五劑。若熱兩日出者。其痘較前多一倍。藥須多服。更審壯弱施治。若熱一日。或一日半出者。凶多吉少。但亦看色道如何。如不赤不燥。聲音清亮。無咳嗽。身熱早退。急速用藥調理。若遂熱遂出。其症凶危。雖用藥調治。不能收功。

亦有初熱即帶驚悸。不省人事者。俗名曰抽癎。此症多由驚赫而得。治方當祛風鎮驚。理痰平肝解毒爲要。

四日至六日看法

此時肝氣用事。用藥宜升提解毒。平肝養氣和血。若發熱三日出者。此時肥滿光潤。不必服藥。若一日一日半。或二日熱出者。至此亦當起發。如欠充滿頂陷窩。須急用藥治之。毒盛則升提解毒。如虛則調和氣血。若兼深赤。色無光澤。有痰嗽有喘。乃火毒太盛。施治凶多吉少。

七日至九日看法

此時肺氣用事。正灌膿漿。根下紅線緊緊附載。色道光澤。

如珠硬手。聲音洪亮。此乃薰蒸灌漿之兆。飲食如常。大便固秘。不必服藥。須時常隄防。若忽然腹鳴撒惡便頻。夜煩不睡。作痒。聲音漸軟。須用溫中養氣之劑調理。如大補湯。白朮散。十宣散。俱可選用。然亦要看毒之散否。如所瀉有青紫紅黑等色。膿痰皮痂等物。乃毒從便出。亦不足畏。不必用大補固脾。以敵毒氣停滯。仍宜活血消毒。

十日至十二日看法

此時脾氣用事。若飲食如常。收痂如常。不須服藥。凡有別

症見後隨症調理。

首尾看法

痘首尾十四日爲完。其所以成就者。乃在五六七日間。使氣盈血附。毒化成膿。可保萬全。倘氣陷血衰。毒內伏不成。漿者不治。

或氣離血散。不能制毒而外剝。則有變壞之症。間有收靨後。忽而斃者。以毒未出也。

大抵五六七日之際。痘之虛實。要辨毒之輕重。又或在於

何經要明。然後用藥。心有主宰。或爲勻和氣血。或爲解散汗下。庶鮮遺悔。

惡症不治訣

初出頂陷。連肉紅。遲至九日一場空。又如血點帶紫色。痲症死在六日中。發痲黑者在朝。夕痲青頃刻去匆匆。無膿痒塌期二日。不治腰痛及高胸。痘根密麻如囚困。舌卷囊縮命當終。紫泡刺出黑血死。飲食挫喉症亦凶。難療面腫痘不腫。青紫色陷痘無膿。二便滑利下腸垢。更有吐瀉出

蛔虫。頭溫足冷。渴飲水。痘先驚後藥無功。氣促泄瀉吐不止。目閉無魂。毒已攻。聲啞或因叫與哭。痘色不好也。須終有腫氣急亦不治。卽灌膿滿亦傷風。毒滿咽喉嗽失音。咬牙時復戰無停。身溫腹脹多痰喘。煩燥無寧命必傾。難治痘瘡一片白。不思飲食昏沉沉。賊痘灌膿醫不識。誰知毒自內攻心。灰白痘中疔。決有遲穿筋骨去幽冥。此痘莫勞虛用藥。醫家詳察要分明。

看痘訣