

血證論五卷

四川彭縣容川唐宗海著

瘀血

吐衄便漏其血無不離經。凡係離經之血。與榮養周身之血已睽絕而不合。其已入胃中者。聽其吐下可也。其在經脈中而未入於胃者。急宜用藥消除。或化從小便出。或逐從大便出。務使不留。則無餘邪爲患。此血在身。不能加於好血。而反阻新血之化機。故凡血證總以去瘀爲要。世謂血塊爲瘀。清血非瘀。黑色爲瘀。鮮血非瘀。此論不確。蓋血初離經。清血也。鮮血也。然既是離經之血。雖清

血鮮血亦是瘀血。離經既久則其血變作紫血。譬如皮膚被杖。血初被傷。其色紅腫。可知血初離經。仍是鮮血。被杖數日。色變青黑。可知離經既久。其血變作紫黑也。此血在經絡之中。雖已紫黑。仍是清血。非血塊也。是以能隨氣運行走入腸胃。吐下而出。設在經絡之中。卽是血塊。如何能走入腸胃耶。至於血塊。乃血入腸胃。停留片時。立卽凝結。觀宰割猪羊。滴血盆中。卽時凝結。便可知矣。故凡吐衄。無論清疑鮮黑。總以去瘀爲先。且既有瘀血。便有瘀血之證。醫者按證治之。無庸畏阻。瘀血攻心。心痛頭暈。神氣昏迷。不省人事。無論產婦及吐衄家。有此證者。乃爲危候。急降其血。而保其心。用歸芎失笑散加虎珀硃砂。射香治之。或歸芎湯調血竭乳香。

未藥亦佳。

瘀血柴肺欬逆喘促。鼻起烟煤。口目黑色。用參蘇引保肺去瘀。此皆危急之候。凡吐血卽時斃命者。多是瘀血乘肺壅塞氣道。肺虛氣促者。此方最穩。若肺實氣塞者。不須再補其肺。但去其瘀。使氣不阻塞。斯得生矣。葶藶大棗湯加蘇木蒲黃五靈脂童便治之。瘀血在經絡臟腑之間。則周身作痛。以其堵塞氣之往來。故滯碍而痛。所謂痛則不通也。佛手散加桃仁紅花血通續斷秦苒柴胡竹茹甘草酒引。或用小柴胡加歸芍丹皮桃仁荆芥尤通治內外之瘀。方義較穩。

瘀血在上焦。或髮脫不生。或背膊胸膈頑硬刺痛。目不了了。通竅

山言
卷五
活血湯治之。小柴胡湯加歸芍。桃仁。紅花。大薊。亦治之。

瘀血在中焦。則腹痛脇痛。腰臍間刺痛。着滯。血府逐瘀湯治之。小柴胡湯加香附。薑黃。桃仁。酒軍。亦治之。

瘀血在下焦。則季脇少腹脹滿刺痛。大便黑色。失笑散加醋軍。桃仁治之。膈下逐瘀湯亦穩。

瘀血在裡。則口渴。所以然者。血與氣本不相離。內有瘀血。故氣不得通。不能載水津上升。是以發渴。名曰血渴。瘀血去則不渴矣。四物湯加桃仁。丹皮。蒲黃。三七。花粉。雲苓。枳殼。甘草。小柴胡湯加桃仁。丹皮。牛膝。皆治之。溫經湯以溫藥去瘀。乃能治積久之瘀。數方皆在酌宜而用。

瘀血在腠理則榮衛不和發熱惡寒。腠理在半表半裏之間爲氣血往來之路。瘀血在此傷榮氣則惡寒傷衛氣則惡熱。是以寒熱如瘧之狀。小柴胡湯加桃仁紅花當歸荊芥治之。

瘀血在肌肉則翕翕發熱自汗盜汗肌肉爲陽明所主以陽明之燥氣而瘀血相蒸鬱故其證象白虎。犀骨地黃湯加桃仁紅花治之。血府逐瘀湯加醋炒大黃亦治之。

瘀血在經絡臟腑之間則結爲癥瘕。瘕者或聚或散氣爲血滯則聚而成形血隨氣散則沒而不見。方其既聚宜以散氣爲解血之法。九氣丸主之。在胸膈上者加桔梗枳殼瓜蒌生薑甘草。在右者加蘇子桑皮陳皮。在左者加青皮牡蠣當歸。在中焦大腹者加厚

朴枳壳防己白芍甘草在小腹下者加橘核小茴荔枝核檳榔川棟子靈脂氣散則血隨而散自不至於結聚矣至其既散之後則又恐其復聚宜以調血爲和氣之法此時瘕氣既散處於血分之中但一調血則氣自和而不復聚矣逍遙散加丹皮香附治之歸脾湯加柴胡鬱金子亦治之癥者常聚不散血多氣少氣不勝血故不散或純是血質或血中裹水或血積既久亦能化爲痰水水卽氣也癥之爲病總是氣與血膠轕而成須破血行氣以推除之元惡大憝萬無姑容卽虛人久積不便攻治者亦宜攻補兼施以求克敵攻血質宜抵當湯下瘀血湯代抵當丸攻痰水宜十棗湯若水血兼攻則宜大黃甘遂湯或秘方化滯丸外治法卽觀音救苦膏

瘀血在經絡臟腑之間。與氣相戰鬪。則鬱蒸腐化。而變爲膿。昇詳吐膿。便膿瘡。膿門。茲不再贅。

瘀血在經絡臟腑之間。被氣火煎熬。則爲乾血。氣者腎中之陽。陰虛陽亢。則其氣土合。心火是以氣盛。卽是火盛。瘀血凝滯。爲火氣所薰。則爲乾血。其證必見骨蒸癆熱。肌膚甲錯。皮起癰屑。名爲乾血癆。病至此者。十治二三。仲景大黃廬蟲丸治之。蓋旣係乾血。便與氣化隔絕。非尋常行血之品所能治也。故用諸蟲。啗血之物。以銷蝕乾血。瘀血不去。新血自無生機。况是乾血不去。則新血斷無生理。故此時雖諸虛畢見。總以去乾血爲主也。如膽識不及。可以滋補之藥送下。此丸亦調停之一術。

瘀血在經絡臟腑之間。被風氣變化。則生癆蟲。氣者腎水之所。也。故氣動。卽爲濕風者。肝陽之所生也。故風動。卽爲熱濕蒸熱。將瘀血變化爲蟲。是爲癆蟲。此猶之草腐爲螢。穀飛爲蟲也。其辨法。面色乍赤。乍白。乍青。乍黃。唇口生瘡。聲嗄咽癢。煩夢不甯。遺精白濁。髮焦舌燥。寒熱盜汗。口出穢氣。不知香味。喜見人過。常懷忿怒。夢見亡失。驚悸欬逆。或腹中有塊。或腦後兩邊有小結核。或食豆而香。又用乳香薰其手背。怕覆手心。須臾毛長至寸許。每日平旦精神尙好。日午向後。四支微熱。面無顏色。皆是癆蟲之候也。月華丸主之。多食鰻魚肉。既有滋補。又善殺癆蟲。或用鰻魚骨燒黑。鱉甲炒爲末。煎人參當歸白芍白薇湯送下。補虛殺蟲。相輔而行。

若專事殺蟲。金蟾丸亦可間服。金線蛙燒服亦妙。黑貓殺取肝。焙乾爲末。月初五更空心服。大能殺除癆蟲。可代獺肝。獺爪爲末。酒下。癆蟲居肺葉間。咯血聲嘶者。皆能治之。

癆蟲乃血化之蟲。最爲靈異。其人死後。蟲爲妖孽。傳染家人。爲傳尸。癆殺三人者。其蟲不治。傳尸之證。與其所感之病人無異。金鑑謂宜服傳尸將軍丸。方載丹溪心法中。今查丹溪心法不載此方。然以將軍名丸。其主用大黃。可知夫傳尸蟲孽。襲染人身。亟宜除去。故王攻下。亦如仲景攻乾血法。以免留邪爲患也。此蟲一傳人身。便能聚積。人身之血。以爲窠囊。食息生。百變化無窮。吾謂可用移尸滅怪湯。殺其蟲而奪其血。斯無遺留之邪矣。

以上二證。大便不澀泄者。尚可攻治。澀泄者。不能任藥。必死。

蓄血

蓄血者。或傷寒傳經之邪。或瘟疫時氣之邪。傳於血室之中。致周身之血。皆爲邪所招致。而蓄聚胞中。小腹脹痛。其人或寒或熱。晝日明了。夜則譫語。甚則發狂。呼叫打罵。內經所謂血在上喜忘。血在下如狂是也。癰犬咬傷。毒聚胞中。故令發狂。皆屬蓄血之證。仲景抵當湯治之。桃仁承氣湯亦治之。若膽識不反。可用隔下逐瘀湯。加大黃。若血未結。但是熱入血室。夜則譫語。用小柴胡湯加仁丹皮治之。

血臍

血腫

血臍之證脇滿小腹脹滿身上有血絲縷煩燥漱水小便赤大便黑腹上青筋是也醫書俱云是婦人之病惟喻嘉言謂男子恆有之面色痿黃有蟹爪紋路脈雖虛極而步履如故多怒善忘口燥便秘脇脹腹疼這服之既成腹大如箕遂不可救東南最多所以然者東海饒魚鹽魚者甘美之味多食令人熱中鹽者鹹苦之味其性偏於走血血爲陰象初與熱合不覺其病日久月擗中焦沖和之氣亦漸爲熱矣氣熱則結而血不流矣於是氣居血中血裹氣外一似婦人受孕者然至彌月時腹如抱甕推而言之凡五方

之言梁厚味椒薑桂糝成熟中者皆其類也。治之之法以六君子湯加乾薑川芎防已爲末。陳米荷葉煎湯泛丸。白湯下。執中央以揮四旁法也。

謹按俞氏之論其言血臟之原最爲詳確。惟所主之方與氣熱則結而血不流之說未能脗合。蓋六君子與所加之藥於治瘀臟爲宜且須寒飲方爲切合。如論所謂應用清和理氣之品。攻劑代抵當丸。主之和劑丹梔逍遙散加薑黃香附治之。諸書皆用桃奴散或琥珀散治之。第兩方用溫藥亦血因寒凝之劑。與喻氏所論又有不同。醫者審證擇用可也。

又有石痕腸覃狀如懷子腹。日以大月事。以時下者。爲腸覃。以寒

客於腸外氣病而血不病也宜橘核丸主之月事不以時下者爲石瘕乃寒氣客於子門子則閉塞惡血當下不下衄以留止故成石瘕是氣病而血亦病也宜琥珀散桃奴散治之後服溫經湯單腹脹者爲血臌若四肢皆脹或先從四肢腫起其色紅者謂之血腫亦有不紅者血從水化而爲水故不紅也或得於吐血之後瘀血化水而腫或得於婦人經水不行血化爲水而腫旣化爲水則兼治水五皮飲加當歸白芍蒲黃丹皮桃仁治之或用乾漆雄黃醋丸麥芽湯下亦可

又凡臌脹浮腫俱要分陰證陽證陰證脈沉澀弦緊必有寒痰諸證宜中滿分消湯加桃仁陽證脈數口渴便短氣逆等證宜小柴

胡湯加知母石膏防已丹皮桃仁猪苓茯苓車前子治之另詳六
卷腫脹門

經閉

婦女經閉有四一寒證一熱證一實證一虛證

寒閉者積冷結氣經水斷絕至有歷年胞門爲寒所傷經絡凝堅
陰中掣痛少腹惡寒上引腰脊繞臍寒疝或瘀血不行留爲石瘕
皆霜凝水結之象也用溫經湯主之或用溫藥下之附子理中湯
加當歸桃仁大黃細辛生膝肉桂生化湯下之尤穩經通之後再
服腎氣丸收功

熱證者。胞爲血室。血至爲肝之所司。肝火橫逆。從胞脈上迫於心。肺心。肺之氣不得下通。則發寒熱。頭暈耳鳴。煩燥多怒。咳逆氣上。治宜平其肝火。使肺氣得下降。心血得下注。斯經通矣。當歸蘆薈。芍加桃仁以攻之。丹梔逍遙散加桃仁以和之。又曰。衝任兩脈起於胞中。上屬陽明。若胞中火逆。隨衝任兩脈上沖。頭暈。赤咽喉不利。發熱口渴。欬逆喘急。此乃胞氣上逆。合於陽明之氣。而爲燥動之證。法宜從陽明以折衝。逆使火下降。斯經通矣。玉燭散治之。加脾胃素虛。不便攻治者。玉女煎加桃仁丹皮治之。金匱麥門冬湯尤能逆折衝氣。數方皆從陽明降氣。使氣二達。胞中則經自通。又有從腎中引氣下行。以通經之法。用六味地黃湯加知柏牛膝。

前仁此又引衝氣下行嘔治之法

實證經閉者婦人少腹如敦狀小便微難而不渴此爲水與血結在血室也大黃甘遂湯主之又仲景曰婦人爲寒中風經水適斷胸脇滿如結胸之狀譴語者此爲熱入血室也小柴胡湯主之婦人經閉藏堅癖不止者中有乾血濕熱腐變化出白物礬石凡納人陰戶吾謂可用土瓜相湯加黃柏防已治之又咸小腹結痛大便黑色小便不利明知血欲行而不肯利下宜抵當湯主之時方可用隔下逐瘀湯

虛證經閉者或因失血過多面與水甲之色俱淺淡黃白血既從上而脫更何從再注胞中以爲郅水黃治法宜止其吐衄之血使