

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百五十二



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院院使臣張肇基

編修臣倉聖脈覆勘

普濟方卷一百五十一

諸毒門

解金銀銅鐵石毒

金受五方精氣各有毒性
過宜以湯洗服之非真
石法亦若木也

周王朱櫛撰

可謂之有利無害也服

陽正氣當隨所畏惡以

日以服石為佳殊不知

食不安皆由於是非止

已身不康生子亦難育也所以服石之人終須受害要不可輕服五石也人年三十以上可服石藥若素肥充亦勿妄服四十以上必須之五十以上三年可服一劑六十以上二年可服一劑七十以上一年可服一劑。又云人年已上五十精華消歇服石猶得其力六十以上轉惡服石難得力所以常須服石令人手足溫煖骨體充實雖生冷舉措輕便復耐寒暑不著諸病是以大須服之凡石熱熟煉用之凡石之發當必惡寒頭痛心悶發

作有時狀如瘟瘧但有此兆無過取冷水淋之得寒乃定止一切冷食惟酒須溫

方

薺芫湯 療石毒卒發者慄慄如寒或欲食或不食若服紫石英發毒者亦寒悶惛喜卧起止無氣力或寒是腑臟氣不和所生療之

薺芫

四兩

甘草

炙

藍子

各一兩

茯苓

黃芩

各二兩

蔓青

子

一升

人參

一兩

芍藥

一兩

右咬咀以水一斗煮蔓青子八升去滓子放藥煎取
三升去滓分三服日三服若虛弱加人參一兩若氣
上加茯苓薺芩一兩甚良

治銀毒方

黃連

去鬚

甘草

生剉各一兩

右麤搗篩以水三盞煎取二盞去滓復飲之

解金銀毒方

出千金方

用水銀服數兩即出若毒少者一兩亦可扶坐與吞

令入腹中即活一方以鷄汁及尿白燒猪脂和水
淋鷄屎汁煮蔥白汁鴨血及屎汁並能治之一方加人
參汁臘月猪脂為丸如豇豆大三丸並解之單用鴨
屎汁治銅鐵毒及金毒

治腹中有鐵方

用白折炭刮去末并花水服三錢不效再服

解服石藥中毒

出千金方方見
解金銀石毒類

解金毒方

出聖
惠方

用鴨血一盞每服半盞和鷄子清調下未效再服

解銀毒方

用石亭脂一兩為末煎甘草湯調下二錢每日三服效

治鐵毒方

出聖惠方

用磁石火煨醋淬二七遍一兩細搗研為粉醋煮麪

糊丸如梧桐子大每服三十丸水吞下未瘥更服

治丹砂毒方

用鹽五錢以冷水攪勻令澄旋旋服之

治百種乳毒方

用紫石英一兩為末每服一錢以溫水調下連三服

治硫黃毒方

用細辛去苗葉一兩搗羅為散每服一錢煮猪肉白湯調下冷服一方用白野鴿肉服之並解

治硝石毒方

用女苑一兩粗搗篩每服二錢以水一盞煎七分溫服不拘時候

治陽起石毒方

用菟絲子一兩不用酒浸搗羅為細末每服一錢以

水調下三服立瘥

治雄黃毒方

出千金方

用防已一兩為細末每服二錢以溫水調下連進三

服一方取汁解之並瘥

治礬石毒方

出十金方

用白鵝膏不拘多少研細服一匙大豆汁調下一方

單用大豆汁服之亦佳

黑鉛酒 治中金石藥毒

用黑鉛一斤淨鍋鎔作汁投酒一升如此十數廻候酒至半升去鉛頓服之效一方用井水磨下解砒毒

解丹毒方

用地漿服之最妙

壓丹石毒及解諸毒方

用生大豆煮汁服之甚良

又方 壓丹石去煩熱利小便止渴小兒熱瘡

取葛根浸搗汁飲之良

治服金石方

取括根苦酒中熬燥搗篩仍以苦酒和塗紙上攤貼
用之良妙

五加皮湯 治服諸藥石後或熱噤多向冷地上卧又
不食熱麪酒等物

用五加皮二兩以水四升煮取二升半候石發之時

便服未定更服

治硫黃忽發氣弱

用羊血服一合效

單葱白湯藥 療石毒沉體中數年或便發宜服之

葱白一升水五升煮一半去滓服未效再服三劑止

治丹石熱發

用菰根和鯽魚作羹食之三兩頓即瘥

療熱酒壓丹石

用田螺汁飲之不可常服解砒毒

治食金欲死方

用鷄糞半升水一升淋汁灌之如人行三二里再灌

馬通散 治石毒

赤馬糞

不拘多少水浸三日淘洗

右以砂鍋子煨存性入麝少許每服一錢溫酒調下

治中金藥毒方亦解衆毒止瀉洩及邪熱

取金蛇四寸炙令黃煮汁飲頻服之以瘥為度

治一切藥毒并蠱并解金石毒

用石蟹熟水磨服

治硫黃毒

煎餘甘子汁飲之以預其毒也

治硫黃毒

以黑錫煎湯解之忌食宿冷猪肉

解金銀藥毒

用黃龍眼以水研取半合空心少少服二十餘日瘥

治硫黃發偏身熱

以大麻油二合煎熟放溫以銅匙抄少許啜之日三

五服效

治服硫黃發動

以猪肉鴨羹及餘甘子湯並解之

食丹藥毒

用嬰粟子研去滓煎取腐入薑蜜和合萱草研汁服
四物湯香蘇散各一貼和煎藥解金鉛粉調地漿飲

之亦解淡竹葉濃煎服猪浮肋骨煎汁及研瓜蒌根
飲可解藍汁猪血菹豆以上並解之

服丹石毒

薄荷 黃芩

各五錢

芒硝 二錢

用蜜調嚼或傳

又方

用東引柳枝心甘松或加丁香木香為末可服可嚼

解紫石英毒