

欽定四庫全書

子部

神農本草經疏卷二十六

至



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

神農本草經疏卷二十三

果部三品

總五十三種今疏其要者二十種又木部移入三

種

上藕實藕蓮

橘橘青皮核

大棗

覆盆子

雞頭實

中梅實

木瓜

柿

烏芋

枇杷葉

荔枝子

石蜜

甘蔗

沙糖

下品桃核仁

杏核仁

梨

胡桃

海松子

橄欖

龍眼木部移入

赤瓜木

即山查木部移入

榧實木部移入

藕實味甘平寒無毒主補中養神益氣力除百疾久服

輕身耐老不饑延年

疏○藕實得天地清芳之氣稟土中沖和之味故味甘氣平別錄寒無毒入足太陰陽明兼入手少陰經土為萬物之母後天之元氣藉此以生化者也母氣既和則血氣生神得所養而疾病無由來矣藕實正稟稼穡之化乃脾家之果故主補中養神益氣力除百疾及久服輕身耐老不饑延年也孟詵主五臟不足傷中益十二經脉血氣大明主止渴去熱安心止痢治腰痛及洩精多食令人喜皆資其補益心脾之

功也

主治參互

得川黃連白芍藥白朮豆乾葛升麻紅麴橘紅甘草
滑石烏梅為丸治滯下如神 下痢飲食不食俗名
噤口痢此證大危用鮮蓮肉一兩黃連五錢人參五
錢水煎濃細細與呷服完思食便瘥 同菟絲子五
味子山茱萸山藥車前子肉豆蔻砂仁橘紅芡實人
參補骨脂巴戟天治脾腎俱虛五更溏瀉有肺熱者

去人參肉豆蔻 孟詵食療服食不饑石蓮肉蒸熟
去心為末煉蜜丸梧子大日服三十丸此僊家方也
普濟方白濁遺精石蓮肉龍骨益智仁等分為末
每服二錢空心米飲下 直指方心虛赤濁蓮子六
一湯用石蓮肉六兩炙甘草一兩為末每服一錢燈
心湯下 丹溪心法久痢噤口石蓮肉炒為末每服
二錢陳倉米湯調下便覺思食甚妙

簡誤

藕實脾家果也甘平無毒於諸疾竝無相迂第生者食之過多微動冷氣脹人石蓮子乃九月經霜後采堅黑如石者破房得之墮水入泥者良今肆中一種石蓮子狀如榧子其味大苦產廣中出樹上木實也不宜入藥

藕唐本注主熱渴散血生肌久服令人心懽藥性論云藕汁味乾能消瘀血不散藕節搗汁主吐血不止或口鼻出血孟詵云生食之主霍亂後虛渴煩悶不

能食其產後忌生冷物惟藕不同生冷為能破血故也
蒸食甚補五臟實下焦陳藏器云消食止洩除煩
解酒毒及病後熱渴日華子云止霍亂開胃消食除
煩止悶口乾渴疾止怒令人喜破產後血悶搥窖金
瘡並傷折止暴痛

疏○藕稟土氣以生其味甘生寒熟溫入心脾胃三
經生者甘寒能涼血止血除熱清胃故主消散瘀血
吐血口鼻出血產後血悶窖金瘡傷折及止熱渴霍

亂煩悶解酒等功熟者甘溫能健脾開胃益血補心
故主補五臟實下焦消食止洩生肌及久服令人心
懽止怒也本生於汙泥之中而體至潔白味甚甘脆
孔竅瓊瓏絲綸內隱療血止渴補益心脾真水果中
之嘉品也又能解蟹毒

蓮蕊鬚一名佛座鬚味甘澀氣溫本經不載而古方
固真補益方中往往用之詳其主治乃是足少陰經
藥亦能通手少陰經能清心入腎固精氣烏鬚髮止

吐血療滑洩同黃蘗砂仁沙苑蒺藜魚膠五味子覆盆子生甘草牡礪作丸治夢遺精滑甚良

橘皮味辛溫無毒主胸中瘕熱逆氣利水穀下氣止嘔

欬除膀胱留熱停水五淋利小便主脾不能消穀氣衝

胸中吐逆霍亂止洩去寸白久服去臭下氣通神輕身

長年

按橘柚實兩種本經作一條蓋傳誤也今改正

疏○橘皮花開於夏實成於秋得火氣少金氣多故

味辛苦氣溫無毒味薄氣厚降多升少陽中之陰也

入手足太陰足陽明經其主胸中痼熱逆氣氣衝胸
中嘔欬者以肺主氣氣常則順氣變則逆逆則熱聚
於胸中而成痼痼者假也如痞滿鬱悶之類也卒能
散苦能洩溫能通行則逆氣下嘔欬止胸中痼熱消
矣脾為運動磨物之臟氣滯則不能消化水穀為吐
逆霍亂泄瀉等證苦溫能燥脾家之溼使滯氣運行
諸證自瘳矣肺為水之上源源竭則下流不利熱結
膀胱肺得所養而津液貫輸氣化運動故膀胱留熱

停水五淋皆通也去臭及寸白者辛能散邪苦能殺蟲也通神輕身長年者利脾肺之極功也

主治參互

橘皮留白補脾胃和中去白消痰理肺氣同白朮則補脾同甘草則補肺同補氣藥則益氣同泄氣藥則破氣同消痰藥則能去痰同消食藥則能化食各從其類以為用也 同人參何首烏桂枝當歸薑皮治三日瘧寒多得白豆蔻生薑藿香半夏治胃家有

寒痰或偶感寒氣傷冷食嘔吐不止 同人參白朮

白茯苓甘草山藥白豆蔻藿香麥芽山查白藕豆治

脾胃虛飲食不化或不欲食食亦無味 同蘇子貝

母枇杷葉麥門冬桑根白皮沙參枯樓根五味子百

部治上氣咳嗽能消痰降氣 同枳殼烏藥木香草

豆蔻檳榔治氣實人暴氣壅脹 同蒼朮厚朴甘草

為平胃散治胸中脹滿 入二陳湯治脾胃溼痰及

寒痰痰飲 仲景方橘皮湯治男女傷寒並一切雜

病嘔噦手足逆冷者用橘皮四兩生薑一兩水二升
煎一升徐徐呷之即止 百一選方霍亂吐瀉但有
一點胃氣存者服之即生廣陳皮去白五錢真藿香
五錢水二盞煎一盞時時溫服 食療治脚氣衝心
或心下結硬腹中虛冷陳皮一斤和杏仁五兩去皮
尖熬少入蜜搗和丸如梧桐子大每日食前米飲下
三十丸 普濟方大腸悶寒陳皮連白酒煮焙乾研
末每服二錢米飲下 適用方脾寒諸瘧不拘老少

孕婦只兩服便止真橘皮去白切生薑自然汁浸過一指銀石器內重湯煮乾焙研末每服三錢用隔年青州棗十箇去核水一盞煎半盞發前服以棗下之張氏方婦人乳癰未成者即散已成者即潰痛極者不痛神驗不可言用真橘皮湯浸去白曬乾麩炒微黃為末每服二錢麝香調酒下初發一服見効

簡誤

橘皮味辛氣溫能耗散真氣中氣虛氣不歸元者忌

與耗氣藥同用胃虛有火嘔吐不宜與溫熱香躁藥同用陰虛咳嗽生痰不宜與半夏南星等同用瘧非寒甚者亦勿施

青橘主氣滯下食破積結及隔氣

即青皮

疏○青皮古方無用者至宋時醫家始用之其色青其味極苦而辛其氣溫而無毒氣味俱厚沈而降陰也入足厥陰少陽苦泄辛散性復剌削所以主氣滯下食破結疾及隔氣也元素破堅癖散滯氣治左脇